СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

МОСКВА • 1993

Составлено на основании справочников лекарственных средств М.Д. Машковского и М.А. Клюева

Настоящее справочное издание содержит описание основных лекарственных препаратов, разрешенных к применению на территории России.

Даны их фармакотерапевтические характеристики, рекомендации по применению и противопоказания.

Препараты представлены в алфавитном порядке

СОКРАЩЕНИЯ

ПНС — *периферическая нервная система*
ВНС — *вегетативная нервная система*
ЦНС — *центральная нервная система*
ч.л. — *чайная ложка*
ст.л. — *столовая ложка*
д.л. — *десертная ложка*
в/м — *внутримышечно*
в/в — *внутривенно*
табл. — *таблетка*

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С УКАЗАНИЕМ ПРЕПАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИХ ЛЕЧЕНИЯ

• **Аборт угрожающий**

Партусистен
Оксипрогестерона капронат
Прегнин
Норколут
Туринал
Спазмолитические средства
Токоферола ацетат

• **Авитаминозы (гиповитаминозы)**

Витамины и их аналоги
Поливитаминные препараты

• **Абсцессы**

Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Фурацилин

• **Акромегалия**

Препараты женских половых гормонов
Препараты мужских половых гормонов (андрогены)
Парлодел (бромокриптин)

• **Актиномикоз**

Препараты группы пенициллина
Калия йодид
Натрия йодид

• **Алкоголизм**

Инмекарб
Тетурам (антабус)

Эспераль
Апоморфина гидрохлорид
Нейролептики
Транквилизаторы
Пирацетам
Холина хлорид
Пиридитол
Бутироксан

• Аллергические заболевания

Глюкокортикостероиды (гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги)
Кортикотропин
Синактен-депо
Антигистаминные препараты
Адреномиметические препараты
Препараты кальция
Паратиреоидин
Дигидротахистерол
Натрия тиосульфат
Вилозен
Гексаметилентетрамин
Витамин Р
Аскорбиновая кислота
Гистазол
Пенициллиназа
Гисманал
Череды трава

• Алопеция гнездная (облысение)

Фотосенсибилизирующие препараты

• Амебная дизентерия

Тетрациклины
Мономицин
Эметина гидрохлорид
Хиниофон
Осарсол

• Аменорея

Препараты женс-

ких половых гормонов
Гормоны коры надпочечников
Гонадотропин хорионический
Гонадотропин менопаузный
Лактин
Кломифенцитрат (клостильбегит)
Парлодел

• **Ангина**
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Антисептические средства
Ципринол
Фурацилин
Йодинол

• **Анемия**
Цианокобаламин
Оксикобаламин
Кобамамид
Витогепат
Кислота фолиевая

Препараты, содержащие железо
Коамид
Натрия арсенат
Пиридоксина гидрохлорид
Аскорбиновая кислота
Рибофлавин
Фитин
Гематоген
Серотонина адипинат

• **Анорексия**
Горечи
Желудочный сок
Анаболические стероиды
Карнитина хлорид
Апилак

• **Арахноидит**
Препараты группы пенициллина
Препараты группы стрептомицина
Гексаметилентетрамин
Бийохинол

- **Аритмии**

Антиаритмические средства
Аллапинин
Адреноблокаторы:
—анаприлин
—тразикор
—вискен
—корданум
Сердечные гликозиды
Калия хлорид
Калия оротат
Кокарбоксилаза
Аспаркам (панангин)
Рибоксин
Лопресор
Финоптин
Новокаин
Лидокаин
Кинилентин
Седативные средства

- **Артериальная гипотензия**

Адреномиметические средства
Препараты группы стрихнина
Психостимулирующие средства
Аналептические средства
Разные средства, оказывающие возбуждающее действие на ЦНС
Дезоксикортикостерона триметилацетат
Кофетамин

- **Артрит ревматоидный**

Кислота ацетилсалициловая
Индометацин
Аспизоль
Артепарон
Ортофен
Ибупрофен
Гидрокортизон
Преднизолон
Преднизолонгемисукцинат
Преднизолона ацетат

Кеналог-40
Кризанол
Сургам
Азатиоприн
Напросин

• Артриты

Анальгезирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — производные салициловой кислоты и других соединений
Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги
Вещества, раздражающие кожу
Препараты, содержащие яды пчел и змей
Биогенные препараты
—гумизоль
—пелоидодистиллят
—плаценты экстракт
—торфот
—фибс
—желчь консервированная медицинская
—плазмол
—румалон
Транквилизаторы

• Аскаридоз

Пирантель
Пиперазина адипинат
Нафтамон
Вермокс (мебендазол)
Декарис
Пижмы цветки

• Астенический синдром

Психостимулирующие средства
Ниаламид
Препараты группы стрихнина
Разные средства, оказывающие

возбуждающее действие на ЦНС
Препараты, содержащие мышьяк
Препараты, содержащие фосфор
Витамины
Анаболические стероиды
Дезоксикортикостерона ацетат
Бемитил
Экдистен

• Атеросклероз
Препараты гипохолестеринемического действия
Холина хлорид
Липоевая кислота
Кавинтон
Липамид
Ангиопротекторы
Йод
Циннаризин
Кислота никотиновая
Кальция пангамат
Липостабил
Аминалон

Препараты, улучшающие мозговое кровообращение
Стрихнина нитрат

• Атония желудка и кишечника
Ацеклидин
Прозерин
Тиамина хлорид
Тиамина бромид
Стрихнина нитрат

• Атония (гипотония) матки
Метилэргометрин
Эргометрина малеат
Эрготал
Эрготамина гидротартрат
Барбариса листьев настойка
Гифотоцин
Окситоцин
Пастушьей сумки трава (экстракт)
Питуитрин

• **Атония мочевого пузыря**

Ацеклидин
Прозерин
Стрихнина нитрат

• **Ахилия желудка функциональная**

Горечи
Ферментные препараты, улучшающие пищеварение:
—абомин
—ацедин-пепсин
—желудочный сок натуральный
—мезим-форте
—нигедаза
—ораза
—панзинорм-форте
—панкреатин
—пепсидил
—пепсин
—солизим
—фестал (дигестал)
—хлористоводородная кислота разведенная

• **Бесплодие**

Гонадотропин хорионический
Гонадотропин менопаузный
Препараты женских половых гормонов
Токоферола ацетат
Дановал

• **Бессонница**

Снотворные средства
Седативные средства
Транквилизаторы
Нейролептические средства

• **Бластомикоз**

Амфотерицин В
Амфоглюкамин

• **Бленорея**

Препараты группы пенициллина
Левомицетин
Сульфацил-натрий

Норсульфазол-натрий
Серебра нитрат
Колларгол
Ртути монохлорид

• Блефарит

Препараты группы пенициллина
Левомицетин
Тетрациклины
Сульфаниламидные препараты
Фурацилин
Колларгол
Бриллиантовый зеленый
Биогенные стимуляторы
Мазь ртутная желтая
Мазь гидрокортизона ацетат
Дексона

• Болезнь Аддисона

Гормоны коры надпочечников:
—дезоксикортикостерона ацетат
—дезоксикортикостерона триметилацетат
—дексаметазон
—кортизона ацетат
Аскорбиновая кислота
Кортинефф
Анаболические стероиды

• Болезни глазные

Лекарственные препараты, применяемые в офтальмологии
Интерлок
Гистазол

• Болезнь гипертоническая

Диуретические средства
Адреноблокаторы:
—бутироксан
—вискен
—дигидроэрготоксин

ерона ацетат
зоксикортико-
ерона триметил-
цетат
ксаметазон
ртизона ацетат
рбиновая кислота
гинефф
болические
ероиды

олезни глаз-
ые
арственные
репараты, приме-
немые в офталь-
ологии
ерлок
газол

олезнь гипер-
ническая
ретические
редства
еноблокаторы:
утироксан
искен
игидроэрготок-
ин

—изобарин
—корданум
—орнид
—пирроксан
—тропафен
—фентоламина гидрохлорид
Вискальдикс
Антигипертензивные средства
Энап
Спазмолитические средства
Лопресор
Седативные средства
Транквилизаторы
Коргард
Ганглиоблокаторы:
—бензогексаний
—димеколин
—имехин
—камфоний
Беталок
Капотен
Регитин

• Болезнь Меньера

Торекан
Аэрон
Беллоид
Димедрол
Дипразин
Дифенин
Пирроксан

• Болезнь Паркинсона

Препараты, применяемые для лечения паркинсонизма
Скополамина гидробромид
Амизил
Арпенал
Мелликтин
Димедрол
Пиридоксина гидрохлорид

• Бронхиальная астма

Адреномиметические вещества:
—астмопент (алупент)
—беродуал
—беротек

—бриканил
—изадин (новодрин, эуспиран)
—сальбутамол
—солутан
—теофедрин
—"Эфатин" аэрозоль
—эфедрина гидрохлорид
Гормоны коры надпочечников и их синтетические аналоги
Антигистаминные препараты
Антихолинергические средства, блокирующие преимущественно периферические холинореактивные системы
Бензогексоний
Дитэк
Кватерон
Теопэк
Спазмолитические средства
Теотард
Интал
Атровент

• **Бронхиты**

Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Отхаркивающие средства
Ферментные препараты:
—трипсин
—химопсин
Далацин-Ц
Атровент

• **Бруцеллез**

Препараты группы стрептомицина
Левомицетин
Тетрациклины

• **Вагинит**

Левомицетин
Грамицидин
Сульфапиридазин-натрий
Фурацилин

Хинозол
Этакридина лактат
Масло облепиховое
Вагoтил

• Варикозное расширение вен

Эскузан
Троксевазин
Индовазин
Гливенол

• Вегето-сосудистая дистония

Седативные средства
Транквилизаторы
Беллатаминал
Беллоид
Пикамилон

• Воздушная болезнь (морская болезнь)

Скополамина гидробромид
Торекан
"Аэрон"
"Аэровит"

Валидол
Натрия гидрокарбонат

• Волчанка красная системная

Гормоны коры надпочечников и их системные аналоги
Азатиоприн
Делагил
Плаквенил
Ацетилсалициловая кислота
Бутадион
Индометацин
Кризанол

• Гастрит хронический гипоацидный

Кватерон
Ганглерон
Подорожника сок
Плантаглюцид
Кислота никотиновая
Кислота аскорбиновая

Пиридоксина гидрохлорид
Цианокобаламин
Ферментные препараты, улучшающие пищеварение
Кислота хлористоводородная разведенная

• **Гастрит хронический гиперацидный**
Антихолинергические средства
Ганглиоблокаторы
Алмагель
Гастал
Алмагель-А
Фосфалюгель
"Викаир"
"Викалин"

• **Гельминтозы**
Антигельминтные средства
Билтрицид (празиквантель)

• **Геморрой**
Слабительные средства
Местноанестезирующие средства:
—анестезин
—"Анестезол" суппозитории
—нео-анузол
—новокаин
"Бетиол" суппозитории
Индовазин
Бутадиона мазь
Прокто-гливенол
"Ауробин" мазь
Проктоседил

• **Гепатит**
Глюкоза
Тиамина бромид
Рибофлавин
Пиридоксина гидрохлорид
Никотиновая кислота
Фолиевая кислота
Аскорбиновая кислота

Анаболические стероиды
Преднизолон
6-меркаптопурин
Эссенциале
Витогепат
Сирепар
Лив-52
Панзинорм форте
Дипромоний

- Герпетическая инфекция

Противовирусные препараты:
—бонафтон
—"Мегосин"
—метисазон
—оксолиновая мазь
—офтан-IDU
—"Риодоксол" мазь
Бриллиантовый зеленый
Алпизарин

- Гипогликемия

Глюкоза

- **Гипопаратиреоз**

Партиреодин
Препараты кальция
Дигидротахистерол
Анаболические стероиды
Тахистин
Силенин

- Гипотиреоз

Тиреоидин
Тиреокомб
Тиреотом
Трийодтиронина гидрохлорид
Тиротропин

- Гипофизарный нанизм

Анаболические стероиды
Соматотропин
Половые гормоны

- Гломерулонефит

Препараты группы пенициллина

Преднизолон
6-меркаптопурин
Делагил
Плаквенил
Индометацин
Гепарин
Исипен
Кислота аминокапроновая
Фуросемид
Верошпирон
Полиглюкин
Анаболические стероиды
Рулид
Допегит
Адреноблокаторы
Антигипертензивные средства

• **Гонорея**

Препараты группы пенициллина
Тетрациклины
Эритромицин
Сульфаниламидные препараты
Калия перманганат
Протаргол

• **Грибковые поражения кожи**

Препараты для лечения грибковых заболеваний кожи
Кислота бензойная
Кислота салициловая
Ороназол
Резорцин
Дермазолон
Мазь Вилькинсона
Фетимин (нафтифин)

• **Грипп**

Интерферон
Оксолиновая мазь
Ремантадин
Рутин
"Аскорутин"
Кварцетин
Аскорбиновая кислота
Бальзам "Золотая звезда"

• **Депрессии**

Анафранил (кломипрамин)

Антидепрессанты
Людиомил
Нейролептические средства
Фризиум
Транквилизаторы
Авоксин

• Дерматит

Вяжущие средства
Череды трава
Флуцинар
Синалар
Локакартен
Сикортен
Пиридоксин
Кальция пантотенат
Кальция пангамат
Антибтотики
Стероидные препараты
Дерматол

• Диабет несахарный

Адиурекрин
Адиуретин
Питуитрин
Хлорпропамид
Мисклерон
Финлепсин
Гипотиазид

• Диабет сахарный

Препараты поджелудочной железы и синтетические гипогликемические препараты (противодиабетические средства)
Димефосфон
Глюренорм
Изодибут
Липостабил

• Дизентерия бактериальная

Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Производные нитрофурана
Производные 8-оксихинолина

Витаминные препараты

- Запоры

Агиолакс
Слабительные средства
Но-шпа
Спазмолитические средства
Холинолитические средства
Магния сульфат
Гутталакс

- Злокачественные новообразования

Химиотерапевтические средства
Противоопухолевые антибиотики
Алкалоиды и другие вещества растительного происхождения, оказывающие противоопухолевое действие
Ферментные и гормональные препараты, применяемые при лечении опухолей
Гидреа
Детицен
Анандрон

- Зоб диффузный токсический (базедова болезнь)

Мерказолил
Препараты, содержащие йод

- Инсульт

Средства, тормозящие свертывание крови
Эуфиллин
Фуросемид
Мочевина
Циннаризин
Пармидин

- Инфаркт миокарда

Антиангинальные

препараты
Липостабил
Промедол
Дроперидол
Анальгин
Димедрол
Натрия оксибутират
Гепарин
Стрептодеказа
Кальция хлорид
Глюкоза
Анаприлин
Ацетилсалициловая кислота
Миофедрин

- Кандидоз

Низорал
Нистатин
Леворин
Витамины группы В
Кислота аскорбиновая
Амфотерицин В

- Колит, энтероколит

Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Колибактерин
Бифидумбактерин
Бификол
Лактобактерин
Алоэ экстракт жидкий для инъекций
Пелоидин
Протаргол
Вяжущие средства
Обволакивающие и адсорбирующие средства
Ферментные препараты, улучшающие пищеварение

- Колит язвенный неспецифический

Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Сульфасалазин
Салазопиридазин
Преднизолон
Гидрокортизон
Аминохинол

• Контрацепция

Антеовин

Нон-Овлон

Диане

Овидон

Постинор

Ригевидон

Трацептин

• Кровотечения

Антигеморрагические и гемостатические средства

Препараты кальция

Натрия хлорид

Плазмозаменяющие растворы

Викасол

Кислота аскорбиновая

Витамин Р

Глюкоза

Кислота аминокапроновая

Серотонина адипинат

Кровохлебки корневище и корень

Памба

Фитоменадион

• Кровотечения маточные дисфункциональные

Средства, стимулирующие мускулатуру матки

Препараты женских половых гормонов:

—синэстрол

—прогестерон

—фолликулин

—кломифенцитрат

Андрогены:

—метилтестостерон

—тестостерон

См. также кровотечения

• Ларингит, фарингит

Ромашки цветки

Шалфея листья

Фалиминт

Эвкалипта лист

"Эокатол"
Гексализ
Антибиотики
Фарингосепт
Сульфаниламидные препараты

• Лейшманиоз
Солюсурмин
Антибиотики
Витамины

• Лепра
Противолепрозные препараты
—диафенилсульфон
—солюсульфон

• Лишай опоясывающий
Аналгезирующие средства
Антигистаминные препараты
Транквилизаторы
Снотворные средства
Бриллиантовый зеленый

Оксолиновая мазь
Флореналевая мазь

• Лучевая болезнь
Препараты для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни
Пиридоксина гидрохлорид
Мексамин

• Лямблиоз
Трихопол
Тинидазол
Фуразолидон
Аминохинол

• Малярия
Делагил
Хинина дигидрохлорид
Хиноцид
Примахин
Сульфапиридозин
Хлоридин

• Менингит
Антибиотики

Сульфаниламидные препараты
Роцефин
Рулид (рокситромицин)

• Миастения

Антихолинэстеразные вещества
Гидрокортизон
Кортизон

• Мигрень

Дамилена малеинат
Анаприлин
Ацетилсалициловая кислота
Эрготамина гидротартрат
Кофеин
Кофетамин
Анальгезирующие средства
Транквилизаторы
Антигистаминные препараты
Дексаметазон
Фризиум
Диваскан

• Насморк

Нафтизин
Галазолин
Эфедрин
"Ингакамф"
"Камфомен"
Сульфаниламидные препараты
Пенициллин
Бальзам "Золотая звезда"
"Санорин"

• Невралгии

Тегретол
Анальгезирующие противовоспалительные средства
Промедол
Меновазин
Препараты с ядами пчел и змей

• Неврастения

Транквилизаторы
Нейролептические средства
Антидепрессанты

Снотворные средства

- **Невриты**

Аналгезирующие противовоспалительные средства
Витамин B1, B6, B12
Кокарбоксилаза
Кальция пантотенат
Кислота липоевая
Пиридоксин
Амиридин
Рибоксин
Новокаин
Гексаметилентетрамин
Галантамин
Прозерин
Оксазил
Дибазол

- **Ожирение**

Фепранон
Тиреоидин
Адипозин
Диуретические средства

- **Остеомелит**

Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Витамины
Трипсин кристаллический
Химотрипсин кристаллический

- **Отеки**

Диуретические и дегидратационные средства
Сердечные гликозиды
Теофиллин
Эуфиллин
Глюкоза
Натрия хлорид
Препараты кальция

- **Отит**

Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Фурацилин
Йодинол

Протаргол
Трипсин кристаллический
Химотрипсин кристаллический
Лидаза
Ципринол
Гидрокортизон

• **Панкреатит**
Контрикал
Метилурацил
Пентоксил
Антибиотики
Аналгезирующие средства
Антихолинергические средства
Спазмолитические
средства
Панкреатин
Фестал
Панзинорм-форте
Ораза
Солизим
Трифермент
Витаминные препараты

• **Педикулез**
Ниттифор

• **Перитонит**
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Цефобид
Ципринол

• **Пиелонефрит**
Азлоциллин (секуропен, азлин)
Производные нитрофурана
Псипен
Невиграмон
Нитроксолин
Сульфаниламидные препараты
Антибиотики

• **Пневмония**
Антибиотики
Далацин-Ц
Сульфаниламидные препараты
Роцефин

Рулид
Отхаркивающие средства
Трипсин кристаллический
Ципринол
Химотрипсин кристаллический
Цефобид
Димефосфон

- Подагра

Ортофен
Кетазон
Бутадион
Индометацин
Аллопуринол
Этамид

- Почечнокаменная болезнь

Средства, способствующие выделению мочевой кислоты и удалению мочевых конкрементов
Спазмолитические средства
Антихолинергические средства
Аналгезирующие средства
Горца птичьего трава

- Простатит

Пермиксон
Аналгезирующие средства
Раверон
Антибиотики

- Псориаз

Антигистаминные препараты
Препараты кальция
Витамины B6, B12, A, C
Кокарбоксилаза
Седативные средства
Салициловая мазь
"Флуцинар" мазь
Фторокорт
Лоринден-А
Кортизона ацетат

Дерматоп
Гидрокортизон
Метотрексат
"Антипсориати-
кум" мазь
"Псориазин" мазь

• Радикулит

Алором
Аналгезирующие
средства
"Капситрин"
Перца стручкового
настойка
Перцовый плас-
тырь
Метилсалицилат
Спирт муравьиный
Спирт камфорный
Препараты, содер-
жащие яды пчел
и змей
Новокаин
Спазмолитин
Витамины В1, В6,
В12

• Раны гнойные, раневые инфекции

Антибиотики
Сульфаниламид-
ные препараты
Гелевин
Антисептические
препараты
Азактам
Ферментные пре-
параты:
—трипсин кри-
сталлический
—химотрипсин
кристаллический
—рибонуклеаза
Актовегин (солко-
серил)
Альгипор
Аскол
Ацемин
"Ливиан" аэрозоль
Далацин-Ц
Линетол
Азлоциллин (секу-
ропен, азлин)
Циминаль

• Рахит

Эргокальциферол
Видехол

ики
иламид-
препараты
левин
нтисептические
препараты
зактам
ерментные пре-
параты:
-трипсин кри-
сталлический
-химотрипсин
кристаллический
-рибонуклеаза
ктовегин (солко-
серил)
льгипор
екол
цемин
Ливиан" аэрозоль
алацин-Ц
инетол
злоциллин (секу-
ропен, азлин)
иминаль

• Рахит
Эргокальциферол
Видехол

Кальция глицеро-
фосфат
Фитин
Натрия нуклеинат

• Ревматизм
Преднизолон
Ортофен
Индометацин
Препараты группы
пенициллина
Делагил
Сургам
Плаквенил
Витамины Р, С

• Сифилис
Препараты группы
пенициллина
Эритромицин
Бийохинол
Бисмоверол
Осарбон
Осарсол
"Осарцид"
Пентабисмол
Витамины
Биогенные стиму-
ляторы.

• Склеродермия
системная
Преднизолон
Пеницилламин
Делагил
Плаквенил
Коринфар
Лидаза
Андекалин

• Склероз рассе-
янный
Тегретол

• Спазмы гладкой
мускулатуры
Спазмолитические
средства
Антихолинергиче-
ские средства
Седативные средства
Анальгезирующие
средства

• Стенокардия
Антиангинальные
препараты
Липостабил
Анаприлин

Лопресор
Гепарин
Добутрекс (добутамин)
Ацетилсалициловая кислота
Седативные средства
Финоптин
Коргард
Коринфар (фенигидин)
Регитин
Миофедрин
Аналгезирующие средства
Витаминные препараты

• Стоматит афтозный
Антигистаминные препараты
Аскорбиновая кислота
Препараты кальция
Антибиотики
Интерферон
Оксолиновая мазь

• Тирсотоксикоз
Мерказолил
Резерпин
Седативные средства
Анаприлин

• Тканевая несовместимость
Циклофосфан
Хлорбутин
Тиофосфамид
Проспидин
Меркаптопурин
Фторурацил
Дактиномицин
Кортизона ацетат
Гидрокортизона ацетат

• Трахеит
Противокашлевые средства
Отхаркивающие средства
Трипсин кристаллический
Химотрипсин кристаллический

…ксикоз

…вные сред-
ства
Анаприлин

• Тканевая несовместимость
Циклофосфан
Хлорбутин
Тиофосфамид
Проспидин
Меркаптопурин
Фторурацил
Дактиномицин
Кортизона ацетат
Гидрокортизона ацетат

• Трахеит
Противокашлевые средства
Отхаркивающие средства
Трипсин кристаллический
Химотрипсин кристаллический

Антибиотики
Сульфаниламидные препараты

• Трихомоноз
Трихомонацид
Трихопол
Нитазол
Осарсол
Осарцид
"Осарбон"
Клион-Д

• Тромбозы, тромбоэмболии, тромбофлебит
Средства, тормозящие свертывание крови
Стрептодеказа
Стрептаза
Фибринолизин
Трипсин кристаллический
Химотрипсин кристаллический
Доксиум
Пармидин
Ацетилсалициловая кислота
Бутадион мазь

• Туберкулез легких
Противотуберкулезные препараты
Препараты группы стрептомицина
Канамицина сульфат
Витамины

• Фенилкетонурия
Апонти
Берлофен
Нофелан

• Холецистит
Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Спазмолитические средства
Антихолинергические средства
Анализирующие средства

Желчегонные средства

• **Цистит**

Антибиотики
Сульфаниламидные препараты
Цефобид
Ципринол
Азактам
Невиграмон
Нолицин
Фурагин
Рулид
Фурадонин

• **Чесотка**

Мазь Вилькинсона
Натрия тиосульфат
Кислота хлористоводородная
Бензилбензоат

• **Шок**

Плазмозамещающие растворы
Солевые растворы
Глюкоза
Адреномиметические вещества
Аналгезирующие средства
Антигистаминные пепараты
Аналептические средства
Кортизона ацетат
Гидрокортизон

• **Шизофрения**

Транквилизаторы
Нейролептические средства
Антидепрессанты
Инсулин

• **Экзема**

Антигистаминные перпараты
Седативные средства
Транквилизаторы
Диуретические средства
Препараты кальция
Аскорбиновая кислота

ие вещества
езирующие
дства
истаминные
параты
алептические
средства
Кортизона ацетат
Гидрокортизон

• **Шизофрения**

Транквилизаторы
Нейролептические
средства
Антидепрессанты
Инсулин

• **Экзема**

Антигистаминные
перпараты
Седативные средства
Транквилизаторы
Диуретические
средства
Препараты кальция
Аскорбиновая кислота

Дерматоп
Рутин
Этакридина лактат
Дерматол
Фурацилин
Нафталановая мазь
Деперзолон
Дермозолон
"Кортикомицин"
Лоринден
Метипред
Преднизолон
Синафлан ("Флуцинар", "Синалар")
Фторокорт
Препарат АСД
Префузин
Витамины

• **Энцефалит**

Антибиотики
Виролекс
Натрия салицилат
Гексаметилентетрамин
Синдокарб
Кофеин
Галантомин
Прозерин

Оксазил
Дибазол
Цианкобаламин
Аскорбиновая кислота

• **Эпилепсия**

Фенобарбитал
Противосудорожные препараты
Сибазон
Нитразепам
Тегретол
Антигистаминные препараты
Поливитамины
Дегидратационные средства

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Обволакивающие и адсорбирующие средства
Вяжущие средства
Магния окись

Ульфамид
Вентер (сукральфат)
Кальция карбонат
Антихолинергические средства
Спазмолитические средства
Ганглиоблокирующие вещества
Седативные средства
Транквилизаторы
Витамины группы B, A
Средства для улучшения процесса заживления и трофики тканей при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
Метандростенолон
Ретаболил
Пентоксил
Метилурацил
Биогенные стимуляторы
Оксиферрискорбон натрия
Альцид-В
Даларгин
Де-Нол
Гастал

АБОМИН (Abominum) препарат из слизистой оболочки желудка телят и ягнят молочного возраста. Применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся нарушением переваривающей способности и понижением кислотности (гастриты, гастроэнтериты, энтероколиты и др.). Принимают во время еды по 1 табл. 3 раза в день в течение 1-2 мес; при недостаточной эффективности-до 3 табл. 3 раза в день в течение 3 мес; при острых гастритах, гастроэнтеритах, колитах-по 1 табл. 3 раза в день в течение 2-3 дней. В отдельных случаях тошнота, изжога.

АВЕЛИЗИН (Awelysin). Синонимы: Стрептолиаза, Streptokinase, Streptasa. Применяют при эмболии легочной артерии и ее ветвей; тромбозе артерий и эмболии периферических артерий при консервативном лечении; тромбозе поверхностных и глубоких вен конечностей; остром инфаркте миокарда в течении первых 12 ч; закупорке сосудов сетчатой оболочки глаз. Вводят в/в капельно, начиная с 100 000-250 000 МЕ в 50 мл изотонического раствора натрия хлорида в течение 30 мин (30 капель в 1 мин), затем 750 000 МЕ в 500 мл раствора (100 000 МЕ в 1 ч), далее поддерживающие дозы. Курс 16-18 ч (контроль за содержанием в крови фибриногена и тромбинового времени). Возможны неспецифические реакции на белок; ал-

лергические реакции (рекомендуется одновременно вводить в/в 50 мг преднизолона); головная боль, тошнота, озноб; гематомы при в/м инъекциях; кровотечения после пункции. Противопоказан при геморрагических диатезах, недавних кровотечениях, выраженной гипертонии, стрептококковом сепсисе, язве желудка, септическом эндокардите, тяжелой форме сахарного диабета, беременности; применять с осторожностью при тяжелых заболеваниях печени и почек, активной форме туберкулеза.

АВИСАН (Avisanum). Содержит сумму веществ из плодов амми зубной. Применяют при спазме мочеточников, почечной колике по 0,05-0,1 г 3-4 раза в день после еды, курс 1-3 нед. В отдельных случаях возможны диспептические явления.

АВОКСИН (Avoxin). Нетрициклический антидепрессант. Применяют для лечения депрессивных состояний и аффективных расстройств, купирования суицидальных идей. Начальная суточная доза - 100 мг перед сном Поддерживающая доза - от 100 до 300 мг в сутки. Суточную дозу более 100 мг принимать в два приема (утром и вечером), таблетки глотать целиком. Во время курса лечения не употреблять спиртные напитки. Терапию ингибиторами моно-амино-оксидазы прекра-

тить за 2 нед до начала лечения. При одновременном лечении пропланололом снижают дозу последнего. При лечении возможны тошнота, рвота, сонливость, запоры, беспокойство, анорексия и тремор.

АГИОЛАКС (Agiolax). Гранулы, содержащие обогащенные слизистыми веществами семена подорожника блошного, плоды сенны остролистной и экстракт ромашки. Оказывает многокомпонентное послабляющее действие на кишечник. Принимают при запоре, особенно хроническом; для регуляции стула во время беременности, после родов, у лежачих больных; для опорожнения при неестественном заднем проходе. Обычно утром и вечером натощак принимают по 1-2 ч. л., не разжевывая, с 1 стаканом холодной воды или чая. С появлением эффекта дозу уменьшают до 1 (или 1/2) ч. л., при хорошем эффекте — 1/2 ч. л. только по утрам. При недостаточном эффекте принимать через 6 ч. Для регуляции стула во время беременности препарат принимают вечером с горячей жидкостью — не более 2 ч. л.

АДЕЛЬФАН (Adelphane). 1 табл. содержит 0,1 мг резерпина, 10 мг дигидралазина. (См. адельфан-эзидрекс).

АДЕЛЬФАН-ЭЗИДРЕКС (Adelphane-Esidrex). 1 табл. содержит 0,1 мг резерпи-

на, 10 мг дигидралазина, 10 мг гидрохлортиазида (гипотиазид). Применяют при всех формах гипертонической болезни по 1 табл. 2-3 раза в день после еды. Иногда отмечаются боли в эпигастральной области, заложенность носа, брадикардия, сонливость. Противопоказан при острой печеночной недостаточности.

АДИПОЗИН (Adiposinum). Препарат из передней доли гипофиза убойного скота, применяемый при конституциональной форме ожирения. В/м по 50 ЕД 2 раза в день в течение 10-20 дней (при малокалорийной диете). Побочные явления — задержка жидкости в организме, аллергические реакции. Противопоказан при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, наклонности к гипертензии и аллергическим заболеваниям, нарушениях функции печени и почек.

АДИУРЕКРИН (Adiurecrinum). Сухой препарат из задней доли гипофиза рогатого скота и свиней. Применяют в качестве антидиуретического средства при несахарном диабете, энурезе. Внутриназально по 0,02-0,05 г порошка 2-3 раза в день, детям — в зависимости от возраста. Возможно легкое раздражение глаз и полости рта (особенно у детей). Противопоказан при заболеваниях дыхательных путей и околоносовых пазух. Не назначают детям до 3 лет.

АДИУРЕТИН-СД (Adiuretin-SD). Капли в нос. Показан в тех же случаях, что и адиурекрин. По 1-4 капли в нос 2-3 раза в день.

АДОНИС-БРОМ (Adonis-Brom). Применяют в качестве успокаивающего средства по 1 табл. 3 раза в день при неврозах сердца и легких формах недостаточности кровообращения.

АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД (Adrenalini hydrochloridum). Синоним: Epinephrinum. (См. адреналина гидротартрат.)

АДРЕНАЛИНА ГИДРОТАРТРАТ (Adrenalini hydrotartras). Применяют в качестве стимулятора α-и β-адренорецепторов при приступах бронхиальной астмы, гипогликемии вследствие передозировки инсулина , острых медикаментозных аллергических реакциях, простой открытоугольной глаукоме и др.; в качестве сосудосуживающего и противовоспалительного средства в оториноларингологической и офтальмологической практике. Вводят подкожно и в/м, иногда в/в 0,3-1 мл 0,1% раствора. При острой остановке сердца внутрисердечно; при глаукоме 1-2% раствор в каплях. Иногда отмечаются тахикардия, нарушение ритма сердца, повышение АД; при ишемической болезни сердца возможны приступы

стенокардии. Противопоказан при артериальной гипертонии, выраженном атеросклерозе, сахарном диабете, тиреотоксикозе, беременности, закрытоугольной глаукоме. Нельзя применять при наркозе фторотаном (в связи с появлением аритмий).

АДРИАБЛАСТИН (Adriablastinum). Синоним: Adriamycin. Антибиотик из группы антрациклинов. Применяют при лимфосаркоме, лимфогранулематозе, острых лейкозах, раке молочной железы, легкого, злокачественных опухолях яичка, саркоме мягких тканей и некоторых костных саркомах, нейробластоме и опухоли Вильмса у детей, раке щитовидной железы и переходноклеточном раке мочевого пузыря. Более эффективен в комбинации с другими цитостатическими средствами. Вводят в/в. Обычно адриабластин назначают по 60-75 мг/м^2 1 раз в 3-4 нед в комбинации с другими препаратами. Ослабленным больным следует вводить адриабластин 3 дня подряд в меньших дозах. Лечение проводят под тщательным гематологическим контролем. Может вызывать тошноту, рвоту, стоматит, диарею, анорексию, алопецию, угнетение кроветворения, боль в области сердца, временное ухудшение данных ЭКГ, флебиты, дерматиты, аллергические реакции, кумулятивную кардиотоксичность. Противопоказан при тяжелых

заболеваниях сердца и печени, значительных лейко- и тромбоцитопении.

"АЕВИТ" ("Aevitum"). Масляный раствор ретинола ацетата (витамин А) и α- токоферола ацетата (витамин Е). Применяют при атеросклеротических изменениях сосудов в/м по 1 мл 1 раз в день в ранних стадиях заболевания в течение 20 дней, во II и III стадиях и при трофических нарушениях тканей 30-40 дней; внутрь по 1-2 капсулы 2-3 раза в день. Противопоказан при тиреотоксикозе, холецистите, недостаточности кровообращения III стадии.

АЕКОЛ (Aecol). Комбинированный препарат: раствор ретинола ацетата в масле — 1,04 г, токоферола ацетат — 0,18 г, (витамин К3)— 0,21 г, каратолин в масле — до 100 мл. Ранозаживляющее средство, нормализующее метаболизм пораженной ткани, ускоряющее процессы регенерации. Показан при лечении гнойно-некротических ран, трофических язв, инфицированных ожогов II и III степени, а также после аутодермопластики. В виде масляных повязок наносят на предварительно очищенные от некротических налетов пораженные участки кожи. Процедуры повторяют через день до появления грануляций и эпитацизации. Возможны местные аллергические реакции.

АЗАКТАМ (Azactam). Синтетический монобактамовый антибиотик, обладающий бактерицидным действием на грамотрицательные микроорганизмы, но нейтральный к грамположительным микроорганизмам и анаэробам; действует и на Pseudomonas aeruginosa, резистентный к пиперациллину, цефоперазону и аминогликозидам. В комбинации с пиперациллином, цефотаксимом или цефоперазином синергистически влияет на Enterobacteriaceae. Применяют для лечения тяжелых осложненных бактериальных инфекций, при мультирезистентности возбудителей инфекции. Доза и способ введения (в/в или в/м) подбираются в зависимости от степени чувствительности микроорганизма-возбудителя, тяжести инфекции и состояния больного. Взрослым при инфекциях мочевых путей: 0,5-1 г каждые 8-12 ч.; тяжелых системных инфекциях: 1-2 г каждые 8-12 ч.; очень тяжелых инфекциях: 2 г каждые 6-8 ч. Максимальная рекомендуемая доза: 8 г/сут. Больным с почечной недостаточностью, находящимся на гемодиализе, а с тяжелыми нарушениями функции печени снижают дозу. Детям старше 1 нед вводят 30 мг/кг каждые 6-8 ч, при тяжелых инфекциях детям в возрасте 2 лет и старше вводят 50 мг/кг каждые 6-8 ч. Азактам нельзя смешивать с другими препаратами и антибиотиками. При лечении возмож-

ны местные реакции, кожные высыпания, ощущение тошноты и диарея. Противопоказан при аллергии на этот препарат; не рекомендован при беременности и в период лактации.

АЗАЛЕПТИН (Asaleptinum). Синонимы: лепонекс, клозапин. Нейролептик с успокаивающим и антипсихотическим эффектом. Применяют у взрослых при острых и хронических формах шизофрении, маниакальных состояниях, маниакально-депрессивном психозе, психомоторном возбуждении, различных психотических состояниях. Внутрь после еды 2-3 раза в день. Разовая доза 0,05-0,2 г, суточная—0,2-0,4 г, высшая суточная доза 0,6 г. Дозу устанавливают индивидуально, при нарушении функции почек и сердца, цереброваскулярных расстройствах суточные дозы 0,025-0,2 г. Возможны мышечная слабость, сонливость, спутанность сознания, сухость во рту, ортостатическая гипотензия, тахикардия, повышение температуры тела, нарушение аккомодации, в некоторых случаях—гиперсаливация. В связи с возможностью развития гранулоцитопении требуется систематический контроль за кровью. Противопоказан при остром алкогольном и других интоксикационных психозах, спазмофилии, эпилепсии, тяжелых заболеваниях печени, почек, сердечно-сосудистой системы, заболеваниях кроветвор-

ной системы, глаукоме, аденоме предстательной железы, атонии кишечника, первых 3 мес беременности. Во время лечения недопустимо выполнять работу, требующую повышенного внимания и быстрой психической и двигательной реакции (вождение транспорта).

АЗАФЕН (Azaphenum). Оказывает седативное действие при астенодепрессивных и тревожно-депрессивных состояниях различной этиологии. Внутрь по 0,025 г 4 раза в сутки, суточные терапевтические дозы могут составлять 0,15-0,2 г. В редких случаях отмечаются головокружение, тошнота, рвота. Нельзя применять одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы.

АЗЛОЦИЛЛИН (Azlocillin Sodium). Синоним: секуропен, азлин. Антибиотик группы ацилуреидопенициллинов, оказывающий бактерицидное действие на большое число патогенных грамотрицательных, индолположительных и грамположительных микроорганизмов. Не устойчив в отношении β-лактамаз, синергизм с аминогликозидными антибиотиками. Применяют при урогенитальных инфекциях, септических состояниях различного происхождения, инфекциях костей и мягких тканей, респираторных, желчных, желудочно-кишечных инфекциях, серозитах, инфицированных обширных

участках ожогов и др. Для местного промывания в виде дренажа — при остеомиелите, плевроэмпиеме, гнойных полостях, свищах. Средняя суточная доза для взрослых — от 8 г (по 2 г — 4 раза) до 15 г (по 5 г — 3 раза), при тяжелых инфекциях 20 г в сутки (по 5 г — 4 раза). Средняя суточная доза для новорожденных — по 100 мг/кг массы тела 2 раза; для детей 1 года — по 100 мг/кг 3 раза; для детей от 1 — 14 лет — по 75 мг/кг 3 раза. Продолжительность лечения — не менее 3 дней после нормализации температуры и исчезновения клинических симптомов. В виде 10% водного раствора вводят в/в (струйно или капельно). В редких случаях возможны легкие аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства.

АИРА КОРНЕВИЩЕ (Rhizoma Calami). Применяют для повышения аппетита и улучшения пищеварения в виде настоя (10,0•200,0) по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

АЙМАЛИН (Ajmalinum). Синоним: Gilurytmal. Применяют в качестве противоаритмического средства при различных нарушениях ритма (предсердная и желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия и др.), аритмиях, вызванных дигиталисной интоксикацией, и при свежем инфаркте миокарда. В/м 0,05-0,15 г/сут; для купирования острого

приступа тахикардии в/в 2 мл 2,5% раствора в 10 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы. По устранении аритмии внутрь по 0,1 г 3-4 раза в день. Могут возникать слабость, тошнота, рвота, понижение АД, аллергические реакции; при в/в введении—ощущение жара. Противопоказан при тяжелых нарушениях проводящей системы сердца, выраженной сердечной недостаточности, [illegible]потонии, воспалительных изменениях миокарда.

АКТОВЕГИН ([illegible]ovegin). Комбинированный препа[illegible]. 1 ампула содержит депротеинизир[illegible] гемодериват из телячьей крови ([illegible]ствует 80 мг сухого веса), р-[illegible]ловый эфир гидроксибензойной [illegible] (0,34 мг), р-метиловый спирт [illegible] бензойной кислоты (1,26 мг), воду [illegible]ъекций (до 2 мл). Синоним: сол[illegible]. Улучшает поглощение кислорода на клеточном уровне и способствует накоплению питательных веществ в клетке. Применяют при нарушениях церебрального метаболизма и кровообращения (черепно-мозговые травмы), периферического артериального и венозного кровообращения; заболеваниях артерий, язвах голени; трансплантации кожных покровов, ожогах, осложнениях при заживлении ран (инфицирование ран, пролежни); лучевых повреждениях кожи и слизистой (профи-

лактика и лечение). Вводят в/в, внутриартериально или в/м. В первых двух случаях начальная доза составляет 10-20 мл или дополнительно с инфузией. Для поддерживающей терапии назначается 2-4 мл ежедневно либо несколько раз в неделю. При в/м применении медленно вводится не более 5 мл, т. к. раствор обладает гипертоническими свойствами. Не следует применять вместе с другими инфузионными растворами, кроме изотонического физиологического раствора и 5% раствора глюкозы. У сверхвосприимчивых пациентов возможны аллергические реакции (крапивница, неожиданное ощущение жара, повышение температуры, шок). Противопоказан при аллергии на актовегин или подобные препараты.

АЛАНТОН (Alantonum). Противовоспалительное средство, применяемое при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивных гастритах и пилородуоденитах. Внутрь по 0,1 г 3-4 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения 4-6 нед, при нерубцующихся язвах—до 8 нед. Возможно усиление изжоги и боли в животе.

АЛЛАПИНИН (Allapininum). Антиаритмическое средство, применяемое при наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии, пароксизмах мерцания и трепетания предсердий, пароксизмаль-

ной наджелудочковой тахикардии, в том числе синдроме Вольфа—Паркинсона—Уайта; пароксизмальной желудочковой тахикардии. Таблетки, предварительно измельчив, принимают внутрь за 30 мин до еды, запивая теплой водой. Вначале назначают по 0,025 г каждые 8 ч. При отсутствии эффекта дозу увеличивают, назначая по 0,025 г каждые 6 ч. Возможно дальнейшее увеличение дозы до 0,05 г на прием через каждые 6-8 ч. Продолжительность лечения зависит от состояния больного и характера нарушения ритма, может продолжаться до нескольких месяцев. Высшие дозы: разовая—0,15 г, суточная—0,3 г. Возможны головокружение, ощущение тяжести в голове, диплопия. При длительном применении препарата возможна синусовая тахикардия. Противопоказан при атриовентрикулярной блокаде II степени и более высоких степеней, тяжелой печеночной и почечной недостаточности. При атриовентрикулярной блокаде I степени, нарушениях внутрижелудочковой проводимости, синдроме слабости синусового узла, а также при тяжелой недостаточности кровообращения аллапинин следует назначать под более тщательным контролем, начиная лечение в стационарных условиях, чаще осуществляя электрокардиографический контроль. Беременным аллапинин назначают лишь по жизненным показаниям.

АЛЛОПУРИНОЛ (Allopurinolum). Синонимы: Milurit, Apurin. Применяют для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся гиперурикемией и образованием уратных камней (первичная и вторичная подагра, мочекаменная болезнь с образованием конкрементов, содержащих ураты, первичная и вторичная гиперурикемия). Внутрь после еды по 0,1 г 3-4 раза в день, суточная доза может быть увеличена до 0,8 г (в 4 приема). В начале лечения отмечается обострение болезни, иногда диспептические явления, эозинофилия, кожные высыпания, лихорадка. Противопоказан при почечной недостаточности с нарушением выделительной функции, беременности.

АЛЛОХОЛ (Allocholum). Желчегонное средство, применяемое при хронических гепатитах, холангитах, холециститах, первичном запоре. Внутрь по 2 табл. 3 раза в день после еды. Противопоказан при язвенной болезни желудка; острой и подострой дистрофии печени; необходима осторожность при механической желтухе.

АЛМАГЕЛЬ (Almagel). Антацидное, адсорбирующее, обволакивающее средство, применяемое при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических гиперацидных гастритах, эзофагитах и других заболеваниях, сопровождающихся повышенной кис-

лотностью и протеолитической активностью. Внутрь по 1-2 ч. л. 4 раза в день за 30 мин до еды и перед сном. В отдельных случаях возможен запор.

АЛМАГЕЛЬ [illegible] (Almagel-A). Применяют при [illegible] и в тех же дозах, что и [illegible], в случаях, когда они сопровождаются [illegible], тошнотой и рвотой. Пр[illegible] при повышенной чувстви[illegible] к анестезину.

АЛОРОМ [illegible]. Линимент (состав: сок алоэ, [illegible] календулы жидкий, масло [illegible], эмульгатор № 1, ментол, масло [illegible]), обладающий противовоспалительными и рассасывающими свойствами. Применяют в комплексной терапии при посттравматических артритах, плекситах, радикулитах, миазитах, миалгиях, полиартритах, тендовагинитах, наружных гематомах, для профилактики пролежней. Наносят, слегка массируя, на пораженные участки 2-3 раза в день (курс 5-15 дней; повтор через 1-2 нед). Не наносить на поврежденную кожу.

АЛОЭ ЛИНИМЕНТ (Linimentum Aloes). Применяют при ожогах и для предупреждения и лечения поражений кожи при лучевой терапии. Наносят тонким слоем 2-3 раза в сутки на пораженную поверхность и накрывают салфеткой.

АЛОЭ С ЖЕЛЕЗОМ СИРОП (Sirupus Aloes cum Ferro). Применяют при гипохромных анемиях по 1/2 - 1 ч. л. в 1/4 стакана воды 3 раза в день. Курс 15-30 дней.

АЛОЭ СОК (Succus Aloes). Применяют при гастритах, гастроэнтеритах, энтероколитах, запорах. Внутрь по 1 ч. л. 2-3 раза в день за 30 мин до еды; при лечении гнойных ран, ожогов, воспалительных заболеваний кожи наружно.

АЛОЭ ТАБЛЕТКИ (Tabulettae Aloes abductae). Применяют в комплексном лечении прогрессирующей близорукости, миопического хориоретинита по 1 табл. 3-4 раза в день за 15-20 мин. до еды.

АЛОЭ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Extractum Aloes fluidum pro injectionibus). Биогенный стимулятор, применяемый при заболеваниях глаз (прогрессирующая близорукость, миопический хориоретинит, блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела и др.), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астме и др. В течение 15-50 дней под кожу ежедневно вводят по 1 мл (максимальная суточная доза 3-4 мл), детям до 5 лет — 0,2-0,3 мл, старше 5 лет-0,5 мл. Противопоказан при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, беременности после 7

мсс, острых желудочно-кишечных расстройствах, нефрозонефрите.

АЛОЭ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Aloes fluidum). Водный экстракт листьев алоэ — биогенный стимулятор, применяемый внутрь при тех же показаниях, что и для экстракта алоэ для инъекций, по 1 ч. л. 3 раза в день в течение 30-45 дней, 3-4 курса в год.

АЛПИЗАРИН (Alpisarinum). Антивирусный препарат, применяемый при простом герпесе у взрослых. Назначают внутрь по 0,1 г 3-4 раза в сутки в течение 5-10 дней, наружно –местные аппликации 5% мази на кожу, 2% мази—на слизистые оболочки 2-3 раза в день. Курс лечения 10-30 дней.

АЛТЕЯ КОРЕНЬ (Radix Althaeae). Применяется как отхаркивающее и противовоспалительное средство при заболеваниях дыхательных путей; настой (3,0:100,0) и экстракт в микстурах (6,0:200,0) принимают по 1 ст. л. 4-5 раз в день.

АЛЬГИПОР (Algiporum). Комбинированный препарат (гель), содержащий альгин натрия, глюконат кальция и фурацилин. Стимулирует грануляцию тканей и процессы регенерации, способству-

ет эпителизации, ускоряет очищение ран, снижает их инфицированность. Применяют при поверхностных ожогах II-III степени, глубоких ожогах с влажным струпом и обильным отделяемым, вялотекущих послеожоговых ранах и язвах и пролежнях. Накладывают на очищенную раневую поверхность. Повязку меняют по мере ее промокания и рассасывания (через 1-3 сут). Курс лечения от 1 до 10 перевязок. На отдельных участках альгипор не превращается в гелеобразную массу, а уплотняется, образуя корку, удаление которой безболезненна.

АЛЬЦИД-В (Alcid-B). Состав: сок солодки 0,38 г, экстракт ромашки 0,05 г, магния карбонат основной 0,2 г, алюминия гидроксид гель 0,1 г, кора крушины 0,03 г, плод кориандра 0,02 г, плод фенхеля 0,01 г, натрия гидрокарбонат 0,1 г, висмута нитрат основной 0,1 г. Противоязвенное средство с вяжущим действием, понижает кислотность желудочного сока. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических гиперацидных гастритах. Внутрь оп 2 табл. 3 раза в день за 0,5-1 ч до еды (в тяжелых случаях — 4 раза в день). Таблетки разжевать и запить водой. Не употреблять при лечении алкоголя, чая, кофе. При почечной недостаточности принимать под контролем вра-

ча. Не применять длительное время в больших дозах и вместе с антибиотиками.

АМЕДИН (Amedinum). Блокирует центральные и периферические м-холинореактивные системы, оказывает умеренное местно-анестезирующее действие. Применяют при экстрапирамидных расстройствах (болезнь Паркинсона, постэнцефалический паркинсонизм), заикании, связанном с повышенным тонусом речевой и дыхательной мускулатуры. Внутрь по 0,0015 г 1-2 раза в день, при хорошей переносимости: до 0,003 г 3 раза в день с последующим постепенным уменьшением дозы. Детям дозы устанавливают соответственно возрасту. Во время лечения может наблюдаться сухость во рту, нарушение аккомодации, головокружение, учащение пульса. Противопоказан при глаукоме, мерцательной аритмии. Применять с осторожностью при гипертонической болезни, заболеваниях сердца, печени, почек.

АМИДОПИРИН (Amidopyrinum). Синонимы: Pyramidonum, Amidazophen, Aminophenazonum, Novamidon. Обладает жаропонижающим, аналгезирующим и противовоспалительным действием. Применяют при головной боли, невралгии, артритах, миозитах, хорее, остром суставном ревматизме. Внутрь по 0,25-0,3 г 3-4 раза в день (при остром ревматизме

до 2-3 г/сут). Возможны угнетение кроветворения (гранулоцитопения и агранулоцитоз), иногда анафилактические реакции и кожные высыпания. Противопоказан при болезнях крови, индивидуальной непереносимости.

АМИДОПИРИН 0,125 г, БУТАДИОН 0,125 г — ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ. Оказывает противовоспалительное и аналгезирующее действие. Применяют при невралгиях, ишиасе, люмбаго, миозитах, ревматоидных артритах, подагрическом артрите, болезни Бехтерева и др. по 1 табл. 3-4 раза в день. Иногда наблюдаются задержка жидкости в организме, тошнота, рвота, боль в области желудка, учащение стула, кожные сыпи, зуд, крапивница, лейкопения, анемия, геморрагии. Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях кроветворных органов, печени и почек, лейкопении, нарушении сердечного ритма.

АМИЗИЛ (Amizylum). Синонимы: Actozine, Benactyzine, Lucidil. Оказывает спазмолитическое, антигистаминное, антисеротониновое, местно-анестезирующее, седативное и антипаркинсоническое действие. Применяют при неврозах и невротических расстройствах, паркинсонизме; для предупреждения экстрапирамидных

расстройств при нейролептической терапии. Внутрь 0,001-0,002 г 3-4 раза в день, суточная доза может быть увеличена до 0,01-0,012 г. Возможны сухость и анестезия слизистой оболочки рта, тахикардия, расширение зрачков, диспептические явления; при передозировке и плохой переносимости — головная боль, головокружение, эйфория, бессонница, галлюцинации. [illegible] показан при глаукоме.

АМИКАЦИН ([illegible]acinum). Синонимы: [illegible], бриклин. Активный [illegible] аминогликозид, эффективный [illegible] грамположительных и [illegible] грамотрицательных бактерий. [illegible] при инфекциях дыхательного, [illegible] кишечного и мочеполового [illegible], инфекционных заболеваниях [illegible] и подкожной ткани, инфицированных ожогах, бактериемии, септицемии и неонатальном сепсисе, эндокардите, остеомиелите, перитоните и менингите. Вводят в/в или в/м, из расчета 10-15 мг/ (кг•сут) в 2-3 приема. Следует учитывать, что препарат обладает нефро- и ототоксичностью, противопоказан в первой половине беременности.

АМИНАЗИН (Aminazinum). Синонимы: Chlorpromazine, Megaphen. Нейролептик с выраженным седативным, а так-

же противорвотным, гипотермическим, гипотензивным, антигистаминным действием. Применяют при психических заболеваниях, сопровождающихся психосоторным возбуждением. Внутрь после еды по 0,025-0,05 г 1-3 раза в день (до 0,6 г/сут); в/м 1-5 мл 2,5% раствора; при остром психическом возбуждении в/в 2-3 мл 2,5% раствора в 20 мл 40% раствора глюкозы. Дозы для детей устанавливают в зависимости от возраста. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,3 г, суточная 1,5 г; в/м разовая 0,15 г, суточная 0,6 г; в/в разовая 0,1 г, суточная 0,25 г. При применении возможны гипотензия (вплоть до коллапса), экстрапирамидные нарушения, аллергические реакции, диспептические явления, гепатит. Противопоказан при заболеваниях печени и почек, нарушениях функции желудка, сердечно-сосудистой декомпенсации, выраженной гипотонии.

АМИНАЛОН (Aminalonum). Синонимы: гаммалон, GABA. Применяют при нарушениях функции ЦНС (атеросклерозе с нарушением кровообращения, ослаблении памяти, головной боли, бессоннице и головокружении при гипертонической болезни и др.); в педиатрии при отставании умственного развития. Назначают внутрь по 0,25-0,5 г 2-4 раза в день до еды (суточную дозу можно увеличивать до 4 г); детям 0,5-2 г/сут. Длитель-

ность лечения от 2 нед до 4 мес. При применении возможны чувство жара, нарушение сна, рвота.

АМИНОХИНОЛ (Aminochinolum). Применяют при лямблиозе, кожном лейшманиозе, токсоплазмозе, неспецифическом язвенном колите. Внутрь, после еды. При лямблиозе взрослым 0,15 г 3 раза в день, цикл 5 дней с перерывом 5-7 дней (2-3 цикла). Детям соответственно возрасту. При лейшманиозе взрослым 0,1-0,15 г 3 раза в день, цикл 10-15 дней с перерывом 5-7 дней (2 цикла). Дозы для детей уменьшают соответственно возрасту. При токсоплазмозе взрослым 0,1-0,15 г 3 раза в день, цикл 7 дней (в сочетании с сульфадимезином) с перерывом 10-14 дней (2-3 цикла). При неспецифическом язвенном колите (в комплексе с другими методами) 0,15 г 3 раза в день, цикл 5 дней с перерывом 4-7 дней (3-4 цикла). Возможны слабость, головокружение, головная боль, шум в ушах, диспептические явления, аллергическая сыпь, кожный зуд.

АМИРИДИН (Amiridin). Стимулирует нервно-мышечную передачу импульсов и проведение возбуждения по нервам и гладким мышцам, усиливает действие на гладкие мышцы ацетилхолина, адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина. Применяют при невритах,

полиневритах, полинейропатиях, полирадикулонейропатиях, бульбарных параличах и парезах, в восстановительный период при органических поражениях ЦНС с двигательными нарушениями, при миастениях и миастенических синдромах, в комплексной терапии демиелинизирующих заболеваний, в акушерской практике для родовозбуждения после амниотонии или дородового излияния околоплодных вод. Внутрь 1-3 раза в день, подкожно или в/м 1-2 раза в день. Разовая доза внутрь 0,01-0,2 г или 0,005-0,015 г парентерально. При поражениях ПНС, миастении и миастенических синдромах назначают внутрь по 0,01-0,02 г 1-3 раза в день в течение 1-2 мес или парэнтерально по 0,005-0,01-0,015 г в течение 20-30 дней. Для купирования миастенических кризов и кратковременно для лечения больных с тяжелыми нарушениями нервно-мышечной передачи разовая доза может быть увеличена до 0,03 г введением 2 мл 1,5% раствора препарата однократно или 0,1-0,2 г внутрь (1-2 табл. 5-6 раз в день). Для стимулирования родов вводят в/м или подкожно однократно по 2 мл 0,5% раствора. При недостаточном эффекте инъекции повторяют 1-2 раза с часовым интервалом. Возможно применение препарата внутрь по 1 табл. однократно, при недостаточном эффекте прием повторяют 1-2 раза с ча-

совым интервалом. Возможны гиперсаливация, брадикардия, головокружение, тошнота, рвота, кожно-аллергические реакции (зуд, сыпь). Противопоказан при эпилепсиях, экстрапирамидных заболеваниях с гиперкинезами, стенокардии, выраженной брадикардии, бронхиальной астме, склонности к вестибулярным расстройствам.

АММИАКА РАСТВОР (Solutio Ammonii caustici). Синоним: нашатырный спирт. Применяют для возбуждения дыхания и выведения больных из обморочного состояния (в больших концентрациях возможна рефлекторная остановка дыхания). Наносят на вату или марлю для вдыхания.

АММИФУРИН (Ammifurinum). Смесь трех фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена и ксантотоксина из семян амми большой (Ammi majus L). Оказывает фотосенсибилизирующее действие. Применяют при витилиго, гнездной плешивости. Внутрь по 0,02 г 1-4 раза в день; наружно (смазывают очаги поражения 2% раствором). Возможны головная боль, боль в области сердца и сердцебиение, диспептические явления. Противопоказан при гипертонии, тиреотоксикозе, заболеваниях почек, печени, крови, сердца, ЦНС; не назначают детям до 5 лет.

АММОНИЯ ХЛОРИД (Ammonii chloridum). Синонимы: "нашатырь", Acidamon. Оказывает диуретическое и отхаркивающее действие. Применяют при отеках сердечного происхождения; бронхите, пневмонии. Внутрь после еды по 8-12 г/сут (в несколько приемов). Принимают в виде 2,5-5% водного раствора или порошка. Курс лечения (5-6 дней) при необходимости через несколько дней может быть повторен. Иногда вызывает диспептические явления (тошноту, рвоту, потерю аппетита). Противопоказан при острых поражениях почек.

АМПИОКС (ампиокс натрия) (Ampioxum). Смесь ампициллина натриевой соли и оксациллина натриевой соли в соотношении 2:1. Обладает антибактериальными свойствами входящих в его состав препарата антибиотиков. Устойчив в отношении пенициллиназообразующих стафилококков. Применяют при тяжело протекающих инфекциях (сепсисе, эндокардите, послеродовой инфекции и др.), для профилактики и лечения послеоперационных осложнений и инфекции недоношенных и новорожденных и др. Назначают в/м взрослым до 2 г/сут, детям соответственно возрасту от 10 до 50 мг/кг. Суточную дозу делят на 3-4 инъекции. Возможны аллергические реакции, болезненность в месте введения. Необхо-

дима осторожность при наличии в анамнезе повышенной чувствительности к препаратам пенициллина.

АМПИЦИЛЛИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Ampicillinum-natrium). Синонимы: Pentrexyl, Pentrock. Полусинтетический пенициллин широкого спектра действия. Активен в отношении кокковых микроорганизмов и большинства грамотрицательных бактерий. Быстро всасывается в кровь, проникает в ткани и жидкости организма. Выводится в основном почками. Не обладает кумулятивным свойством. Малотоксичен. Применяют при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, урологических заболеваниях; кишечных инфекциях; септическом эндокардите, менингите, рожистом воспалении и др. Вводят в/м по 250-500 мг 4-6 раз в сутки; при тяжелых инфекциях суточная доза до 10 г и более; детям в зависимости от возраста в суточной дозе: новорожденным 100 мг/кг, в возрасте до 1 года 50 мг/кг, от 1 года до 4 лет 50-75 мг/ кг, старше 4 лет 50 мг/кг. Возможны аллергические реакции. Противопоказан при аллергии к препаратам пенициллина, нарушении функций печени.

АМПИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТ (Ampicillinum trihydras). Действие, показания к применению, противопоказания, побочное действие те же, что и для на-

триевой соли ампициллина. Назначают внутрь по 0,5 г каждые 4-6 ч, при тяжелых инфекциях до 10 г и более в сутки; детям до 13 лет 0,1-0,2 г/(кг•сут). Курс 7-14 дней и более.

АМФОГЛЮКАМИН (Amphoglucaminum). Водорастворимая смесь N-метилглюкаминовой соли амфотерицина В с N-метилглюкамином. Активен в отношении дрожжеподобных грибов и возбудителей глубоких и системных микозов. Применяют при грибковых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и внутренних органов. Внутрь после еды 2 раза в день, 10-14 дней. Взрослым по 200 000-500 000 ЕД, детям до 2 лет—по 25 000 ЕД, от 2 до 6 лет—по 100 000 ЕД, от 6 до 9 лет — по 150 000 ЕД, от 9 до 14 лет — по 200 000 ЕД. При глубоких микозах курс лечения 3-4 нед (можно повторить через 5-7 дней). Может вызвать нарушение функции почек. Противопоказан при индивидуальной непереносимости, заболеваниях почек с нарушением их функции.

АМФОТЕРИЦИН-В (Amphotericinum B). Синонимы: Amfostat, Fungizone. Активен в отношении дрожжеподобных грибов и многих возбудителей глубоких и системных микозов. Плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта и практически нетоксичен при введении внутрь. Как и другие полиеновые антибиотики, обла-

дает значительной токсичностью при в/в введении. Применяют при грибковых заболеваниях, не поддающихся лечению другими противогрибковыми средствами (гистоплазмоз, бластомикоз, криптококкоз, споротрихоз, кандидосепсис и др.). Вводят в/е капельно в течение 4-6 ч. (интервал между введениями не менее 24 ч) из расчета 250 ЕД/кг 2-3 раза в неделю. Доза препарата на курс лечения — 1 500 000-2 000 000 ЕД. Детям назначают по специальной схеме. Содержимое флакона (50 000 ЕД) растворяют в 10 мл воды для инъекций, затем раствор антибиотика переносят при помощи шприца во флакон, содержащий 450 мл стерильного 5% раствора глюкозы (растворяют ex tempore). Возможно снижение аппетита, повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота, снижение АД. Иногда проявляет нефротоксическое действие. Противопоказан при индивидуальной непереносимости антибиотика, заболеваниях печени и почек.

АМФОТЕРИЦИН-В мазь (*Unguentum Amphotericinum B*). Препарат аналогичен амфотерицину В. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-2 раза в день. Курс лечения не менее 10 дней.

АНАВЕНОЛ (*Anavenol*). Венотоническое средство для лечения хронической

венозной недостаточности, язв голени и тромбофлебитов. В течение недели назначают по 20 капель 3-4 раза в день или по 2 драже 3 раза в сутки после еды. Поддерживающая доза — 20 капель 2-3 раза в день после еды в течение 2-3 мес. Противопоказан при кровоточивости.

АНАЛЬГИН (Analginum). Синонимы: Novaldin, Salpyrine. Аналгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное средство, применяемое при лихорадочных состояниях, ревматизме, хорее, болях различного происхождения и др. Внутрь по 0,1-1 г 2-3 раза в день; в/м и в/в по 1-2 мл 25% или 50% раствора 2-3 раза в день. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 1 г, суточная 3 г.

АНАНДРОН (Anandron). Синоним: Nilutamide. Применяют при метастазирующем раке предстательной железы при наличии или отсутствии местного процесса, в комбинации с хирургической или химической кастрацией. Лечение следует начинать непосредственно после хирургической или химической кастрации. Исходная дозировка: 300 мг/день на протяжении 4 нед. Поддерживающая терапия: 150 мг/день. В ходе лечения возможно снижение метаболизма некоторых веществ в печени, например, антивитамина К, фенитоина, пропранолона, хлордиазепоксида, диазепама и теофилина. Не

применять при появлении симптомов интерстициального заболевания легких; при необъяснимых абдоминальных болях и симптомах со стороны органов пищеварения; при необъяснимом снижении гемоглобина (менее 2 г/100 мл). В течении 3 первых мес. лечения проводить подсчет форменных элементов крови. Избегать потребления спиртного, управления транспортными средствами и прочими машинами. Возможны трудность аккомодации глаз, случаи импотенции, потеря либидо и горячие приливы, интерстициальный легочный синдром, тошнота и рвота. Противопоказан при тяжелой степени печеночной недостаточности, тяжелой анемии, не связанной с карциномой.

АНАПРИЛИН (Anaprilinum). Синонимы: Inderal, Obsidan. β-Адреноблокатор, применяемый при аритмии (синусовая и пароксизмальная тахикардия, мерцательная тахиаритмия, экстрасистолия); стенокардии; феохромоцитоме (вместе с α-адреноблокаторами). Назначают внутрь за 15-30 мин до еды по 10 мг 3 раза в день; постепенно увеличивают дозу до 20-40 мг 3-4 раза в день (иногда до 200 мг/сут). Применение может вызывать слабость, брадикардию, гипотонию, симптомы недостаточности кровообращения, бронхоспазм, тошноту, понос, ухудшение сна. Противопоказан при свежем инфаркте миокарда, атриовентрикуляр-

ной блокаде II и III степени, выраженной недостаточности кровообращения, бронхоспазме, сенной лихорадке.

АНАФРАНИЛ (Anafranil). Синонимы: кломипралин, гидифен. Высокоактивный быстродействующий антидепрессант. Применяют при депрессиях различной этиологии и с различной симптоматикой (эндрогенных, реактивных, невротическихларвированных, инволюционных, депрессиях при шизофрении и психопатии, депрессивных настроениях реактивного, невротического и психопатического генеза, навязчивых состояниях и фобиях. Способ применения и дозу подбирают индивидуально. Внутрь в начале лечения по 1 драже 2 раза в день. Дозу постепенно повышают до 4-6 драже в сутки в конце 1 недели лечения. В тяжелых случаях суточная доза может быть увеличена. Поддерживающая доза в среднем 2-4 драже в сутки. В/м вначале вводят 1-2 ампулы в сутки. Каждый день дозу увеличивают на 1 ампулу, доводя суточную дозу до 4-6 ампул. После наступления улучшения в/м введение постепенно сокращают и одновременно переводят больного на прием перпарата внутрь в поддерживающих дозах. В/в, в виде капельных инфузий, препарат вводят в количестве 2-3 ампул (50-75 мг), предварительно растворив в 250-500 мл изотонического раствора натрия хлорида

или 5% раствора глюкозы, в течение 1,5-3 часов 1 раз в сутки. Вливание следует проводить утром в соответствии с суточным ритмом депрессии. После вливания необходимо тщательное наблюдение за больным. Возможны сухость во рту, нарушение аккомодации, задержка мочеиспускания, потливость, мелкий тремор, головокружение, ортостатическая гипотония, кожные аллергические реакции, аритмия, бессоница, временные состояния спутанности и усиление страха. В редких случаях — нарушения функции печени, гиперпирексия, судороги. Противопоказан при сверхчувствительности к трициклическим антидепрессантам, беременности. Относительные противопоказания: глаукома, сердечная недостаточность, аритмии, повышенная склонность к судорогам, расстройства мочеиспускания.

АНДЕКАЛИН (Andecalinum). Очищенный экстракт поджелудочной железы. Расширяет периферические кровеносные сосуды, понижает АД. Применяют при облитерирующем эндартериите, болезни Рейно, вяло заживающих ранах, спазмах сосудов головного мозга, нарушении кровообращения в сетчатке глаза, склеродермии, начальных стадиях гипертонической болезни. Вводят в/м 1 раз в день 10-40 ЕД в течение 2-4 нед; курс повторяют через 2-3 мес. Внутрь перед едой по 2 табл. 3 раза в день. Через 6-10 дней

доза может быть увеличена постепенно до 9-12 табл. в день. Возможны аллергические реакции. Противопоказан при повышении внутричерепного давления.

"АНДИПАЛ" ("Andipalum"). Состав: анальгина 0,25 г, дибазола 0,02 г, папаверина гидрохлорида 0,02 г, фенобарбитала 0,02 г. Болеутоляющее, сосудорасширяющее и спазмолитическое средство; назначают по 1 табл. 2-3 раза в день.

АНЕСТЕЗИН (Anaesthesinum). Синонимы: Aethylis aminobenzoas, Benzocain. Местноанестезирующее средство, применяемое внутрь при боли в желудке, повышенной чувствительности пищевода по 0,3 г 3-4 раза в день, наружно в виде 5-10% мази и присыпок при крапивнице и заболеваниях кожи, сопровождающихся зудом, для обезболивания язвенных и раневых поверхностей; в свечах по 0,05-0,1 г при заболеваниях прямой кишки (трещины, зуд, геморрой); в виде 5-20% масляного раствора для анестезии слизистых оболочек. Противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности.

"АНЕСТЕЗОЛ", СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ ("Anaesthesolum" suppositoria). Состав: анестезина 0,1 г, дерматола 0,04 г, окиси цинка 0,02 г, ментола 0,004 г, жировой основы 2 г. Приме-

няют для уменьшения зуда, боли и спазмов при геморрое по 1-2 суппозитория в день.

АНИСА ПЛОДЫ (Fructus Anisi vulgaris). Применяют как отхаркивающее и слабительное средство в виде настоя (1 ч. л. плодов на стакан кипятка) по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 30 мин до еды, а также в виде масла анисового по 2-3 капли на прием (отхаркивающее).

АНТЕЛЕПСИН (Antelepsin). Противоэпилептический препарат из группы бензодиазепинов, обладающий ярко выраженным антиконвульсивным и ослабляющим напряжение мышц действием, а также гипногенным и анксиолитическим свойствами. Применяют для снижения частоты припадков; антелепсин часто эффективен, когда терапия классическими противоэпилептическими препаратами безуспешна. В зависимости от клинических проявлений, переносимости препарата и возраста больного суточные дозы, распределяемые на 3-4 разовых приема, составляют: для грудных детей — 0,001-0,003 г, детей раннего возраста — 0,002-0,006 г, детей школьного возраста — 0,003-0,003-0,006 г, для взрослых — 0,003-0,008 г. В период лечения запрещается употребление алкоголя. Возможны расстройства координации движений при ходьбе, раздражительность, депрессия, утомляемость.

АНТЕОВИН (Anteovin). Комбинированный препарат, содержащий левоноргестрел и этинилэстрадиол. Бифазный противозачаточный гормональный препарат, тормозящий овуляцию, применяемый для предупреждения беременности. Внутрь по табл. в день вечером с 5-го дня от начала менструации в течение 21 дня по 1 табл. в день, пока необходимо предупреждение беременности. Вначале принимают 11 белых таблеток (одна содержащих 0,05 мг левоноргестрела и 0,05 мг этинилэстрадиола), а затем 10 розовых (0,125 мг левоноргестрела и 0,05 мг этинилэстрадиола). Интервал между приемом разных таблеток не должен превышать 36 ч. Возможны диспепсические явления, напряженность груди. Особую осторожность следует проявить при варикозном расширении вен, эпилепсии, гипертонии, сахарном диабете, психических заболеваниях с депрессией. При планировании беременности препарат отменяют за 3 мес.

АНТИПИРИН (Antipyrinum). Синонимы: Analgesin, Phenazonum. Анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное средство, применяемое при невралгии, ревматизме, хорее, простудных заболеваниях. Назначают внутрь по 0,25-0,5 г (детям старше 6 мес по 0,03-0,25 г) 2-3 раза в день. Местно в виде 10-20% растворов как кровоостанавливающее средст-

во. При повышенной индивидуальной чувствительности возможны кожные высыпания.

"АНТИПСОРИАТИКУМ", МАЗЬ (Unguentum "Antipsoriaticum). Применяется для лечения хронических форм псориаза. Втирают в очаги поражения 1 раз в день, курс 6 дней; лечение повторяют 3-4 раза с однодневным перерывом. Противопоказан при повышенной чувствительности к препарату, поражениях печени и почек, раздражении кожных покровов, обширном распространении процесса.

"АНТИСТРУМИН" (Antistruminum). Применяют для предупреждения эндемического зоба по 1 табл. 1 раз в неделю; при диффузных формах зоба по 1-2 табл. в день 2-3 раза в неделю.

"АНУЗОЛ", СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ (Suppositoria "Anusolum"). Состав: экстракта красавки 0,02 г, ксероформа 0,1 г, цинка сульфата 0,05 г, глицерина 0,12 г, жировой основы 2 г. Применяют как спазмолитическое, болеутоляющее средство при геморрое и трещинах заднего прохода по 1 суппозиторию 2-3 раза в день.

АПИЗАРТРОН (Apisarthron). Препарат пчелиного яда, применяемый в качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства при миозитах, невралгиях и полиартритах для растирания

АПИЛАК (Apilacum). Сухое вещество нативного маточного молочка. Биогенный стимулятор, применяемый при гипотрофии и анорексии (у детей грудного и раннего возраста), гипотонии, нарушении питания у реконвалесцентов, невротических расстройствах, нарушениях лактации в послеродовом периоде, себорее кожи лица. Назначают: детям от 0,0025 г до 0,005 г в виде суппозиторией 3 раза в сутки в течение 7-15 дней; Взрослым сублингвально по 0,001 г 3 раза в день в течение 10-15 дней; при себорее кожи лица кремы, содержащие 0,6% препарата. При повышенной индивидуальной чувствительности возможны нарушения сна. Противопоказан при болезни Аддисона, идиосинкразии к препарату.

"АПИЛАК" МАЗЬ (Unguentum "Apilacum"). Содержит 3% апилака. Применяют при себорее кожи лица, себорейной и микробной экземе, кожном зуде, нейродермите; опрелости.

"АПИФОР" (Apiphorum). Противовоспалительное и болеутоляющее средство, содержащее 0,001 г лиофилизированного пчелиного яда в 1 табл. Применяют при полиартритах, миозитах, радикулитах, заболеваниях периферических сосудов (эндартериит и др.), келоидных рубцах после ожогов и др. Путем электрофореза (1 табл. непосредственно перед упот-

реблением растворяют в 20 мл дистиллированной воды) с обоих полюсов при силе тока 10 мА. Курс лечения 15-20 процедур. При повышенной чувствительности возможны аллергические реакции. При индивидуальной непереносимости пчелиного яда, заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы, надпочечников, диабете, новообразованиях, тяжелых инфекционных заболеваниях, сепсисе, кахексии, декомпенсации сердечно-сосудистой системы, заболеваниях крови.

АПОНТИ (Aponti). Свободный от фенилаланина специальный гидролизат из коровьего молока, включающий соли кальция,m калия, магния, железа, цинка, марганца, натрия, фтора, йода, тироксин, витамины. Средство балансирующей диеты для дополнительного питания детей и подростков, страдающих фенилкетонурией. Внутрь во время еды, предварительно смешав с пищей. Доза зависит от веса пациента и его индивидуальной восприимчивости. Суточную дозу устанавливает врач. Принимать в 3-5 приемов.

АПРЕССИН (Apressinum). Синонимы: Apresoline, Hydralazine. Понижает АД, оказывает адренолитическое и симпатолитическое действие. Применяют при гипертонической болезни, в том числе злокачественной гипертонии, более

эффективен на ранних стадиях заболевания. Назначают при эклампсии; при почечной недостаточности. Внутрь после еды. Начальную дозу 0,01 г 2 раза в сутки постепенно увеличивают до 0,025 г 4 раза в день. Курс — несколько недель с постепенным уменьшением дозы. В ходе лечения возможны тахикардия, боль в области сердца, головокружение, головная боль, ортостатический коллапс, тошнота, рвота, сыпь, отеки различной локализации, потливость, слезотечение, повышение температуры. При длительном приеме иногда развивается синдром, напоминающий системную красную волчанку. Противопоказан при выраженном атеросклерозе.

АПРОФЕН (Aprophenum). Оказывает выраженное периферическое и центральное холинолитическое действие. Применяют при эндартериите, ангиоспазмах, слабости родовой деятельности, спастической дискинезии желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, спастических колитах, холециститах. Назначают внутрь после еды по 0,025 г 2-4 раза в день; подкожно или в/м 0,5-1 мл 1% раствора. Высшая разовая доза для приема внутрь 0,03 г, суточная 0,06 г. Иногда наблюдается сухость во рту, нарушения аккомодации, головокружение,

чувство опьянения, слабость, сонливость. Противопоказан при глаукоме.

АРАЛИИ НАСТОЙКА (Tinctura Araliae). Настойка (1:5) на 70% спирте из корней (Aralia Manshurica Rupp. et Maxim). Применяют как стимулятор ЦНС при гипотонии, астении, депрессивных состояниях по 30-40 капель 2-3 раза в день. Противопоказан при бессоннице, повышенной нервной возбудимости, гипертонической болезни.

АРЕНАРИН (Arenarinum). Антибактериальный препарат, стимулирующий регенеративные процессы в тканях глаза. Применяют при термических и химических ожогах глаз, эрозиях и язвах роговицы. 1 [illegible] аренарина закладывают за нижнее веко глаза 3-4 раза в сутки ежедневно в течение 6-8 дней.

АРМИН (Arminum). Активный антихолинэстеразный препарат, применяемый как миотическое и противоглаукомное средство. Закапывают в глаза (0,01% раствор) по 1-2 капли 2-3 раза в день.

АРНИКИ НАСТОЙКА (Tinctura Arnicae). Извлечение 1 : 10 на 70% спирте из цветков арники, используемое как гемостатическое средство в акушерской и гинекологической практике при недостаточном обратном развитии матки и вос-

палительных заболеваниях, а также в качестве желчегонного средства по 30-40 капель 2-3 раза в день до еды.

АРПЕНАЛ (Arpenalum). Блокатор н- и м-холинореактивных систем. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазме, желчнокаменной болезни, почечной и печеночной колике, бронхиальной астме, паркинсонизме и др. Внутрь по 0,05-0,1 г 2-4 раза в день. Курс 3-4 нед. Возможны головокружение, головная боль, чувство опьянения, сухость во рту, нарушение аккомодации. Противопоказан при глаукоме.

АРТЕПАРОН (Arteparon). Мукополисахарид эфирасерной кислоты. Нормализует трофику хрящевой ткани. Применяют при артрозе тазобедренного, коленного и малых суставов, дегенеративных заболеваниях позвоночника и дегенеративных изменениях хряща коленной чашечки, последующем лечении после удаления мениска, ограничении подвижности в плечевом суставе. В/м, подкожно по 1 мл 2 раза в неделю (через 3-4 дня); курс — 7-8 нед. (всего 15 инъекций). Повторять курс можно не раньше, чем через 3 мес. Для стабилизаций результата лечения можно делать отдельные инъекции с промежутками от одной до нескольких недель. При периартропатии вводят по 1 мл

в суставную капсулу 2 раза в неделю с промежутками в 3-4 дня на протяжении 2-3 нед. Острые воспалительные процессы в суставах перед применением внутрисуставных инъекций артепарона следует лечить специфическими противовоспалительными средствами. Возможны сенсибилизация; головная боль, испарина, тошнота, одышка после инъекции (через несколько минут или часов), что требует немедленной отмены препарата, тромбоэмболические процессы; перекрестная сенсибилизация с гепарином и гепариноидами; обратимое выпадение волос; кожная геморрагия и кровотечение из слизистых; временные реакции в суставе. Противопоказан при повышенной опасности кровотечения, геморрагическом диатезе.

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (Acidum ascorbinicum). Синоним: витамин С. Способствует регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертывания крови, нормальной проницаемости капилляров, образованию стероидных гормонов, синтезу коллагена и проколлагена. Повышает устойчивость организма к инфекциям. Применяют при авитаминозе и гиповитаминозе С (профилактика и лечение); геморрагических диатезах; кровотечениях (носовых, легочных, печеночных, маточных и др.); инфекционных заболеван-

ях; интоксикации; заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ахилия, язвенная болезнь, энтероколиты); для профилактики и лечения цинги; при болезни Аддисона; повышенной физической и умственной нагрузке. Взрослым для профилактики внутрь 0,05-0,1 г 1 раз в сутки, для лечения 0,05-0,1 г 3-5 раз в день. Парентерально вводят в виде аскорбината натрия по 1-3 мл 5% раствора. Разовая доза не выше 0.2 г, суточная 0,5 г. Детям внутрь - для профилактики по 0,02-0,03 г/сут; для лечения по 0,05-0,1 г 1-2 раза в день, парентерально 1-2 мл 5% раствора в день в течение 2-3 нед. Возможны угнетение инсулярного аппарата поджелудочной железы, глюкозурия, угнетение синтеза гликогена. Противопоказан при тромбофлебитах, наклонности к тромбозам.

"АСКОФЕН" ("Ascophenum"). Состав: кислоты ацетилсалициловой 0,2 г, кофеина 0,04 г, фенацетина 0,2 г. Применяют в качестве болеутоляющего и жаропонижающего средства по 1 табл. 2-3 раза в день.

"АСПАРКАМ" ("Asparcanum"). Синоним: панангин. Смесь калия аспарагината и магния аспарагината по 0,175 г. Регулирует электролитный баланс в организме. Применяют при сердечной недостаточности, ишемической болезни серд-

..., инфаркте миокарда, аритмии, гипокалиемии. По 1-2 табл. 3 раза в день после еды курсами по 3-4 нед. У больных, страдающих анацидным гастритом или холециститом, могут возникнуть неприятные ощущения или жжение в подложечной области. Противопоказан при острой и хронической недостаточности почек, гиперкалиемии, нарушении атриовентрикулярной проводимости (блокада).

АСПИЗОЛЬ (Aspisol). Сухой препарат для инъекционных растворов, содержит лизин-моно-(ацетил-салицилат). Оказывает обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Применяют при болевом синдроме, требующем парэнтерального введения аналгезирующего средства, послеоперационных, посттравматических, ревматических болях в мягких тканях и суставах, периартрите, радикулитах, злокачественных заболеваниях, висцеральных болях (почечных и желчных коликах — вместе со спазмолитиками), остром панкреатите, гипертермии церебрального, инфекционного и неопластического генеза, послеоперационной лихорадке, тромбоэмболических и воспалительных заболеваниях сосудов (например, при тромбофлебите). Раствор вводят в/м; 1 флакон содержит 0,9 г сухого препарата, что соответствует 0,5 г ацетилсалициловой кис...

лоты и 0,1 г глицирина. 1 ампула с растворителем содержит 5 мл воды для инъекций. При сильных болях возможно введение содержимого 2 флаконов. При повторном применении не следует превышать суточную дозу в 10 флаконов. Обычная суточная доза для детей грудного возраста и старше составляет 10-25 мг ацетилсалициловой кислоты на 1 кг массы тела, что соответствует 0,1-0,25 мг готового раствора для инъекций (доза может быть разделена на 2-3 приема). Возможны аллергические реакции и приступы астмы, возможны желудочно-кишечные кровотечения. Противопоказан при повышенной чувствительности к салицилатам, геморрагическом диатезе, последние 4 нед. беременности, а также при поражениях почек, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Не следует одновременно назначать кортикоиды, метотрексаты, сахароснижающие пероральные средства, антикоагулаты.

АСТМОПЕНТ (Astmopent). Синоним: Alupent. Стимулируя β - адренорецепторы, оказывает выраженное избирательное бронхорасширяющее действие. Применяют для купирования приступов бронхиальной астмы; при атриовентрикулярной блокаде. Для ингаляций в виде аэрозоля 1-2 вдыхания в момент приступа; при атриовентрикулярной блокаде в/в по 0,5-1 мл 0,05% раствора или по 1-

2 мл в/м. Возможны сухость во рту, тошнота, при в/в введении понижение АД.

АТРОВЕНТ (Atrovent). Синонимы: Normosecretol, Norsecrolo. Применяют для лечения и профилактики дыхательной недостаточности при хроническом обструктивном заболевании дыхательных путей, хроническом обструктивном бронхите при наличии эмфиземы или без нее, бронхиальной астме легкой и средней степени тяжести, особенно у больных с сопутствующими заболеваниями сердца и кровообращения, бронхоспазме при хирургических операциях, а также после них. В качестве дополнительного средства при назначении β- адренергических препаратов, производных ксантина или кортикостероидов при названных заболеваниях. Взрослым и детям старше 3 лет: для профилактики дыхательной недостаточности при хроническом обструктивном бронхите и астме по 1-2 дозы аэрозоля несколько раз в день (в среднем 1-2 дозы аэрозоля 3 раза в день); при дыхательной недостаточности легкой и средней степени — дополнительная ингаляция с помощью 2-3 доз аэрозоля. В отдельных случаях появляется сухость во рту. Противопоказан в первые 3 мес беременности.

АТРОПИНА СУЛЬФАТ (Atropini sulfas). Благодаря способности блокиро-

пать м-холинореактивные системы организма применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пилороспазме, желчнокаменной болезни, холецистите, спазмах кишечника и мочевых путей, печеночной, почечной колике, бронхиальной астме, в офтальмологии для расширения зрачка и др. Внутрь по 0,00025-0,001 г 1-2 раза в день, под кожу по 0,25-1 мл 0,1% раствора, в офтальмологии 1-2 капли для инстилляций 1% раствора. Высшая разовая доза 0,001, суточная 0,003 г. Возможны сухость во рту, сердцебиение, расширение зрачков, нарушение аккомодации, атония кишечника, головокружение, тахикардия, затруднение мочеиспускания. Противопоказан при глаукоме.

"АУРОБИН" МАЗЬ (Unguentum "Aurobini"). Состав: 0,04 г капроната преднизолона, 0,4 г лидокаина гидрохлорида, 0,4 г g-пантенола и 0,02 г триклозана. Уменьшает проницаемость и усиливает тонус сосудистой стенки прямой кишки. Применяют при воспалительных процессах промежностной области (например, зуде заднего прохода, экземе и дерматите промежности, геморроидальных узлах, трещинах заднего прохода). Наносить тонкий слой мази 2-4 раза в день на пораженный участок тела. При продолжительном применении возможны атрофия кожи, гипертрихоз; в случае пе-

редозировки при внутренних геморроидальных узлах — невыраженная брадикардия.

АЦЕКЛИДИН (Aceclidinum). Синоним: Glaucostat. Активное холиномиметическое средство с сильным миотическим действием. Применяют для устранения послеоперационной атонии желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря; в офтальмологии для сужения зрачка и понижения внутриглазного давления при глаукоме. Под кожу по 1-2 мл 0,2% раствора. Высшая разовая доза 0,004 г, суточная 0,012 г. В офтальмологии применяют 3% и 5% глазную мазь. Возможны слюнотечение, потливость, понос. Противопоказан при стенокардии, атеросклерозе, бронхиальной астме, эпилепсии, гиперкинезах, беременности, желудочных кровотечениях.

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (Acidum acetylsalicylicum). Синонимы: Aspirinum, Ruspirin. Оказывает жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие. Применяют при артритах, артралгиях, невралгиях, миалгиях, головной боли, мигрени. По 0,25-1 г после еды 3-4 раза в день. Возможны аллергические реакции, ульцерогенное действие, при длительном применении — анемия. Противопоказан

при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

АЦЕТИЛХОЛИНА ХЛОРИД (Acetylcholini chloridum). Синонимы: Acecoline, Citocholine и др. Применяют в основном в лабораторной практике, иногда как сосудорасширяющее средство при спазмах периферических сосудов, эндартериите, перемежающейся хромоте, спазмах артерий сетчатки и др.; при проведении фармакологических и физиологических исследований. Подкожно и в/м по 0,05-0,1 г 1-3 раза в день. Высшая разовая доза 0,1 г, суточная 0,3 г. При передозировке понижение АД, брадикардия и нарушение сердечного ритма, профузный пот, миоз, резкое усиление перистальтики кишечника. Противопоказан при стенокардии, атеросклерозе, бронхиальной астме, эпилепсии.

АЦЕТИЛЦИСТЕИН (Acetylcystein). Синонимы: Acetein, Fluimucil. Оказывает муколитическое действие, разжижает мокроту и облегчает ее отделение. Применяют при заболеваниях дыхательных путей (бронхитах, пневмониях, бронхоэктазиях, муковисцидозе). Ингаляции по 2-5 мл 20% раствора 3-4 раза в день по 15-20 мин. Возможна тошнота. Необходима осторожность при бронхиальной астме.

АЦИДИН-ПЕПСИН (*Acidin-pepsinum*). Состав: пепсина 1 часть, бетаина гидрохлорида 4 части. Способствует перевариванию пищи. Применяют при гипо- и анацидных гастритах, ахилии, диспепсии. Внутрь во время или после еды в 1/4-1/2 стакана воды по 1-2 табл. 3-4 раза в день; детям от 1/4 табл. до 1 табл. 3-4 раза в день.

АЦИДОТЕСТ (Acidotest). Комплект из драже, содержащего 0,05 г 2,4-диамино-4 - этокси-азобензола, и 2 табл., содержащих по 0,2 г кофеина бензоата натрия. Диагностическое средство для определения кислотности желудочного сока. После опорожнения мочевого пузыря дают 1-2 табл. и через час исследуют мочу; затем дают 3 драже и через 1 1/2 ч исследуют вторую пробу мочи. Колориметрическое исследование проводят в соответствии с прилагаемой инструкцией.

"АЭРОВИТ" ("Aerovitum"). Состав: ретинола ацетата 0,00227 г (6600 МЕ), тиамина хлорида 0,002 г (или тиамина бромида 0,0258 г), рибофлавина мононуклеотида 0,002 г, пиридоксина гидрохлорида и кальция пантотената по 0,01 г, цианокобаламина 0,025 мг, кислоты аскорбиновой 0,1 г, токоферола ацетата 0,02 г, никотинамида 0,015 г, рутина 0,05 г, кислоты фолиевой 0,5 мг. Поливитаминный препарат, применяемый для

предупреждения витаминной недостаточности (особенно у лиц, подвергающихся вибрации, укачиванию, перегрузкам и т. д.), а также с целью профилактики атеросклероза. Назначают по 1-2 табл. в сутки.

"АЭРОН" ("Aeronum"). Состав: скополамина камфорнокислого 0,0001 г, гиосциамина камфорнокислого 0,0004 г. Обладает м-холинолитической активностью. Применяют для профилактики и лечения морской болезни и приступов болезни Меньера: для уменьшения слюноотделения при стоматологических операциях. Внутрь по 1 табл. на прием. Возможны сухость во рту, нарушение аккомодации, сердцебиения. Противопоказан при глаукоме.

БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО ТРАВА (Herba Ledi Palusris). Содержит ледол; гликозид арбутин, дубильные вещества. Применяют в качестве отхаркивающего и бактерицидного средства при хроническом бронхите и других заболеваниях легких, сопровождающихся кашлем, коклюше в виде настоя (10:200) по 1 ст. л. 3 раза в день.

БАКТИСУБТИЛ (Bactisubtil). Синонимы: Bacitracin, Orobicln, Subticetin. Чистая сухая культура бациллы штамма IP 5832 с вегетативными спорами в коли-

честве не менее 1 млрд в одной капсуле. Энтероантисептическое средство, применяемое при поносе у детей и взрослых, колите, энтерите, сопровождающемся поносом, нарушениях ферментации (метеоризме). Ежедневно детям до 3 лет по 3-4 капсулы; от 3 лет по 4-6 капсул; при диарее по 4-6 капсул ежедневно независимо от от возраста.

БАКТРИМ (Bactrim). Синонимы: Biseptol, Septrin. Состав: триметоприма-0,08 г, сульфаметоксазона-0,4 г. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Применяют при инфекциях верхних дыхательных путей, бронхитах, пневмониях, абсцессе легкого, гнойном плеврите, инфекциях мочевыводящих путей, гнойных инфекциях кожи, инфицированных ранах, для профилактики послеоперационных осложнений. Назначают внутрь после еды. Взрослым — по 2 табл. 2 раза в день; через 2 нед — по 1 табл. 2 раза в день; в очень тяжелых случаях — по 3 табл. 2 раза в день; детям в возрасте 2-5 лет — по 2 табл. (по 0,12 г) 2 раза в день; 6-12 лет — по 4 табл. (0,12 г) или по 1 табл. (0,48 г) 2 раза в день. Возможны рвота, аллергические реакции, Противопоказан при нарушениях функции печени и почек, беременности, новорожденным в первые недели жизни.

БАКТРИМ (СУСПЕНЗИЯ) (Bactrim). Состав (на 5 мл суспензии): сульфаметоксазол — 0,2 г; триметоприм — 0,04 г. Высоко эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе устойчивых к сульфаниламидным препаратам; быстро всасывается при приеме внутрь. Максимальная концентрация в крови отмечается через 1-3 ч и сохраняется в течение 7 ч. Применяют при септицемии, инфекциях дыхательных, мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами и др. Внутрь после еды (утром и вечером). Дозы в зависимости от возраста ребенка: от 6 нед до 5 мес — по 1/2 ч. л. 2 раза в день; от 6 мес до 5 лет — по 1 ч. л. 2 раза в день; от 5 до 12 лет — по 2 ч. л. 2 раза в день. Возможны рвота, аллергические реакции, лейкопения и агранулоцитоз. Лечение проводят под контролем картины крови. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам.

БАЛИЗ-2 (Blysum-2). Препарат (0,8% водный раствор), получаемый путем ферментации сахаромицетов. Активен в отношении стафилококков, в меньшей степени протея и синегнойной палочки; стимулирует репаративные процессы в ране, способствует отторжению некротических тканей, разжижает гной.

Применяют при ранах, свежих и инфицированных ожогах, посттравматических остеомиелитах, трофических язвах различной этиологии, флегмонах, абсцессах, фурункулах, карбункулах, аутотрансплантации тканей. Накладывают на раны обильно смоченные салфетки, промывают раны с помощью ирригатора. Применяют 1-2 раза в день (курс 7-40 дней). Возможно местное раздражающее действие (болезненность). В этих случаях накладывают на несколько минут салфетку, смоченную 2% раствором новокаина.

БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" (Balsamum "Stella auraria"). Содержит масла: гвоздичное, эвкалиптовое, мятное, корицы. Применяют при респираторных заболеваниях, гриппе, головной боли, головокружении, насморке, укусах насекомых. При головной боли, головокружении втирать бальзам в лобную, височную, затылочную области; при простуде, гриппе, респираторных заболеваниях — ингаляции горячим водным раствором; при укусах насекомых смазать место укуса.

БАРАЛГИН (Baralginum). Оказывает выраженное спазмолитическое и болеутоляющее действие. Применяют при спазмах гладкой мускулатуры, особенно почечной колике, спазмах мочеточников, тенезмах мочевого пузыря, печеночной

колике, спазмах желудка и кишечника. Внутрь по 1-2 табл. 3 раза в день, в тяжелых случаях — в/в медленно 5 мл. Возможны аллергические реакции, при длительном применении гранулоцитопения (требует отмены препарата).

БАРБАРИСА ОБЫКНОВЕННОГО ЛИСТЬЕВ НАСТОЙКА (Tinctura foliorum Berberidis vulgaris). Спиртовое извлечение 1:5 на 40% спирте. Вызывает сокращение гладкой мускулатуры матки и сужение сосудов, несколько ускоряет свертываемость крови. Оказывает умеренное желчегонное действие. Применяют при атонических кровотечениях в послеродовом периоде и при субинволюции матки, а также кровотечениях, вызванных воспалительными процессами. Внутрь по 30-40 капель 2-3 раза в день в течение 2-3 нед. Противопоказан при беременности.

БАРБИТАЛ (Barbitalum). Синонимы: веронал, Aethybarbital, Barbitural. Успокаивающее и снотворное средство, применяемое при бессонице, психомоторном возбуждении. Внутрь по 0,3-0,5 г. Высшая разовая доза для взрослых 0,5 г, суточная 1 г; для детей 0,25 г. Возможны общая слабость, головная боль, тошнота. Вызывает привыкание. Противопоказан при заболеваниях печени и почек с нарушением выделительной функции.

БАРБИТАЛ-НАТРИЙ (Barbitalum-natrium). Синонимы: мединал, веронал-натрий, Barbital sodium, Barbitalum natrium. Снотворное и успокаивающее средство. Применяют при бессоннице, нервном возбуждении. Внутрь по 0,3-0,75 г/сут, детям по 0,025-0,25 г. Иногда препарат вводят подкожно или в/м по 5 мл 10% раствора или perrectum по 0,5 г. Вызывает привыкание. Противопоказан при заболеваниях печени и почек с нарушением выделительной функции.

"БЕКАРБОН" ("Becarbonum"). Состав: экстракта красавки 0,01 г, натрия гидрокарбоната 0,3 г. Применяют при спазмах кишечника и повышенной кислотности желудочного сока по 1 табл. 2-3 раза в день.

БЕКЛОМЕТ (Beclomet). Синоним: Becotide. Ингаляционный кортикостероид, обладающий противовоспалительным свойством. Применяют только по назначению врача при кортикоидозависимой бронхиальной астме в случае недостаточного эффекта бронходилататоров и интала (но не для купирования приступов). По 1-2 ингаляции 3-4 раза в сутки с интервалом не менее 4 ч (не более 8 ингаляций в сутки). В тяжелых случаях до 12-16 ингаляций. Противопоказан беременным, а также больным туберкулезом; с осторожностью, только под контролем

взрослых назначают детям по 1-2 ингаляции 2-4 раза в сутки.

БЕЛЕННОЕ МАСЛО (Oleum Hyoscyami). Состав: листьев белены, высушенных и крупноизмельченных, 100 г, спирта 95% или 70% достаточное количество, раствора аммиака достаточное количество, масла подсолнечного 1000 г. Применяют при невралгиях, ревматизме наружно для растираний per se или в смеси с хлороформом, скипидаром и др.

БЕЛЛАЗОН (Bellazolum). Состав: ИНГА-17 — 75 мг, суммы алкалоидов красавки 25 мг. Оказывает центральное холинолитическое действие, снимает мышечное напряжение, уменьшает дрожание при паркинсонизме. Назначают внутрь по 3-4 табл. в день с постепенным повышением дозы до 16 табл. в сутки (курс 3-4 мес). Может возникать сухость во рту, тошнота, головокружение, расширение зрачков, тахикардия, затруднение мочеиспускания. Противопоказан при глаукоме.

"БЕЛЛАГИН" ("Bellalginum"). Состав: анальгина 0,25 г, экстракта красавки 0,015 г, натрия гидрокарбоната 0,1 г. Применяют как спазмолитическое, антацидное и аналгезирующее средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся повышенной

кислотностью, спазмами гладкой мускулатуры, болью, внутрь по 1 табл. 2-3 раза в день после еды.

"БЕЛЛАСТЕЗИН" ("Bellasthesinum"). Состав: анестезина 0,3 г, экстракта красавки 0,015 г. Применяют при гастралгии, спазмах кишечника внутрь по 1 табл. 2-3 раза в день.

"БЕЛЛАТАМИНАЛ" ("Bellataminalum"). Состав: фенобарбитала 0,02 г, эрготамина тартрата 0,0003 г, суммы алкалоидов красавки 0,0001 г. По составу и действию на организм аналогичен белласпону и ленбирену. Применяют при повышенной раздражительности, бессоннице, климактерических неврозах, нейродермитах и вегетативной дистонии. Внутрь по 1 табл. 2-3 раза в день.

"БЕЛЛОИД" ("Belloid"). Состав: суммы алкалоидов белладонны 0,0001 г, эрготоксина 0,0003 г, дибутилбарбитуровой кислоты 0,03 г. Оказывает успокаивающее адренолитическое действие. Применяют при функциональных расстройствах ВНС, бессоннице, повышенной раздражительности, синдроме Меньера и др. внутрь по 1 драже 3-6 раз в сутки, после 7 дней лечения перерыв 3-4 дня. В отдельных случаях возможны тошнота, рвота, понос, сухость во рту.

БЕМИТИЛ (Bemithylum). Назначают взрослым для лечения астенических расстройств у больных неврозами и различными неврозоподобными состояниями, в остром периоде и периоде ближайших последствий черепно-мозговых травм, нарушения мозгового кровообращения, а также после хирургических вмешательств. Внутрь после еды по 0,25-0,5 г. Максимальный эффект после однократного приема достигается через 1-2 ч. Суточная доза 0,5-0,1 г. (курс 15-30 дней или 2-3 последовательно проводимых курса длительностью по 3-5 дней с 2-3-дневными интервалами). Возможны тошнота, редко рвота, неприятные ощущения в области желудка и печени, гиперемия лица, насморк, головная боль. Противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности к препарату, гипогликемических состояниях различной этиологии.

БЕНАЛЬГИН (Benalgin). Синонимы: Bebzydamin, Oxinazin. Комбинированный препарат, содержащий анальгин, витамин B1. Обладает обезболивающим, противовоспалительным и антипиретическим свойством. Применяют при миалгиях, миозитах, невралгиях, невритах, головной боли и других болезненных состояниях при простудных заболеваниях. Назначают внутрь по 1-2 табл. 2-3 раза в день. Противопоказан при острых аллергических со-

стояниях, агранулоцитозе, тромбоцитопении.

БЕНЕТАЗОН (Benetazon). Синонимы: трибузон, триметазон. Оказывает антифлогистическое, противоревматическое, анальгетическое и антипиретическое действие; урикозурическое действие наступает постепенно и продолжается долгое время. Применяют при воспалительных заболеваниях сосудистой системы, флебите, тромбофлебите, остром и хроническом тромбозе вен, ревматических заболеваниях. По 1 табл. (250 мг) после еды 4 раза в сутки. Дозу можно увеличить до 1,5 г/сут, т. е. до 6 табл. Противопоказан при лейкопении, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печеночной и почечной недостаточности, беременности.

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ МЕДИЦИНСКИЙ (Benzylii benzoas medicinalis). Применяют при всех видах чесотки наружно в виде 20% водно-мыльной свежеприготовленной суспензии.

БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Benzylpenicillinum-natrium). Соль беззилпеницилиновой кислоты. Оказывает бактерицидное действие; активен в отношении грамположительных микроорганизмов (стафилококки, стрептококки, пневмококки, корине-

бактерии дифтерии, анаэробные спорообразующие палочки, сибиреязвенные палочки), грамотрицательных кокков (гонококки, менингококки), спирохет и актиномицетов. Действует на микроорганизмы, расположенные внутриклеточно. Максимальная концентрация в крови после в/м введения наблюдается через 30-60 мин, при подкожном введении — через 60 мин; через 3-4 ч в крови обнаруживают лишь следы антибиотика. Применяют при заболеваниях, вызванных чувствительными к бензилпенициллину микроорганизмами: пневмонии, септическом эндокардите, сепсисе, инфекциях кожи, мягких тканей и слизистых оболочек, плеврите, перитоните, цисците, септицемии и пиемии, остеомиелите, дифтерии, скарлатине, гонорее, бленорее, сифилисе, сибирской язве, актиномикозе, в акушерско-гинекологической практике, при воспалительных заболеваниях уха, горла и носа и др. В/м и подкожно при среднетяжелом течении инфекции 250 000-500 000 ЕД; суточные дозы 10000 000-20 000 000 ЕД. При тяжелых инфекциях (сепсис, септический эндокардит, менингит и др.) вводят до 10 000 000-20 000 000 ЕД/сут; при газовой гангрене — до 40 000 000-60 000 000 ЕД. Детям до 1 года назначают 50 000-100 000 ЕД на 1 кг массы тела, старше 1 года — по 50000 ЕД/(кг•сут). При тяжелых инфекциях можно суточную дозу

увеличить до 200 000-300 000 ЕД/кг; по жизненным показаниям — до 500 000 ЕД/кг. Суточную дозу распределяют на 4-6 введений. При в/в введении 1 000 000-2 000 000 ЕД растворяют в 5-10 мл воды для инъекций или изотонического раствора натрия хлорида, вводят 1-2 раза в сутки в сочетании с в/м инъекциями; для в/в капельного введения разводят 2 000 000-5 000 000 ЕД в 100-200 мл изотонического раствора натрия хлорида или 5-10% раствора глюкозы. Эндолюмбально в зависимости от характера заболевания вводят взрослым 5 000-10 000 ЕД, детям — от 2 000 до 5 000 ЕД. Разводят препарат из расчета 1 000 ЕД на 1 мл. Аэрозоли назначают 1-2 раза в сутки. 100 000-300 000 ЕД препарата разводят в 3-5 мл дистиллированной воды. Продолжительность ингаляций 10-30 мин. Местно применяют в виде мази на ланолин-вазелиновой основе не менее 2 раз в день. Возможны аллергические реакции: крапивница, повышение температуры, озноб, головная боль, боль в суставах, эозинофилия, отек Квинке, дерматиты, сывороточноподобные реакции (лихорадка, артралгия, лимфаденопатия), в редких случаях анафилактический шок. Противопоказан при аллергии к бензилпенициллину, эпилепсии (при эндолюмбальном введении).

БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА КАЛИЕВАЯ СОЛЬ (Benzylpenicillinum-kalium). Фармакологическое действие, показания к применению, способ применения и до-

зы, побочное действие те же, что и для бензилпенициллина натриевой соли, но назначают препарат в основном в/м, под кожу, а также местно (аэрозоли, глазные капли и мази). Эндолюмбально и в/в не вводят.

БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА НОВОКАИНОВАЯ СОЛЬ (Benzylpenicillinum-novocainum). Синонимы: Biocillin, Crystacillin, Novocillin, Procain-penicillin. Фармакологическое действие, показания к применению, способ применения и дозы, побочное действие те же, что и для бензилпенициллина натриевой соли. В отличие от него препарат медленно всасывается и при в/м введении оказывает пролонгированное действие. При растворении в воде образует суспензию. После инъекций суспензии терапевтическая концентрация в крови сохраняется до 12 ч. Применяют только в/м 1-2 раза в сутки по 300 000-600 000 ЕД. Высшие суточные дозы для детей до 2 лет 50 000 ЕД/кг, от 2 до 7 лет 250 000 ЕД, от 7 до 14 лет 500 000 ЕД. Для введения необходимо пользоваться иглой диаметром 0,8 мм.

БЕНЗОБАМИЛ (Benzobamylum). Синонимы: бензамил, бензоилбарбамил. Обладает противосудорожным, снотворным и гипотензивным седативным действием, менее токсичен, чем бензонал и фенобарбитал. Применяют при эпилеп-

сии, преимущественно с подкорковой локализацией очага возбуждения, "диэнцефальной" форме эпилепсии, эпилептическом статусе у детей. Внутрь после еды взрослым 0,05-0,2 г (до 0,3 г) 2-3 раза в сутки, детям в зависимости от возраста от 0,05 до 0,1 г 3 раза в сутки. Можно применять в комплексе с дегидратационной, противовоспалительной и десенсибилизирующей терапией. В случае привыкания бензобамил можно временно комбинировать с эквивалентными дозами фенобарбитала и бензонала (эквивалентное соотношение бензобамила и фенобарбитала 2-2 1/2 г : 1 г). Большие дозы могут вызвать сонливость, вялость, понижение АД, атаксию, нистагм, затруднение речи. Противопоказан при поражении почек и печени с нарушением их функции, декомпенсации сердечной деятельности.

БЕНЗОГЕКСОНИЙ (*Benzohexonium*). Синоним: *Hexamethonii benzosulfas*. Ганглиоблокирующее средство. Применяют при спазме периферических сосудов, гипертонической болезни, гипертонических кризах, бронхиальной астме, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Внутрь по 0,1-0,2 г 2-3 раза в день; подкожно и в/м 1-1,5 мл 2,5% раствора. Высшая разовая доза внутрь 0,3 г, суточная 0,9 г; подкожно разовая 0,075 г, суточная 0,3 г. Возможны общая сла-

бость, головокружение, сердцебиение, большие дозы могут вызвать ортостатический коллапс, выраженный мидриаз, сухость во рту, атонию мочевого пузыря. Противопоказан при гипотонии, тяжелых паренхиматозных поражениях почек, печени, дегенеративных изменениях в ЦНС, тромбофлебитах.

БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА (Acidium benzoicum). Применяют как антисептическое и фунгицидное средство в виде мазей и присыпок.

БЕНЗОНАЛ (Benzonalum). Синоним: Benzobarbitalum. Оказывает выраженное противосудорожное действие; не дает снотворного эффекта. Применяют при судорожных формах эпилепсии, в том числе кожевниковской эпилепсии, фокальных и джексоновских припадках. Разовая доза (устанавливают индивидуально) для взрослых (внутрь) 0,1-0,3 г, суточная 0,8-1,2 г, для детей в зависимости от возраста: разовая 0,025-0,2 г, суточная 0,15-0,6 г. Возможны сонливость, атаксия, нистагм, дизартрия. Противопоказан при поражении почек и печени с нарушением их функции, декомпенсации сердечной деятельности.

БЕНЗОТЭФ (Benzotephum). Противоопухолевый препарат; по активности аналогичен тиофосфамиду, но менее ток-

сичен. Применяют для лечения рака яичников, молочной железы, легкого; при эпителиомс Возможны лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, а при больших дозах — панцитопения. Противопоказан при терминальной стадии болезни, резком истощении организма, лейкопении и выраженной анемии, а также сопутствующих заболеваниях (активная форма туберкулеза, паренхиматозный гепатит, нефрит и тяжелая недостаточность кровообращения).

БЕНФОТИАМИН (Benphothiaminum). По свойствам близок к тиамину и кокарбоксилазе. Применяют при гиповитаминозе B1 и авитаминозе B1, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, ревмокардите, кардиопатиях при хроническом тонзиллите, хронической недостаточности кровообращения, экстрасистолической аритмии, обострении хронического гепатита с признаками цирроза, сахарном диабете, дерматозах, функциональных расстройствах нервной системы. Внутрь 1-4 раза в день после еды в разовой дозе (для взрослых) 0,025-0,05 г. Дозы для детей от 1 года до 10 лет - 0,01-0,03 г/сут, старше 10 лет - суточная доза 0,03-0,035 г. Курс 15-40 дней

БЕРБЕРИНА БИСУЛЬФАТ (Berberini bisulfas). Алкалоид, содержащийся в листьях и корнях барбариса.

Оказывает желчегонное действие. Применяют при желчегонной болезни, холециститах, дискинезиях желчных путей, хроническом гепатите. Внутрь по 0,005-0,01 г 3 раза в день перед едой. Курс 2-4 нед. Противопоказан при беременности.

БЕРЕЗЫ ПОЧКИ (Gemmae Betulae). Содержат эфирное масло (3-8%), в состав которого входят сесквитерпеновый спирт бетулол (41-47%) и сложный эфир бетулола с уксусной кислотой (30-45%); флавоны, дубильные вещества, смолу. Применяют в качестве мочегонного и дезинфицирующего средства при отеках почечной и сердечно-сосудистого происхождения в виде настоя по 1-2 ст.л. 3 раза в день.

БЕРЛОФЕН (Berlophenum). Синоним: гилофенат. Состав (на 500 г): очищенного от фенилаланина гидролизата казеина 446 г, DL-триптофана 13,5 г, DL-метионина 13,5 г, L-тирозина 27 г, содержание азота - до 10%. Создает предпосылки для заметного уменьшения или ликвидации симптомов фенилкетонурии в результате коррекции обмена веществ. Применяют для лечения детей, больных фенилкетонурией. Суточную дозу, рассчитанную индивидуально по данным анализа крови на фенилаланин, дают в 2-3 приема перед едой (большую часть препарата назначают перед обедом).

БЕРОДУАЛ (Berodual). Оказывает бронхорасширяющее действие; применяют для поддерживающей терапии и купированию приступов удушья, при хроническом обструктивном бронхите, эмфизематозном бронхите и бронхолегочных заболеваниях с бронхоспастическим компонентом, а также при хронической избыточной раздражимости бронхов, бронхиальной астме, в частности инфекционного характера. Применяют только по рекомендации врача, для профилактики и при длительном лечении вдыхают по 1-2 дозы ажрозоля 3 раза в день; при приступах удушья - 2 дозы аэрозоля; при недостаточном эффекте вдыхают еще 2 дозы. При передозировке отмечают тремор пальцев, ощущение беспокойства или сердцебиение, сухость во рту; при попадании в глаза развиваются легкие обратимые нарушения аккомодации глаз. Противопоказан в первые 3 мес.беременности.

БЕРОКСАН (Beroxanum). Смесь двух фурокумаринов (ксантоксина и бергаптена), выделенных из пастернака посевного (Pastinaca sativa L.). Фотосенсибилизирующее средство, применяемое при витилиго, гнездной плешивости. Внутрь по 0,02 г 1-4 раза в день за 4, 3, 2 и 1 ч до облучения и местно (втирание 0,5% раствора в очаги поражения). Курс 250-300 табл. Побочное действие и

противопоказания те же, что и у аммифурина.

БЕРОТЕК (Berotec). Синоним: Partusisten. Специфический бронхоспазмолитик и преимущественным воздействием на $\beta 2$-адренорецепторы бронхов. Действие наступает быстро и продолжается в среднем 8 ч; стимулирует дыхание. Применяют для лечения и профилактики дыхательной недостаточности при бронхиальной астме, спастическом астмоидном бронхите, эмфиземе легких. Для купирования острого приступа бронхиальной астмы взрослым и детям школьного возраста назначают 1 дозу аэрозоля. Если через 5 мин дыхание не улучшается, ингаляцию можно повторить. Дальнейшее применение препарата возможно только через 3 ч. Для предупреждения приступа по 1 дозе 3 раза в день, детям школьного возраста - по 1 дозе 2 раза в день. Беременным назначают с осторожностью.

"БЕСАЛОЛ" ("Besalolum"). Состав: экстракта красавки 0,01 г, фенилсалицилата 0,3 г. Применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта внутрь по 1 табл. 2-3 раза в день.

БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО ЦВЕТКИ (Flores Helichrysi arenarii). Препараты содержат флавоновые гликозиды (салипурнозид, изосалипурнозид,

кемпферол, апигенин), смолы, красящие вещества, оказывают желчегонное действие (усиление секреции желчи), ускоряют ток желчи, усиливают секреторную и двигательную функции желудочно-кишечного тракта. [illegible] при желчнокаменной [illegible] при желчно-[illegible] хронических [illegible] путей, [illegible] в виде отвара из [illegible] (10,0 : 200,0) по 1/2 стакана 2-3 раза в день в теплом виде за 30 мин до еды, [illegible] экстракт по 1 г 3 раза в день.

БЕТАЛОК (Betaloc). Блокирует β_1-адренорецепторы. Снижает повышенное артериальное давление в различном положении больного, не вызывая ортостатической гипотензии и нарушений электролитного баланса. Применяют при гипертонической болезни, при легкой и средней тяжести гипертонии в виде монотерапии, а в тяжелых случáях в комбинации с диуретиками и другими гипотензивными препаратами; стенокардии, расстройствах сердечного ритма (синусной тахикардии, пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии), гиперкинетическом синдроме. Дозируется индивидуально: при гипертонии внутрь по 0,1-0,2 г в сутки на один прием либо разделив на два приема утром и вечером; в отдельных случаях дозу повышают либо сочетают препарат с другими гипотензивными

средствами. При стенокардии принимают утром и вечером, разделив на две части суточную дозу 0,1-0,2 г (в тяжелых случаях суточную дозу увеличивают до 0,3-0,4 г). При сердечных аритмиях назначают по 0,05 г утром и вечером, при необходимости суточную дозу доводят до 0,2-0,3 г. Возможны утомляемость, нарушения сна, желудочно-кишечные расстройства, брадикардия, редко - неспецифические кожные реакции и чувство холода в конечностях. Передозировка вызывает выраженную гипотензию и брадикардию (назначают атропин либо в тяжелых случаях норадреналин, допамин). Противопоказан при антриовентрикулярной блокаде II-III степени, сердечной недостаточности, кардиогенном шоке, выраженной брадикардии (ниже 55 в 1 мин). Не назначать вместе с антагонистами кальция, осторожно назначать больным, принимающим инсулин и страдающим астматическими состояниями. Отменяют не менее чем за 48 ч до наркоза. Отменять медленно, поскольку резкое прекращение лечения может вызвать ухудшение состояния больных, особенно с ишемическим поражением сердца.

"БЕТИОЛ" СУППОЗИТОРИИ (Suppositoria "Bethiolum"). Состав: экстракта красавки 0,015 г, ихтиола 0,2 г, жировой основы 1,185 г. Применяют как болеутоляющее и противовоспалительное

средство при геморрое и трещинах заднего прохода по 1 суппозиторию 1-3 раза в день.

БЕФУНГИН (Befunginum). Полугустой экстракт из грибных наростов (березового гриба - чаги), образуемых фитопатогенным паразитом Inonotus Obliguus, с добавлением соли кобальта (1% хлорида или 1,5% кобальта сульфата). Симптоматическое средство, применяемое при злокачественных опухолях различной локализации, а также хронических гастритах и дискинезиях желудочно-кишечного тракта с преобладанием атонии. Внутрь: 2 ч.л. препарата разводят 150 мл подогретой кипяченой воды и принимают по 1 ст.л. 3 раза в день за 30 мин до еды. Лечение длительными курсами (3-5 мес) с перерывами 7-10 дней. При длительном применении возможны диспептические явления.

БИЙОХИНОЛ (Biiochinolum). 8% взвесь йодвисмута хинина в нейтрализованном персиковом или оливковом масле. Дает терапевтический эффект при спирохетозах, а также оказывает противовоспалительное и рассасывающее действие. Применяют при всех формах сифилиса (в сочетании с препаратами пенициллина), несифилитических поражениях ЦНС (арахноэнцефалите, менингомиелите и др.), травмах черепа. В/м в верхний наружный квадрант ягодицы двухмоментным способом. Перед инъек-

цией флакон подогревают в теплой воде и тщательно взбалтывают. При сифилисе вводят 2-3 мл 1 раз в 2-3 дня (из расчета 1 мл в день). Курсовая доза 40-50 мл. Высшая разовая доза для взрослых 3 мл (1 раз в 3 дня). Детям в соответствии с возрастом. При неспецифических поражениях ЦНС по 2 мл через день. Курсовая доза 30-40 мл в зависимости от стадии процесса. Возможны слюнотечение, появление темно-синей каймы по краю десен, гингивиты, стоматиты, дерматиты, висмутовая нефропатия, альбуминурия, полиневриты и неврит тройничного нерва. Противопоказан детям до 6 мес; при заболевании почек, печени, геморрагических диатезах, тяжелых формах туберкулеза, декомпенсации сердечной деятельности, гингивитах, стоматитах, повышенной чувствительности к хинину.

"БИКАРМИНТ" ("Bicarmintum"). Состав: натрия бората 0,4 г, натрия гидрокарбоната 0,4 г, натрия хлорида 0,2 г, ментола 0,004 г. Применяют как антисептическое и противовоспалительное средство для полосканий, промываний и ингаляций при воспалительных процессах верхних дыхательных путей (1-2 табл. на 1/2 стакана воды).

БИКАРФЕН (Bicarphenum). Антиаллергический препарат, сочетающий противогистаминное и противосеротони-

новое действие. Применяют при острых и хронических аллергических заболеваниях — риносинусопатиях, заболевании глаз (химической, косметической, лекарственной аллергии и др.), поллинозе, аллергических осложнениях от применения лекарств, пищевых продуктов, средств бытовой химии; аллергическом и атопическом дерматите, васкулите кожи, нейродермите, красном плоском лишае и др. Внутрь после еды по 50-100 мг 2-3 раза в день. Средняя суточная доза 200-300 мг. При хорошей переносимости суточную дозу увеличивают до 400 мг (курс – 5-15 дней; при необходимости курс повторяют). Возможны сухость слизистых оболочек полости рта, боль в эпигастральной области, диспепсические явления, сонливость, повышение аппетита. Противопоказан при беременности, во время работы водителям транспорта и другим лицам, профессия которых требует быстрой психической и двигательной реакции.

БИЛИГНИН (*Biligninum*). Модифицированный лигнин, получаемый из древесины растений. Связывает желчные кислоты в кишечнике, уменьшает их обратное всасывание и способствует их выведению с калом. Применяют при заболеваниях печени (холестатических гепатитах, билиарных циррозах, внепеченочных частичных нарушениях оттока

желчи) и других заболеваниях, связанных с нарушением обмена и повышением содержания желчных кислот и холестерина в крови. Внутрь по 5-10 г (1-2 ч.л.) 3 раза в день за 30-40 мин до еды, запивая водой. Курс от 7 дней до 3 мес; при необходимости курс повторяют. Возможны диспептические явления, проходящие при уменьшении дозы. Противопоказан больным с полным нарушением желчеотделения.

БИЛТРИЦИД (Biltricid). Синоним: празиквантель, ценариде. Противотрематодное средство. Применяют при шистосомозах, вызванных Schistosoma hemotobium s japonicum, s mansoni; инвазиях, вызванных печеночной и легочной двуусткой. Внутрь 3 раза в день по 25 мг на 1 кг массы тела однодневно. Иногда могут наблюдаться боли в животе, тошнота, головная боль, крапивница и повышение температуры. Не рекомендуют в первые 3 мес беременности и кормящим матерям. При сочетании трематодоза с нейроцистицеркозом лечение следует проводить в стационаре.

БИОСЕД (Biossedum). Водный экстракт из травы очитка большого. Биогенный стимулятор, применяемый как вспомогательное средство, стимулирующее обменные процессы и тканевую регенерацию в офтальмологии, терапии, хирур-

гии и стоматологии. В/м ежедневно по 1-2 мл в течение 20-30 дней. Через 2-4 мес курс можно повторить. В офтальмологии одновременно вводят подконъюнктивально по 0,3-0,5 г в течение 10-25 дней или в виде инстилляций по 2 капли 4-5 раз в день, а также путем электрофореза (3-7 мин ежедневно, до 20 процедур). В стоматологии - аппликации 1-2 раза в день, инъекции в ткань десен или электрофорез. Возможны местные аллергические реакции у детей раннего возраста. Противопоказан при [illegible] язвенной [illegible] и двенадцатиперстной кишки, протекающих с ахилией.

БИСАКОДИЛ (Bisacodyl). Синоним: Dulcolax. Слабительное средство, раздражающее рецепторы кишечника, а также усиливающее выделение слизи и разжижение содержимого кишечника. Применяют при хронических запорах различной этиологии, в том числе у длительно лежащих больных, лиц пожилого и старческого возраста и др. Назначают per os и per rectum взрослым по 1-3 драже на ночь или по 1-2 суппозитория ректально. Дозы для детей в зависимости от возраста. Возможны спазмы желудочно-кишечного тракта. Индивидуальная непереносимость препарата. Противопоказан при ос-

трых воспалительных заболеваниях и варикозном расширении вен прямой кишки.

БИСЕКУРИН (Bisecurin). Состав: этинднола диацетата 0,001 г, этинилэстрадиол 0,05 мг. Оказывает угнетающее влияние на гонадотропную функцию гипофиза, что тормозит овуляцию, а также улучшает функциональное состояние эндометрия. Применяют при эндометриозе, функциональных нарушениях яичников, как контрацептивное средство по медицинским показаниям. Внутрь по 1 табл., начиная с 5-го дня менструации в течение 21 дня. После 7-дневного перерыва курс повторяют. Длительность лечения 6-9 мес; как противозачаточное используют исключительно по назначению врача. Возможны тошнота, головная боль, увеличение массы тела. Противопоказан при длительном применении в юношеском возрасте, при беременности и лактации, выраженных нарушениях функции печени, цереброваскулярных нарушениях, раке молочной железы, фибромиоме.

БИФИДУМБАКТЕРИН СУХОЙ (Bifidumbacterinum siccum). Высушенная взвесь живых бифидобактерий. Обладает антагонистической активностью в отношении шигелл и других патогенных и условно-патогенных микробов. Применяют при острых кишечных инфекциях (острой дизентерии, сальмонеллезе, эшери-

хиозе, вирусной диарее), дисбактериозе кишечника, санации реконвалесцентов; хронических воспалительных заболеваниях тонкого и толстого кишечника (энтероколитах, колитах, в том числе неспецифическом язвенном колите), кишечных дисфункциях на фоне дисбактериоза кишечника, в том числе возникшего после длительной антибиотико-химиотерапии (применение особенно показано детям первого года жизни, в том числе недоношенным, ослабленным и с отягощенным преморбидным состоянием); длительной кишечной дисфункции; стафилококковой инфекции с поражением желудочно-кишечного тракта; при раннем переводе детей грудного возраста на искусственное вскармливание и при вскармливании донорским молоком; при комплексном лечении детей, больных сепсисом, пневмонией и другими гнойно-инфекционными заболеваниями, особенно при наличии любых расстройств функции кишечника; для санации половых путей при воспалительных заболеваниях и предродовой подготовке беременных "группы риска" с нарушением чистоты вагинального секрета до III-IV степени. Препарат во флаконах применяют с первых дней жизни, а в таблетках - с 3-летнего возраста. При кишечных заболеваниях внутрь за 20-30 мин до еды: детям первого полугодия жизни по 3 дозы 2 ра-

за в день, детям от 6 мес и старше по 5 доз 2 раза в день; при хронических колитах и энтероколитах у взрослых по 5 доз 2-3 раза в день. Курс при острых формах заболевания не менее 2 нед, в отдельных случаях в зависимости от клинических и лабораторных показателей - 3-4 нед и более; при затяжном и хроническом течении дизентерии, постдизентерийном колите и при длительной кишечной дисфункции - не менее 4-6 нед. при отсутствии полной нормализации микрофлоры после окончания курса назначают поддерживающую дозу препарата (половину дневной дозы) в течение 1 мес. Курс при неспецифическом язвенном колите, хронических колитах и энтероколитах до 1 1/2 - 2 мес. В акушерско-гинекологической практике - интравагинально по 5-6 доз (флаконная форма) 1 раз в день в течение 5-8 дней. Перед применением препарат разводят кипяченой водой из расчета 1 ч.л. воды на 1 дозу. Таблетки принимают целыми или размельченными, запивая кипяченой водой. Противопоказан при лечении антибиотиками.

БИФИКОЛ СУХОЙ (Bificolum siccum). Высушенная взвесь живых, совместно выращенных бифидобактерий и кишечной палочки штамма М-17. Обладает антагонистической активностью в отношении многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. При-

меняют при острой дизентерии при развитии выраженного дисбактериоза кишечника, сопутствующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, непереносимости химиотерапевтических препаратов; долечивании реконвалесцентов дизентерии, сальмонеллеза и смешанных кишечных инфекций в случае затяжного инфекционного процесса,а также постдизентерийных колитах, затяжной и хронической форме дизентерии, колитах и энтероколитах, неспецифических язвенных колитах, вирусных диареях на фоне дисбактериоза. Принимают за 20-30 мин до еды: детям от 6 мес до 1 года - 1 доза 2 раза в день, от 1 года до 3 лет 2-5 доз 2 раза в день, старше 3 лет и взрослым - 3-5 доз 2 раза в день. Курс при острых формах не менее 2 нед, в зависимости от клинических и лабораторных показателей - 3-4 нед, при состоянии реконвалесценции 21-30 дней, при постдизентерийном колите и длительной дисфункции кишечника - не менее 4-6 нед, при хронических колитах, энтероколитах и неспецифическом язвенном колите до 45-60 дней. При необходимости можно назначать повторные курсы лечения или поддерживающие дозы (половина суточной дозы) в течение 1-1 1/2 мес. Препарат разводят кипяченой водой комнатной температуры непосредственно перед приемом из расчета 1 ч.л. воды на 1 дозу. Таблетки при-

меняют целыми или размельченными, запивая кипяченой водой. Лицам с пониженной кислотностью рекомендуется за 5-10 мин до приема препарата выпить 1/2 стакана минеральной воды (боржоми, ессентуки N 4 или N 17) или раствора гидрокарбоната натрия (1/2 ч. л. на стакан воды). При лечении бификолом не принимать антибиотики.

БИЦИЛЛИН-1 (Bicillinum-1). Синонимы: Benzathin-penicillin, Duapen. По спектру антимикробного действия подобен бензилпенициллину. Вследствие плохой растворимости создает депо пенициллина в организме в течение длительного времени. Не оказывает кумулятивного действия. Малотоксичен. Применяют при заболеваниях, вызванных чувствительными к бензилпенициллину микроорганизмами, а также для профилактики и лечения ревматизма, сифилиса, гонореи и др. В/м 300 000-600 000 ЕД 1 раз в неделю или 1 200 000 ЕД 2 раза в месяц. При ревматизме дозу увеличивают до 2 400 000 ЕД 2 раза в месяц. Детям вводят 1 раз в неделю из расчета 5 000-10 000 ЕД/кг или 20 000 ЕД/кг 2 раза в месяц. Возможны аллергические реакции. Противопоказан при бронхиальной астме, крапивнице, сенной лихорадке, аллергических заболеваниях, а также повышенной чувствительности к препаратам бензилпенициллина.

БИЦИЛЛИН-3 (Bicillinum-3). Антибактериальный спектр действия соответствует бициллину-1, однако отмечается более высокая концентрация препарата в крови в течение первых 3-6 ч, но и более быстрое его выведение из организма, в связи с чем следует вводить его чаще. Показания к применению, побочное действие и противопоказания те же, что и для бициллина-1. В/м взрослым 300 000 ЕД 1 раз в течение 3 дней или 600 000 ЕД 1 раз в 6 дней; при сифилисе вводят 900 000-1 200 000 ЕД.

БИЦИЛЛИН-5 (Bicillinum-5). По антимикробному действию аналогичен бензилпенициллину. Не обладает кумулятивным свойством. Малотоксичен. В первые дни после введения создается высокая концентрация в крови, длительно сохраняющаяся в организме. Применяют при инфекциях, вызванных чувствительными к бензилпенициллину микроорганизмами, при которых необходимо длительное воздействие на возбудителя. Особенно для круглогодичной профилактики рецидивов ревматизма. В/м взрослым 1 500 000 ЕД 1 раз в месяц, детям дошкольного возраста 600 000 ЕД 1 раз в 3 нед, детям старше 8 лет 1 200 000-1 500 000 ЕД 1 раз в месяц. Возможны аллергические реакции. Противопоказан при повышенной чувствительности к пенициллину и новокаину.

БЛЕМАРЕН (Blemaren). Состав из расчета на 100 г гранул: кислота лимонная обезвоженная - 39,90 г, калия гидрокарбонат - 32,25 г, натрия цитрат обезвоженный - 27,85 г. Способствует нейтрализации мочи, позволяет поддерживать pH в пределах 6,6-6,8, что создает оптимальные условия для повышения растворения мочевой кислоты. Длительное применение препарата приводит к растворению мочекислых камней и предотвращает их появление. Применяют при мочекаменной болезни с преобладанием уратов для предупреждения образования мочекислых камней. Дозы устанавливают индивидуально, в среднем 3-6 г (1-2 дозированные ложки) 2-3 раза в день после еды. Препарат разводят в воде или фруктовом соке. Лечение проводят под контролем pH мочи 3 раза в день с помощью индикатора, прилагаемого к препарату. Следует избегать щелочной реакции мочи (pH выше 7,0), так как это способствует образованию фосфатов.

БЛЕОМИЦЕТИН (Bleomycetim). Синоним: Bleocin, Bleomycinum. Антибиотик, обладающий противоопухолевой активностью. Применяют при плоскоклеточном раке кожи, включая рак наружных половых органов, особенно у мужчин; раке пищевода и слизистой оболочки рта, лимфогранулематозе в начальной стадии, предраковых состояниях. Вводят

по 0,015 г в/в, в/м и под кожу. В зависимости от локализации опухоли назначают от 1 до 7 инъекций в неделю. Возможны тошнота, рвота, лекарственная пневмония, ломкость ногтей, выпадение волос, утолщение венозных стенок вокруг места инъекции, боль в области очага новообразования, головная боль, ухудшение мышления, частые позывы на мочеиспускание, сопровождающиеся болью. Противопоказан при беременности.

"БОМ-БЕНГЕ", МАЗЬ (Unguentum "Boum-Benge"). Содержит: ментола 3,9 г (или масла мяты перечной 7,8 г), метилсалицилата 20,2 г, вазелина медицинского 68,9 г, парафина медицинского 7 г (на 100 г). Обезболивающее и противовоспалительное средство, применяемое при инфекционном неспецифическом полиартрите, артрите, экссудативном плеврите, эпидемической плевродинии. Втирать при болях, невралгии.

БОНАФТОН (Bonaphtonum). Обладает противовирусной активностью в отношении вируса герпеса простого и некоторых аденовирусов. Применяют при герпетическом кератите, вирусных заболеваниях кожи (герпес простой, герпес опоясывающий и др.), герпетическом стоматите, гингивите, герпесе гениталий, остроконечных кондиломах и других вирусных заболеваниях кожи и слизистых

оболочек вирусного характера. Принимают внутрь (таблетки); закладывают за веки (0,05 % мазь) или наносят на слизистые оболочки полости рта (0,25 % мазь), гениталий (0,5 % и 1 % мазь) и на кожу (0,5 % и 1 % мазь). Внутрь препарат принимают через 1 ч после еды, таблетку не разжевывают. При местном применении возможны явления раздражения, проходящие после отмены препарата (мази). В случае поноса или головной боли препарат отменяют.

БОРОМЕНТОЛ (Boromenholum). Состав: ментола 0,5 части, кислоты борной 5 частей, вазелина 94,5 части. Применяют как антисептическое и обезболивающее средство для смазывания кожи при зуде и невралгии, а также для смазывания слизистой оболочки носа при ренитах.

БОЯРЫШНИКА ПЛОДЫ И ЦВЕТКИ (Fructus et Flores Grataegi). Плоды содержат флавоноиды (гиперозид, кверцетин, витексин), урсоловую и олеаноловую кислоты, каротиноиды, дубильные вещества, пектины, хлорогеновую и кофейную кислоты, сахар. Цветки - флавоноиды (кверцетин, кверцетрин), эфирное масло, ацетилхолин, холин и др. Препараты боярышника усиливают сокращение сердечной мышцы и понижают ее возбудимость, улучшают кровообращение в сосудах сердца и мозга, повыша-

ют чувствительность сердца к действию сердечных гликозидов. Применяют при функциональных расстройствах сердечной деятельности, гипертонической болезни, ангионеврозах, мерцательной аритмии, пароксизмальной тахикардии. Внутрь за 30 мин до еды в виде настоя (1 ч.л. на стакан кипятка) по 1 ст.л. 2-3 раза в день, настойки по 20 капель 3 раза в день, жидкого экстракта по 20-30 капель 3-4 раза в день.

БРИКАНИЛ (Bricanyl). Синонимы: Arubendol, Bricyn, Bricaril. Стимулирует адренергические β -рецепторы трахеи и бронхов. Применяют при бронхиальной астме, хроническом бронхите, эмфиземе, заболеваниях легких, сопровождающихся спазмом бронхов. Эффект наблюдается спустя 30 мин после подкожного введения и 2-3 ч после приема внутрь. Взрослым назначают по 1-2 табл. внутрь 2-3 раза в день. Оптимальная разовая доза 2 табл. Под кожу вводят содержимое 1/2 ампулы (максимально 4 раза в день). Препарат можно применять в/в. Детям в возрасте от 3 до 7 лет назначают по 1/4-1/2 табл. от 7 до 15 лет - по1/2 табл., старше 15 лет - 1-2 табл. 3 раза в день; под кожу вводят по 0,005 мг/кг массы тела 4 раза в день. Редко возможен тремор.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ (Viride nitens). Антисептическое средст-

во, применяемое при пиодермии, блефарите, мелких повреждениях кожи (наружно 1-2 % спиртовой и водный растворы).

БРОМГЕКСИН (Bromhexin). Синоним: Bisolvon. Обладает выраженным отхаркивающим действием и облегчает дыхание. Применяют при острых и хронических воспалительных заболеваниях трахеи, бронхов, легких; бронхоэктатической болезни, пневмокониозах, в пред- и послеоперационном периоде; при бронхографии. Внутрь по 0,004-0,008 г 2-3 раза в день. Детям - соответственно возрасту.

БРОМИЗОВАЛ (Bromisovalum). Синонимы: бромурал, Isobromil. Оказывает успокаивающее и умеренное снотворное действие при бессоннице, нервном возбуждении. Внутрь как успокаивающее по 0,3-0,6 г 2 раза в день; как снотворное по 0,6 г за 30-40 мин до сна; детям 0,03-0,2 г на прием. Противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам брома.

БРОМКАМФОРА (Bromcamphora). Оказывает успокаивающее влияние на ЦНС, улучшает сердечную деятельность. Применяют при повышенной возбудимости нервной системы, неврастении, неврозах сердца. Внутрь по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день, детям в зависимости от возраста по 0,05-0,25 г.

БРОНХОЛИТИН (Broncholytin). Сироп, содержащий эфедрина гидрохлорид, глауцина гидробромид, базиликовое масло. Оказывает бронхорасширяющее действие. Применяют при острых и хронических бронхитах, трахеобронхитах, спастическом и астматическом бронхите, бронхиальной астме и коклюше. Внутрь взрослым по 1 ст.л. 3-4 раза в день; детям старше 3 лет - по 1 ч.л. 3 раза в день; детям старше 10 лет - по 2 ч.л. 3 раза в день. Противопоказан при коронаросклерозе, стенокардии, гипертиреоидных состояниях.

БРУЛАМИЦИН (Brulamycin). Синонимы: Nebicin, Tobra, Tobramycin. Антибиотик аминогликозидной группы, применяемый при тяжелых бактериальных инфекциях: пневмониях, пиелонефрите, простатите, перитоните, менингите. В/в или в/м 7-10 дней. Суточная доза для взрослых 2-3 мг/кг. Возможно нарушение функции почек. Избегать совместного применения с ото- и нефротоксическими антибиотиками, фуросемидом и урегитом. Опасность паралича дыхания при совместном назначении с нейромускулярными блокирующими веществами. Противопоказан при аллергии к бруламицину. Из-за потенциальной токсичности требуется тщательное наблюдение за больных и систематический контроль за функцией почек.

БРУНЕОМИЦИН (Bruneomycinum). Антибиотик из культуры актиномицета Actinomyces albus var bruneomycini. Идентичен стрептонигрину и руфохромомицину. Обладает выраженной противоопухолевой активностью. Оказывает значительное ингибирующее действие на кроветворение. Применяют при лимфогранулематозе, лимфосаркоме, опухоли Вильмса и нейробластоме. В/в до 400 мкг через каждые 48-72 ч; общая доза на курс - 3000-4000 мкг; разовая доза для детей от 5 до 7 мкг/кг (вводят 2 раза в неделю). Возможны гипоплазия и аплазия кроветворения, понижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль в желудке, гингивит, стоматит, нейродермит, алопеция. Противопоказан в терминальной стадии болезни , при алейкемических и сублейкемических формах лейкоза, значительной тромбоцитопении, тяжелых нарушениях функции почек.

БРУСНИКИ ЛИСТ (Folium Vitis Idaei). Содержит гликозид арбутин (6-9 %), дубильные вещества, флавоноиды, урсоловую кислоту. Применяют как мочегонное и дезинфицирующее средство при заболеваниях мочевого пузыря и мочевых путей в виде настоя или отвара (10,0 : 200,0) по 1 ст.л. 3-4 раза в день.

БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ ЦВЕТКИ (Flores Sambuci). Содержит гликозид,

флавоновый гликозид рутин, следы эфирного масла и др. Применяют как потогонное средство при простудных заболеваниях в виде настоя (2 ч.л. цветков на 1 стакан кипящей воды) по 2 ст.л. 5-6 раз в день.

БУКАРБАН (Bucarban). Синонимы: Carbutamide, Nadisan, Orabetic, Oranil. Оказывает сахаропонижающее и слабое антибактериальное действие. Применяют при сахарном диабете средней тяжести больным старше 40 лет, особенно страдающим ожирением. Внутрь по 0,5-1 г 1-3 раза в день через 30-40 мин после еды. При замене инсулина 10-20 ЕД соответствует 0,5 г букарбана. Возможны диспептические явления, головная боль, аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопения, нарушения функции печени. Противопоказан при тяжелых формах диабета, в детском и юношеском возрасте, при нарушениях функции печени и почек, лейкопении, гранулоцитопении, оперативном вмешательстве, аллергии к сульфаниламидам.

БУРОВА ЖИДКОСТЬ (Liquor Burovi). 8 % раствор ацетата алюминия. Обладает вяжущим противовоспалительным и слабым антисептическим действием. Применяют для полосканий, примочек, спринцеваний, при воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Разводят в 10-20 раз.

БУТАДИОН (Butadionum). Синонимы: Butalidon, Phenylbutazolum. Анальгизирующее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, применяемое при ревматизме, инфекционном неспецифическом полиартрите, болезни Бехтерева, узловатой эритеме, малой хорее и др. Внутрь по 0,1-0,15 г 4-6 раз в сутки per se и в комплексе с амидопирином. Возможны тошнота, боль в области желудка (изъязвление слизистой оболочки), кожные высыпания, невриты, анемия, гематурия и др. Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушении функции печени и почек, заболеваниях кроветворных органов, недостаточности кровообращения I-III стадии, аритмиях.

БУТАДИОН (МАЗЬ) (Unguentum Butadioni). Противовоспалительное, противоревматическое средство, применяемое при поверхностных тромбофлебитах нижних конечностей травматического, инфекционного, химического генеза, постинъекционных флебитах, воспалении геморроидальных узлов, ожогах I и II степени.

БУТАМИД (Butamidum). Синонимы: Diabetol, Orabet, Tolbutamide. Гипогликемизирующее средство, применяемое при сахарном диабете (легкая форма и средней тяжести) у лиц старше 40 лет при давности заболевания не более 5 лет (осо-

бенно у страдающих ожирением). Внутрь через 30-40 мин после еды по 0,5-1 г 1-3 раза в сутки. Высшая разовая доза 1,5 г, суточная 4 г. Возможны головная боль, диспептические явления, аллергические реакции (зуд, дерматиты), лейкопения, тромбоцитопения, нарушение функции печени. Противопоказан в прекоматозном и коматозном состоянии, при кетоацидозе в детском и юношеском возрасте, при беременности и лактации, острых инфекционных заболеваниях, нарушениях функции печени и почек, лейкопении, тромбоцито- и гранулоцитопении, оперативных вмешательствах, аллергических реакциях на сульфаниламиды.

БУТИРОКСАН (Butyroxanum). Обладает адренолитической активностью, центральными и н-холинолитическими свойствами, блокирует преимущественно α-адренорецепторы. Применяют при абстинентном синдроме (при алкоголизме II стадии и полинаркомании); для купирования, предупреждения и лечения диэнцефальных и гипертонических пароксизмов как симпатикотонического, так и смешанного характера; при гипертонической болезни I и II стадии, аллергодерматозах (диффузном нейродермите, экземе, хронической крапивнице), сопровождающихся приступами бронхиальной астмы у больных с гипоталамическими поражениями постинфекционного гене-

за. Внутрь, подкожно и в/м. Внутрь таблетки по 0,01 г 1-4 раза в день; парентерально по 1-2 мл 1 % раствора 1-4 раза в день. Высшие дозы для взрослых: разовая внутрь 0,04 г, в инъекциях 0,03 г; суточная внутрь 0,18 г, в инъекциях 0,15 г. Возможно резкое понижение АД, брадикардия. Противопоказан при сердечной недостаточности, пониженном АД, абстинентном синдроме III стадии алкоголизма.

БУФЕНОКС (Buphenoxum). Синонимы: буметамид, буренекс. Диуретик с натрийуретическим и калийуретическим быстро наступающим и коротким действием. Максимальная концентрация препарата в плазме крови наблюдается через 1 1/2 ч. С мочой за сутки выделяется 65 % буфенокса, с калом 6 %. Применяют при застойных явлениях, связанных с сердечной недостаточностью, циррозах печени с явлениями гипертензии и отечно-асцитическим синдромом; гломерулонефритах, протекающих с нефротическим синдромом, гипертонической болезни в период стабилизации АД; эклампсии и отеках у беременных. Внутрь (утром натощак). Дозы подбирают индивидуально. Разовая доза от 0,001 г (1 мг) до 0,002 г (2 мг). Высшая суточная доза 0,003 г (3 мг); принимать лучше в 2 приема с интервалом в 2-4 ч. Лечение вести, контролируя уровень мочеотделения, концентрации

натрия и калия в плазме крови. Возможны гипокалиемия и гипохлоремический алкалоз; слабость, жажда и сухость во рту; в редких случаях -диспептические явления. Противопоказан при острой печеночной недостаточности, печеночной коме, декомпенсированной форме сахарного диабета и подагре, гипокалиемии, в первой половине беременности.

ВАГОТИЛ (Vagothyl). Оказывает выраженное бактерицидное действие, ускоряет эпителизацию поврежденной слизистой оболочки и кожи, оказывает местное трихомонацидное и сосудосуживающее действие. Применяют при эрозиях вагинальной части и канала шейки матки, эрозиях и папилломах уретры у женщин, вульвите, зуде влагалища; язвах, появившихся после применения суппозиториев; кровотечениях, вызванных биопсией или удалением полипов; трихомонадном вагините, гипертрофии слизистой оболочки, язвах голени, ожогах III степени (для ускорения эпителизации). Ватные тампоны, пропитанные препаратом, после предварительного туалета сухими марлевыми салфетками вводят во влагалище на 1-3 мин, затем вынимают и сухим тампоном удаляют остатки препарата. Спринцевание влагалища и остановка кровотечения производятся раствором из 1-3 ч. л. препарата на 1 л теплой воды.

ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО (Oleum Vaselini). При хронических запорах внутрь по 1-2 ст.л. в день; наружно в детской практике.

ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩЕ С КОРНЯМИ (Rhizoma cum radicibus Valerianae). Содержит 0,5-2 % эфирного масла (основная составная часть которого - сложный эфир борнеола с изовалериановой кислотой), свободную изовалериановую кислоту, дубильные вещества, алкалоиды. Уменьшает возбудимость ЦНС и оказывает спазмолитическое действие. Применяют при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, неврозах сердечно-сосудистой системы, спазмах желудочно-кишечного тракта. Внутрь настой (6-20 г корня на 180-200 мл воды) по 1 ст.л. 3-4 раза в день, детям (2,0 : 100,0) по 1 ч.л. на прием; настойка по 20-30 капель 3-4 раза в день; экстракт густой в таблетках по 0,02-0,04 г на прием.

ВАЛИДОЛ (Validolum). Раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты. Оказывает успокаивающее действие на ЦНС и рефлекторное сосудорасширяющее действие. Применяют при стенокардии, неврозах, истерии; морской болезни (в качестве противорвотного средства). Сублингвально по 0,06 г и по 0,05 г или 4-5 капель раствора на кусочек сахара.

ВАЛОКОРМИД (Valocormidum). *Состав:* настойка валерианы - 10 мл, настойка ландыша - 10 мл, настойка красавки - 5 мл, натрия бромид - 4 г, ментол - 0,25 г, вода дистиллированная - до 30 мл.

ВАСИЛЬКА СИНЕГО ЦВЕТКИ (Flores centaureae Cyani). Содержит гликозид цианин, цикорин, центаурин, пеларгонин, дубильные вещества, слизь. Применяют как диуретическое средство при отеках почечного и сердечного происхождения в виде настоя (10,0 : 200,0) по 1/4 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды.

ВЕНТЕР (Venter). Противоязвенное средство. Содержит сукральфат. Локально взаимодействует с белками некротизированной ткани, формирует на месте язвы защитный слой. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. По 1 табл. или пакетику гранул 4 раза в сутки перед каждым приемом пищи (завтраком, обедом и ужином) и непосредственно перед отходом ко сну. Таблетку можно проглотить целиком, запив глотком воды, или, также как и гранулы, размешать в 1/2 стакана воды и выпить. Можно принимать дважды в день - по 2 табл. или 2 пакетика гранул утром и вечером. Курс обычно составляет 4-6 нед; при необ-

ходимости - 12 нед. Антациды для ослабления болевого синдрома следует принимать за 1/2 ч до или через 1/2 ч после приема вентера. При почечной недостаточности - контроль за концентрацией алюминия и фосфатов в сыворотке. Иногда возможны запоры. Механизм действия препарата на беременных и детей до 4 лет не достаточно изучен.

ВЕРМОКС (Vermox) Синонимы: Mebendazol, Nemasole, Antiox, Medosil и др. Противоглистное средство, применяемое при аскаридозе, энтеробиозе, анкилостомидозе, трихоцефалезе. При энтеробиозе — одномоментно внутрь 0,1 г; при анкилостомидозе и других глистных инвазиях (также и при смешанных) — внутрь по 0,1 г в течение 3 дней. Противопоказан беременным; в процессе лечения не употреблять спиртные напитки.

ВЕРОШПИРОН (Verospiron). Синонимы: Aldactone, SC-94-20, Spironolactone. Обладает выраженным мочегонным действием, существенно не влияет на почечное кровообращение и функцию почечных канальцев, не нарушает кислотно-основное состояние в организме. Применяется при отеках, вызванных сердечно-сосудистой недостаточностью; циррозах печени и других заболеваниях, сопровождающихся асцитом, отеками и др. Внутрь по 0,075-0,3 г/сут. Взрослым

обычно назначают 0,1-0,2 г в 2-4 приема. По улучшении состояния дозу постепенно уменьшают до 0,025 г. Наблюдаются головокружение, сонливость, дерматозы; возможны гипонатриемия и гиперкалиемия. Противопоказан при острой почечной недостаточности.

ВИГЕРАТИН (Vigeratinum). Одна таблетка содержит лиофилизированный экстракт печени крупного рогатого скота в количестве, эквивалентном 10 г сырой печени и 4 ЕД панкреатина. Дает умеренный липотропный, гепатозащитный и антианемический эффект. Применяют при хронических гепатитах, панкреатитах и гастритах с пониженной секреторной функцией. Внутрь перед едой по 2-3 табл. 3 раза в день в течение 3-4 нед. Курс может быть продлен до 1 1/2 мес. Отмечаются изжога, сухость во рту, тошнота. Противопоказан при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью желудочного сока.

ВИДЕХОЛ (Videcholum). Молекулярное соединение холекальциферола (витамин D3) с холестерином. Регулирует обмен кальция и фосфора, ускоряет всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфора в почках, способствует формированию костного скелета и зубов, а также сохранению структуры костей.

Применяют для профилактики и лечения рахита, остеомаляции и некоторых форм остеопороза. Внутрь для профилактики рахита у доношенных детей по 30 000-40 000 МЕ/сут (в 2 приема) в течение 12-14 дней, у недоношенных детей — по 6250-10 000 МЕ/сут в течение 2 мес. При рахите I степени суточная доза 10 000-15 000 МЕ (в 2 приема), на курс от 300 000-400 000 до 500 000-600 000 МЕ в течение 4-6 нед. При рахите II степени по 15 000-20 000 МЕ/сут 2 раза, на курс 600 000-800 000 МЕ в течение 4-6 нед. При рахите III степени 800 000-1 200 000 МЕ на курс в течение 5-7 нед. При костных заболеваниях применяют по 3000 МЕ/сут в течение 1 1/2 мес. Возможен понос. Противопоказан при гиперкальциемии, активных формах туберкулеза легких, желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях печени и почек, мочекаменной болезни, органических поражениях сердца в стадии декомпенсации.

"ВИКАИР" ("Vicairum"). Состав: висмута нитрата основного 0,35 г, магния карбоната основного 0,4 г, натрия гидрокарбоната 0,2 г, порошка корневищ аира 0,025 г, коры крушины мелкоизмельченной 0,025 г. Применяют в тех же случаях и дозах, что и викалин.

"ВИКАЛИН" ("Vicalinum"). Состав: висмута нитрата основного 0,35 г, магния карбоната 0,4 г, натрия гидрокарбоната

0,2 г, порошка корневищ аира 0,025 г, порошка коры крушины 0,025 г, келлина 0,025 г, рутина 0,005 г. Фармакологическое действие. Оказывает вяжущее, противокислотное, умеренное слабительное, некоторое противовоспалительное спазмолитическое действие. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; гиперацидном гастрите. Внутрь по 1–2 табл. 3 раза в день после еды в 1/2 стакана теплой воды (курс 1–3 мес). Иногда наблюдается учащение стула.

ВИКАСОЛ (Vikasolum). Синтетический водорастворимый аналог витамина К. Участвует в образовании протромбина. Способствует нормализации свертывания крови. Применяют при желтухе вследствие задержки поступления желчи в кишечник, острых гепатитах; при паренхиматозных и капиллярных кровотечениях (применяется при подготовке к хирургическим операциям и после них); кровотечениях при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки; лучевой болезни; тромбопенической пурпуре; упорных геморроидальных и носовых кровотечениях; в последние месяцы беременности (для предупреждения кровоточивости у новорожденных); при геморрагической болезни у новорожденных; продолжительных маточных ювенильных и преклимактерических кровотечениях; кровотечениях

при туберкулезе легких, септических заболеваниях, выраженной гипопротромбинемии, при применении антикоагулянтов - антагонистов витамина К: дикумарина, фенилина, пелентана и др. При гемофилии и болезни Верльгофа неэффективен. Внутрь взрослым 0,015-0,3 г/сут; в/м 0,01-0,015 г. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,03, суточная 0,06 г; в/м: разовая 0,015, суточная 0,03 г. Детям в возрасте до 1 года назначают 0,002-0,005 г, до 2 лет -0,006 г, 3-4 лет - 0,008 г, 5 - 9 лет - 0,01 г, 10-14 лет - 0,015 г/сут в 2-3 приема 3-4 дня подряд; после перерыва на 4 дня курс повторяют. Перед операцией препарат назначают за 2-3 дня. Роженицам дают суточную дозу сразу после прибытия в родильный дом, а затем, если роды не наступили, через 12 ч. и через 24 ч. Доза для новорожденных не выше 0,004 г. Противопоказан при повышенной свертываемости крови; тромбоэмболиях.

ВИЛОЗЕН (Vilosen). Небелковый низкомолекулярный экстракт вилочковой железы крупного рогатого скота. Стимулирует пролиферацию и дифференцировку Т-лимфоцитов, образование реагинов, а также подавляет развитие гиперчувствительности замедленного типа. Применяют у взрослых и детей старшего возраста при аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей (пол-

линоз, инфекционно-аллергический риносинусит). В виде капель в нос (5-7 капель в каждую ноздрю 5 раз в день) или ингаляций в суточной дозе 20 мг. В ампулу непосредственно перед применением добавляют 2 мл изотонического раствора хлорида натрия или кипяченой воды. Курс обычно 14-20 дней, при необходимости повторяют. Противопоказан при индивидуальной непереносимости. В начале курса возможно кратковременное появление головной боли и увеличение заложенности носа.

ВИЛЬКИНСОНА МАЗЬ (Unguentum Wilkinsoni). Состав: дегтя жидкого 15 частей, кальция карбоната 10 частей, серы очищенной 15 частей, мази нафталанной 30 частей, мыла зеленого 30 частей, воды 4 части. Применяют как антисептическое и антипаразитарное средство при чесотке и грибковых заболеваниях кожи.

"ВИНИЗОЛЬ" ("Vinisolum"). Аэрозольный препарат, содержит винилин - 15 г, линетол - 14,9 г, цитраль - 0,1 г и пропеллент - до 60 г. Противовоспалительное, ранозаживляющее средство, применяемое при ожогах, трофических язвах, вяло заживающих ранах (при общей площади поражения до 25 см^2). Наносят путем распыления на пораженную поверхность в течение 1-3 с с расстоя

20-30 см 2-3 раза в неделю; в тяжелых случаях препарат применяют ежедневно 2 раза в сутки.

ВИНИЛИН (БАЛЬЗАМ ШОСТАКОВСКОГО) [Vinylinum (Balsamum Schostakowsky)]. Поливинилбутиловый эфир. Оказывает бактериостатическое и ранозаживляющее действие, ускоряет эпителизацию. Применяют при фурункулезе, карбункулах, трофических язвах, гнойных ранах, маститах, ранениях мягких тканей, ожогах, отморожениях и воспалительных заболеваниях, гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах. Наружно per se и в виде 20% раствора в маслах, а также в виде мази; внутрь спустя 5-6 ч после еды (в 23-24 ч) по 1 д. л. 1 раз в день в течение 18-20 дней.

ВИНКАПАН (Vincapanum). Содержит сумму алкалоидов барвинка (Vinca minor L.) Синонимы: винкатон, винкапор. Оказывает сосудорасширяющее (преимущественно на сосуды мозга), гипотензивное, седативное действие. Применяют при гипертонической болезни, спазмах сосудов мозга, неврогенной тахикардии и других вегетативных неврозах, особенно у детей. Внутрь по 0,005-0,01 г 2-3 раза в день, детям - в зависимости от возраста.

ВИНКРИСТИН (Vincristinum). Алкалоид из растения барвинок розовый (Vinca rosea, Linn.). Синоним: Oncovin. Противоопухолевое средство, применяемое в комплексной терапии острого лейкоза, при лимфосаркоме, саркоме Юинга, нейробластоме, опухоли Вильмса, лимфогранулематозе, меланоме, раке молочной железы и других опухолях. В/в 1 раз в неделю в возрастающих дозах (от 0,05 до 0,15 мг/кг). При достижении ремиссии дозы уменьшают до 0,05-0,075 мг/кг в неделю. Возможны выпадение волос, запор, бессоница, парестезии, атаксия, мышечная слабость, похудание, повышение температуры тела, лейкопения, реже - полиурия, дизурия, язвенные стоматиты, тошнота, рвота, потеря аппетита.

ВИПРАКСИН (Vipraxinum). Водный раствор яда гадюки обыкновенной. Противовоспалительное, болеутоляющее и рассасывающее средство. Применяют при невралгиях, артрите, миозите, хронических неспецифических моно- и полиартритах, радикулите и др. Внутрикожно, подкожно и в/м, начиная с 0,2 мл с постепенным повышением дозы до 1 мл (курс 10 инъекций). Возможна индивидуальная реакция, быстро проходящая болезненность и отечность в месте введения. Противопоказан при активном туберкулезе легких, лихорадочных состоя-

ниях, кахексии, склонности к ангиоспазмам, нарушениях функции печени и почек.

"ВИПРОСАЛ В" МАЗЬ (Unguentum "Viprosalum B"). Состав: яда гадюки сухого 5 МЕ, 0,9% изотонического раствора натрия хлорида 8 г, эмульгатора №1 8 г, парафина твердого 3 г, вазелина 7 г, камфоры 3 г, масла пихтового 3 г, глицерина 2 г, кислоты салициловой 1 г, воды дистиллированной 65 г. Болеутоляющее и противовоспалительное средство, применяемое наружно в виде растираний при ревматической боли, невралгии, ишиасе, люмбаго и др. Возможны кожные аллергические реакции.

ВИРОЛЕКС (Virolex). Синоним: ацикловир. Противовирусный препарат, проявляющий высокую активность против вирусов Herpes simplex типов 1 и 2 и вируса Varicella zoster. Применяют при инфекциях, вызванных вирусом Herpes simplex у больных с нарушениями иммунной системы, для профилактики инфекций той же природы у больных с высокой степенью поражения иммунной системы (иммунодепрессивная терапия при пересадке почек или костного мозга, при аплазии костного мозга, вызванной применением цитостатиков); при тяжелых формах первичного Herpes simplex genitalis, первичных и рецидивирующих инфекциях, вызванных вирусом Herpes

varicella zoster у больных без нарушения иммунитета; энцефалите, вызванном вирусом Herpes simplex (фокальном и диффузном). Применяют в виде порошка взрослым и детям старше 12 лет с нарушениями иммунитета при инфекции, вызванной вирусом Herpes simplex назначают в дозе 5 мг/кг каждые 8 ч при условии нормального функционирования почек. Такую же дозу назначают больным без нарушения иммунитета, при инфекциях, вызванных H. varicella zoster. У больных с нарушениями иммунитета при инфекции, вызванной вирусом Varicella zoster, обычная доза 10 мг/кг каждые 8 ч при условии нормального функционирования почек. У больных с нарушениями функции почек доза подбирается индивидуально по схеме. Детям в возрасте 3 мес - до 12 лет вводят дозы в зависимости от площади поверхности тела: 5 мг/кг эквивалентно 250 мг/м^2. Курс обычно составляет 5 дней. Введение препарата при инфекциях, вызванных вирусом Varicella zoster, осуществляется еще 3 дня после появления последних новых высыпаний (длительность лечения зависит от состояния больного и его реакции на лечение). С профилактической целью препарат назначают на срок, соответствующий периоду риска. Для в/в введения используют растворы соответсвующей концентрации, которые вводят капельно или с использо-

бавлением специальной нагнетающей аппаратуры. Возможно повышение уровней BUN и креатинина сыворотки крови, поэтому в/в введение ацикловира должно сопровождаться адекватной гидратацией. В очень редких случаях может возникнуть острая почечная недостаточность. Попадание ацикловира вместо сосуда в ткань способно привести к местному воспалению. Могут быть тошнота, рвота, усиление активности ферментов печени, снижение гематологических параметров и кожные высыпания. Противопоказан при гиперчувствительности к препарату, беременности (за исключением случаев, когда инфекция представляет угрозу для жизни). В таблетках назначают взрослым для лечения инфекций, вызванных вирусом Herpes simplex, обычная доза составляет 1 табл. (200 мг) 5 раз в день, каждые 4 ч. Для профилактики - 1 табл. 4 раза в день, каждые 6 ч. Больным с высокой степенью поражения иммунной системы или с пониженным кишечным всасыванием дозу увеличивают до 2 табл. (400 мг) 4 раза в день. Для лечения инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster, больным с нормальным иммунитетом назначают 4 табл. (800 мг) 5 раз в день, каждые 4 ч. Детям старше 2 лет - та же доза, что и для взрослых, младше 2 лет - 1/2 дозы взрослых. Больным с нарушением функции почек оральная доза уменьша-

ется на 200 мг каждые 12 ч, если клиренс креатинина меньше, чем 10 мл/мин. С пожилыми больными требуются особые меры предосторожности и наблюдение за уровнем клиренса креатинина. Продолжительность лечения обычно 5 дней. Прием препарата при наличии вируса Varicella zoster не прекращается еще 3 дня после появления последних новых высыпаний. Продолжительность профилактического введения при пересадке органов составляет 6 нед. Крем применяют наружно при инфекциях Herpes simplex кожи и слизистой (herpes simplex labialis, herpes simplex genitalis). Наносится на пораженный участок кожи 5 раз в день, каждые 4 ч. Продолжительность лечения - 5 дней, в тяжелых случаях - 10. Иногда могут наблюдаться эритема, слабая сухость и шелушение кожи. Противопоказан при гиперчувствительности к препарату. Глазную мазь назначают при кератите, вызванном вирусом Herpes simplex. По 1 см мази наносят на нижний конъюнктивальный мешок 5 раз в день каждые 4 ч. Продолжительность лечения язвенных форм кератита составляет 7-10 дней, а интерстициальных форм кератита - 10-20 дней. Применение прапарата следует продолжать в течение 3 дней после исчезновения последних симптомов заболевания. В месте нанесения мази может ощущаться незначительное жжение. Воз-

можно проходящее поверхностное точечное нарушение целостности эпителия, не оставляющее никаких последствий. Противопоказан при гиперчувствительности к препарату.

ВИСКАЛЬДИКС (Viscaldix). Состав: 1 табл. содержит 10 мг пиндолола и 5 мг клопамида. Применяют при артериальной гипертензии. При легких и среднетяжелых формах самостоятельно, при тяжелых - в комбинации с другими гипотензивными средствами; обычно по 1 табл. утром ежедневно. Если после 1-3-недельного лечения желаемого эффекта не наступает, доза может повышаться до 2, а при необходимости и до 3 табл. в сутки. Суточную дозу в 3 табл. следует разделить на два приема (2 раза по 1,5 табл.), утром и после обеда. Возможны легкое головокружение, усталость, расстройства пищеварения, изредка - кожные реакции, психические расстройства (депрессия, галлюцинации), при которых нет надобности прекращать лечение. Противопоказан при остром гломерулонефрите, тяжелой недостаточности функции печени и почек, тяжелой или не поддающейся лечению гипокалиемии, гиперчувствительности к сульфаниламидным препаратам; сердечной недостаточности, не реагирующей на лечение сердечными гликозидами; легочном сердце; выраженной брадикардии; атриовентрикулярной

блокаде II и III степени; бронхиальной астме; эфирном и хлороформном наркозе.

ВИСКЕН (Visken). Синонимы: Pinloc, Pindolol. Некардиоселективный β-адреноблокатор. Оказывает антиангинальное, антиаритмическое и гипотензивное действие. Применяют при стенокардии, нарушениях сердечного ритма, гиперкинетическом синдроме, гипертонической болезни. В кардиологии - по 1 табл. 3 раза в день, в более тяжелых случаях по 1 табл. 4 раза в день. Принимают спустя 30 мин после еды; при гипертонической болезни по 1 табл. 2-3 раза в день. Максимальная доза - 3 табл. 3 раза в день. В начале лечения могут наблюдаться брадикардия, спазм бронхов, аллергические реакции, головокружение, головная боль, сонливость, усталость, расстройство желудочно-кишечного тракта, тошнота, диарея. Противопоказан при декомпенсации сердечной деятельности, шоке, синусовой брадикардии, легочном сердце, эфирном наркозе.

ВИСМУТА НИТРАТ ОСНОВНОЙ (Bismuthi subnitras). Принимают как вяжущее, слабое антисептическое, закрепляющее средство при желудочно-кишечных заболеваниях внутрь по 0,25-1 г (детям по 0,1-0,5 г) на прием 4-6 раз в день за 15-30 мин до еды. При длительном

применении в больших дозах наблюдается метгемоглобинемия.

ВИТАЙОДУРОЛ ТРИФОСАДЕНИН (Vita-iodurol triphosadenine). Состав: АТФ (трифосаденин) 0,0027 г, кальция хлорид 0,3 г, магния хлорид 0,3 г, калия йодид 1,5 г, кислота никотиновая 0,03 г, цистеин 0,03 г, глутатион 0,006 г, тиамина хлорид (витамин В1) 0,03 г, метил-п-оксибензоат 0,045 г, пропил-п-оксибензоат 0,02 г, наполнитель до 100 мл (изотоничен слезной жидкости, устраняет раздражение роговицы глаза). Применяют при катаракте, офтальмите. Закапывают по 1-2 капли в больной глаз утром и вечером.

ВИТАМИН Р (Vitaminum P). Содержит биофлавоноиды, способные уменьшать проницаемость капилляров. Препараты, содержащие витамин Р: рутин, аскорутин, кверцетин. Применяют при гиповитаминозе и авитаминозе Р (профилактика и лечение). Заболеваниях, сопровождающихся повышением проницаемости капилляров (геморрагических диатезах, кровоизлияниях в сетчатку глаз, геморрагическом васкулите, лучевой болезни, септическом эндокардите, ревматизме, гломерулонефритах, гипертонической болезни, аллергических заболеваниях, тромбоцитопенической пурпуре). Для профилактики и лечения поражений капилляров при применении

антикоагулянтов, салицилатов, мышьяковистых препаратов. Рутин (Rutinum). Применяют внутрь взрослым по 0,02-0,05 г 2-3 раза в день. "Аскорутин" (Ascorutinum). Состав: аскорбиновой кислоты 0,05 г, рутина 0,05 г, глюкозы 0,2 г. Внутрь по 1 табл. 2-3 раза в день. Кверцетин (Quercetinum). Внутрь взрослым по 0,02 г 3-5 раз в день. Курс 5-6 нед.

ВИТАФТОР (Vitaftorum). Состав: в 1 мг содержится натрия фторида 0,22 мг, ретинола пальмитата 0,36 мг, эргокальциферола 0,02 мг, кислоты аскорбиновой 12 мг с добавлением сорбита и других веществ. Противокариозное средство, применяемое при кариесе зубов у детей в комплексе лечебно-профилактических мероприятий. Внутрь во время еды или через 10-15 мин после еды ежедневно 1 раз в день в течение 1 мес. Повторные курсы проводят 4-6 раз в течение года с 2-недельным перерывом. Разовая доза для детей 1-6 лет - 1/2 ч. л., 7-14 лет - 1 ч.л. Противопоказан при содержании фтора в питьевой воде свыше 1,5 мг/л и при явлениях А- и D-гипервитаминоза

ВИТОГЕПАТ (Vitohepatum). Препарат печени крупного рогатого скота. Содержит в 1 мг 10 мкг цианокобаламина, фолиевую кислоту и другие антианемические вещества. Применяют при анемии Аддисона - Бирмера, макроцитарной

анемии беременных и других анемиях, болезни Боткина, хронических поражениях печени, атрофических гастритах. В/м по 1-2 мл в день (курс 15-20 инъекций). Повторные курсы через 1 1/2-2 мес. Возможны аллергические реакции.

ВОДЯНОГО ПЕРЦА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Polygoni hydropiperis fluidum). Содержит рутин, кверцетин и другие флавоноловые производные, дубильные вещества. Уменьшает проницаемость сосудов, повышает свертываемость крови. Применяется в качестве кровоостанавливающего средства преимущественно при маточных кровотечениях по 30-40 капель 3-4 раза в день.

ВУЛНУЗАН (Vulnusan). Стандартизованная эмульсия маточника Поморийского озера в касторовом масле и ланолине. Содержит макро- и микроэлементы (магний, кальций, калий, натрий, железо, марганец, медь, кобальт, молибден, цинк, висмут, хлор, йод, селен), а также коллоиды и другие вещества органического происхождения. Ограничивает воспалительные процессы, стимулирует фагоцитоз и иммуногенез, активирует грануляцию и эпителизацию тканей. Применяют при инфицированных ранах, абсцессах, язвах, поверхностных воспалительных процессах (дерматитах, фолликулитах, карбункулах). Наружно в ви-

де повязок ежедневно или через 2-3 дня. Возможны аллергические реакции, болезненность после перевязки. Противопоказан при индивидуальной непереносимости препарата.

ГАЛАЗОЛИН (Halazolini). Синонимы: Otrivin, Xylomethazolin. Способствует сужению сосудов носоглотки, уменьшает гиперемию и снимает воспалительные явления. Применяют при острых ринитах различной этиологии, в т.ч. аллергическом рините и сенном насморке, ларингите, синусите, гайморите. Путем инстилляций, по 1-2 капли 0,1% раствора в каждый носовой ход 1-3 раза в день; детям старше 1 года 1 раз в день по капле. Возможны слабое жжение и сухость слизистой оболочки носа, головокружение, головная боль, бессонница. Противопоказан при тахикардии, гипертонии, выраженном атеросклерозе.

ГАЛАНТАМИНА ГИДРОБРОМИД (Galantamini hydrobromidum). Выделен из клубней подснежника Воронова (Galanthus Woronowi A. Los). Синоним: Nivalin. Активное антихолинэстеразное средство, применяемое при миастении, миопатии, чувствительных и двигательных нарушениях, вызванных невритами; остаточных явлениях после полиомиелита; психогенной и спинальной импотенции; как антидот миорелаксантов

анестезии и др. Подкожно по 1 мл 0,5% раствора 1-2 раза в день; детям в зависимости от возраста 0,1-0,7 мл 0,25% раствора; как антидот вводят в/в (15-25 мг). При передозировке - слюнотечение, головокружение, брадикардия. Противопоказан при эпилепсии, гиперкинезах, стенокардии, брадикардии, бронхиальной астме.

ГАЛАСКОРБИН (Galascorbinum). Комплексное соединение солей аскорбиновой и галловой кислот. Обладает свойствами витаминов С и Р, оказывает вяжущее действие. Применяют при гастритах и эзофагитах, гиповитаминозах С и Р внутрь по 0,5 г 3-4 раза в день. Наружно для лечения трещин, ожогов, лучевых поражений кожи 0,5-1% водный раствор.

ГАЛИДОР (Halidor). Синоним: Bencyclamidum. Спазмолитическое и сосудорасширяющее средство, применяемое при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмах мочевыводящих путей, холецистите, эндартериите, тромбангиите, спазмах сосудов мозга и коронарных сосудов. Внутрь по 0,05-0,1 г 2-4 раза в день, в/м (при необходимости в/в) по 1-2 мл 2,5% раствора (курс 15-20 дней). Возможны диспептические явления, аллергические кожные реакции. Противопоказан при выраженных нарушениях кровообращения и дыхания.

ГАЛОПЕРИДОЛ (Haloperidol). Синонимы: Aloperidin, Haldol. Нейролептическое средство с выражённым антипсихотическим эффектом, применяемое при шизофрении, маниакальных, галлюцинаторных бредовых состояниях, острых и хронических психозах разной этиологии. В комплексной терапии при болевом синдроме, стенокардии, при неукротимой тошноте и рвоте. Внутрь по 0,002-0,003 г в день, в/м и в/в по 0,4-1 мл 0,5% раствора. Возможны экстрапирамидные расстройства, при передозировке - бессонница. Противопоказан при органических заболеваниях ЦНС, нарушении сердечной проводимости, заболеваниях почек с нарушением функции.

"ГАЛЬМАНИН" ("Galmaninum"). Состав: салициловой кислоты 2 части, окиси цинка 10 частей, талька 44 части, крахмала 44 части. Применяют как антисептическое и подсушивающее средство при потливости ног наружно в виде присыпки.

ГАНГЛЕРОН (Gangleronum). Синоним: Ganglefeni hydrochoridum. Блокирует н-холинореактивные системы парасимпатических и симпатических вегетативных ганглиев и ЦНС, оказывает миотропное спазмолитическое, слабое местно-раздражающее и анестезирующее действие. Применяют при стенокар-

дии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, спастической дискинезии желудочно-кишечного тракта и др. Внутрь по 0,04 г 4 раза в день после еды; в/м или подкожно по 1 мл 1,5% раствора 4 раза в день с постепенным повышением разовой дозы до 3 мл. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,075 г, суточная 0,3 г; подкожно и в/м 4 мл 1,5% раствора; суточная 12 мл 1,5% раствора. Возможны головокружение; при попадании на слизистые оболочки быстро проходящее ощущение раздражения с последующей анестезией.

ГАСТАЛ (Gastal). Комбинированный препарат алюминия гидроокиси-магния карбоната геля и магния гидроокиси - буферный антацид, применяемый для снижения повышенной кислотности желудочного сока и устранения вызываемых ею болей изжоги и др. при: пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагите, остром и хроническом гастрите, раздражении слизистой оболочки желудка, вызванном курением, потреблением алкоголя, кофе, сладостей, различных приправ и т.д., у беременных, людей старческого возраста. По 1-2 табл. или по 10 мл суспензии 4-6 раз в день, примерно через 1 ч (не ранее чем через 20 мин) после еды, а также вечером перед сном; при изжоге - в такой же дозировке независимо от време-

ни приема пищи. Таблетки следует медленно сосать и ни в коем случае не глотать целиком. Суспензию обычно принимают в неразбавленном виде, но можно ее смешать с небольшим количеством воды или молока. С осторожностью назначать при пониженнй массе тела и кахексии. Препарат может усиливать эффекты леводопа, ацетилсалициловой кислоты и налидиксовой кислоты и, напротив, угнетать действие тетрациклинов, изониазида, пропранолола и препаратов железа.

ГАСТРОФАРМ (Gastropharm). Содержит высушенные бактериальные тела Lactobacillus Bulgaricus и продукты его жизнедеятельности, сахарозу. Стимулирует регенеративные процессы слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует функцию желудочно-кишечного тракта. Применяют при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Внутрь за 30 мин до еды по 1-2 табл. 3 раза в день, при необходимости дозу увеличивают до 8-12 табл. (курс 30 дней).

ГАСТРОЦЕПИН (Gastrozepin). Блокатор для клеток слизистой оболочки желудка. Применяют при острых и хронических формах язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, гастрите повышенной кислотности желудка. Таблетки по 50 мг

применяют утром и вечером за 30 мин до еды. Курс - 4 нед без перерыва. В/м или в/в вводят свежеприготовленный раствор (1 ампула) через каждые 12 ч.

"ГЕКСАВИТ" ("Hexavitum"). Состав: ретинола ацетата 0,0017 г (5000 МЕ), тиамина бромида 0,0026 г, рибофлавина 0,002 г, никотинамида 0,015 г, пиридоксина гидрохлорида 0,002 г, аскорбиновой кислоты 0,07 г. Назначают для профилактики гиповитаминозов, при длительном лечении антибиотиками, а также работникам, труд которых требует повышенной остроты зрения, внутрь после еды по 1-3 драже в день. Детям до 1 года 1/2 драже в день, 1-3 лет по 1 драже в день, 3-7 лет по 1 драже 2 раза в день и старше 7 лет по 1 драже 3 раза в день.

ГЕКСАЛИЗ (Hexalyse). Комбинированные сублингвальные таблетки, содержащие биклотимол (5 мг), хлорид декалиния (0,25 мг), лизоцим (5 мг), папаин (20 мг), кислоту В-глицирретиновую (5 мг), оказывающие антисептическое, фунгицидное, противовоспалительное, антибактериальное и противовирусное действие. Применяют при орально-фарингеальных заболеваниях и как вспомогательное стоматологическое средство. Таблетка должна медленно растаять под языком, не раскусывать. Возможно использование подъязычно 6-8 табл. за 24 ч.

ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН (Hexamethylentetraminum). Синонимы: Hexamina, Urisol, Urotropinum и др. Антисептическое средство, применяемое при инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей, холециститах, холангитах, аллергических кожных заболеваниях, заболеваниях глаз (иридоциклитах, кератитах), менингите, энцефалите, арахноидите. Внутрь по 0,5-1 г на прием (детям 0,1-0,5 г); в/в по 5-10 мл 40% раствора.

ГЕКСАМИДИН (Hexamidinum). Синонимы: Lepsiral, Sertan. Оказывает выраженное противосудорожное действие, по фармакологической активности близок к фенобарбиталу, но не обладает выраженным снотворным свойством. Применяют при эпилепсии различного генеза, преимущественно больших судорожных припадках (grand mal). При лечении больных с полиморфной эпилептической симптоматикой используют в комлексе с другими противосудорожными препаратами. Внутрь 0,125 г 1 раз в день, затем суточную дозу повышают до 0,5-1,5 г. Возможны зуд, кожные высыпания, легкая сонливость, головокружение, головная боль, атаксия, тошнота; при длительном лечении - анемия, лейкопения, лимфоцитоз. Противопоказан при заболеваниях печени, почек и кровотворной системы.

ГЕКСАФОСФАМИД (Hexaphosphamidum). Цитостатик, применяемый при обострениях хронического миелолейкоза (лейкемические и сублейкемические формы заболевания, особенно случаи с выраженной гепато- и спленомегалией). Назначают внутрь, дозируя строго индивидуально. Обычная суточная доза для взрослых 20 мг (0,02 г). Курс лечения и дозы весьма вариабельны и определяются выраженностью клинического и цитостатического эффекта. Оказывает выраженное угнетающее действие на лейкопоэз и в меньшей степени на тромбоцитопоэз. При передозировке или повышенной индивидуальной чувствительности возможно развитие лейкопении, тромбоцитопении и сильное угнетение кроветворения. Противопоказан в терминальных стадиях миелолейкоза и на фоне бластных кризов; сублейкемических формах лейкоза с числом лейкоцитов менее $30 \cdot 10^{9}$/л и тромбоцитов ниже $100 \cdot 9^{9}$/л, а также тяжелых сопутствующих заболеваних (активном туберкулезе, паренхиматозном гепатите нефрите и др.).

ГЕКСЕНАЛ (Hexenalum). Синонимы: Evipan sodium, Hexobarbitalum natricum, Narconal. Оказывает снотворное, а в больших дозах наркотическое действие. Применяют для вводного и кратковременного наркоза; при небольших хирургических вмешательствах, бо-

лезненных перевязках, диагностических исследованиях. В/в медленно в виде 1-5% раствора. Доза для вводного наркоза 0,3-0,5 г; максимальная 1 г. Готовые растворы хранят не более 1 ч. Иногда угнетается дыхание и нарушается сердечная деятельность. Противопоказан при нарушениях функции печени и почек, гипотонии, лихорадочных состояних, воспалительных процессах в носоглотке.

ГЕЛЕВИН. Порошок химически сшитого [illegible] вого спирта, сорбент, обладающий [illegible] мощным дренирующим, противо[illegible] и гемостатическим действием, [illegible] ющей способностью [illegible] жидкостям, купир[illegible] ных изменений, ус[illegible] и рост грануляци[illegible] меняется для лечения [illegible] воспаления (в период [illegible] ний и в период очищения раны [illegible] гнойно-некротических масс), [illegible] ческих язв и ожоговых ран с осложненным течением, нанося в виде адсорбирующей повязки из сыпучего мелкозернистого порошка, непосредственно на раневую поверхность. Применение сорбента приводит к сорбции раневого экссудата и образованию мягкого гелеобразного слоя на раневой поверхности любой конфигурации, не раздражающего ткани раны. Останавливает капиллярные кровотечения за 15-60 сек при любых

спектрах и видах микрофлоры, уменьшает уровень инфицирования, улучшает микроциркуляцию, обеспечивает хороший газо- и водообмен в ране и безболезненность перевязок.

ГЕЛИОМИЦИНОВАЯ МАЗЬ (Unguentum Heliomycini). Действующее вещество - антибиотик гелиомицин, продуцируемый лучистым грибком Actinomyces flavochromogenes, var. heliomycini. Оказывает сосудосуживающее действие и активен в отношении грамположительных микробов и некоторых вирусов; малотоксичен. Применяют при пиодермии, инфицированных экземах, пузырчатке новорожденных, варикозных трофических язвах, пролежнях, трещинах, ринитах и др. Наносят на пораженные участки 1-2 раза в день в течение 5-7 дней и более. Повязку накладывают через 10-15 мин после нанесения мази. В носовые ходы вводят ватные тампоны с мазью на 20-30 мин.

ГЕМАТОГЕН (Haematogenum). Препарат из дефибринированной крови убойного скота. Оказывает противоанемическое действие. Применяют при анемии, упадке питания внутрь в плитках по 1-2 доли на прием 2-3 раза в день.

"ГЕМОСТИМУЛИН" ("Haemostimulinum"). Препарат изготовляют из лактата

[illegible] и пище- [illegible] сухого [illegible] мина. Стимулятор кроветворения. Применяют при гипохромных анемиях различной этиологии. Внутрь во время еды по 0,25-0,5 г 3 раза в день (запивают разведенной хлористоводородной кислотой - по 10 капель на полстакана воды) в течение 3-5 нед. Возможна тошнота. Противопоказан при поносе, рвоте.

"ГЕНДЕВИТ" ("Hendevitum"). Состав: ретинола ацетата 0,001 г (3300 МЕ), тиамина бромида 0,00194 г, рибофлавина 0,0015 г, цианокобаламина 10 мкг, фолиевой кислоты 0,0005 г, никотинамида 0,01 г, кальция пантотената 0,003 г, пиридоксина гидрохлорида 0,002 г, аскорбиновой кислоты 0,075 г, α-токоферола ацетата 0,005 г, эргокальциферола 250 МЕ. Применяют для профилактики витаминной недостаточности в период беременности и кормления внутрь по 1-2 драже в день после еды.

ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ (Gentamycini sulfas). Антибиотик, продуцируемый Mycromonospora purpurea или Echinospora. Синоним: Garamycin. Обладает широким спектром антимикробного действия, подавляет рост большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, высокоактивен в отношении палочки сине-зеленого гноя. Применяют при инфекциях мочевыводя-

щих путей (пиелонефрите, цистите, уретрите), дыхательного тракта (пневмонии, плеврите, эмпиеме, абсцессе легкого), хирургических инфекциях (хирургическом сепсисе, перитоните), инфекциях кожи (фурункулезе, дерматите, трофических язвах, ожогах), вызванных возбудителями, устойчивыми к другим антибиотикам широкого спектра действия. В/м при инфекциях мочевыводящих путей разовая доза для взрослых составляет 0,4 мг/кг, суточная 0,8-1/2 мг/кг (вводят в 2-3 приема). При инфекциях других локализаций суточная доза 2,4-3,2 мг/кг (курс 6-8 дней). Местно в виде 0,1 % растворов, присыпок, мазей, а также путем ингаляций из расчета 4 мг/мл 4 раза в день. Может давать ототоксический, реже нефротоксический эффект.

ГЕПАРИН (Heparinum). Полисахарид, состоящий из глюкуроновой кислоты и глюкозамина. Синонимы: Thromboliguin, Vetren. Антикоагулянт прямого действия, применяемый для профилактики и лечения тромбоэмболических осложнений при инфаркте миокарда, операциях на сердце и кровеносных сосудах, тромбоэмболии легочных и мозговых сосудов, центральной вены сетчатки, тромбофлебитах конечностей. Парентерально по 20 000-50 000 ЕД/сут (в зависимости от показаний); при поверхностном тромбофлебите, флебите после инъекций и травматиче-

ской гематоме местно в виде мази. Возможны местное раздражающее действие, гематома и болезненность при парентеральном введении. Противопоказан при геморрагическом диатезе, лейкозах, анемии, повышенной проницаемости сосудов, [illegible] язвенных и воспа- [illegible] кишечного тракта, [illegible] сопровождающихся [illegible] нарушениях [illegible] почек, операциях на мозге и [illegible]

"ГЕПАРОИД" МАЗЬ (Unguentum "Heparoid"). Состав: в 30 г мази содержится 6000 ЕД гепарина. Обладает антикоагулянтным действием при поверхностных тромбофлебитах, язвах конечностей, гематомах. Слегка втирают в пораженное место и вокруг него и накрывают компрессной бумагой. Противопоказан при геморрагическом диатезе, гемофилии, тромбоцитопении.

"ГЕПТАВИТ" ("Heptavitum"). Состав: ретинола ацетата 0,009 г (26 400 МЕ), тиамин бромида 0,0129 г, рибофлавина 0,01, пиридоксина гидрохлорида 0,01, никотинамида 0,075 г, рутина 0,1 г, кислоты аскорбиновой 0,2 г. Применяют при поражениях, заболеваниях кожи (отморожениях, ожогах, вяло гранулирующих ранах, экземах, туберкулезе кожи и др.), псориазе, заболеваниях глаз (пиг-

...ментном рените, гемералопии, ксеро[illegible]
...зии, ксерофтальмии и др.). Внутрь [illegible]
...еды по 1 табл. 1-2 раза в день (курс 20
дней); повторяют через 1-3 ме[illegible]

ГЕРФОНАЛ (Gerfonal). Анти[illegible]рессант, применяемый при [illegible] различного характера, в том числе [illegible] климактерического периода, реактивных депрессиях с психомоторным возбуждением. Дозировка индивидуальна. Для стационарного лечения рекомендуются суточные дозы 200-400 мг, для амбулаторного лечения - 150-200 мг (суточную дозу распределяют равномерно).

ГИДРЕА (Hydrea). Гидроксикарбамид. Синонимы: литалир, гидроксимочевина, гидроксикарбамид, оксикарбамид. Цитостатическое средство. Вызывает задержку синтеза ДНК без нарушения синтеза РНК или протеина. Применяют в основном при хроническом миелолейкозе и истинной полицитемии, используют в составе комбинированного или комплексного лечения при опухолях головы и шеи, при меланоме кожи, при раке толстой и прямой кишки, при раке шейки матки, раке почки и предстательной железы; применяют также для лечения псориаза. Капсулы принимают до еды с небольшим количеством жидкости. При хроническом миелолейкозе доза может колебать-

ся от 6 капсул в сутки до 1 капсулы 2-3 раза в неделю. Обычная дневная доза 30-50 мг/кг массы тела с учетом количества лейкоцитов в крови: при гиперлейкоцитозе 150 000-200 000 и выше - 4-6 капсул в сутки (2000-3000 мг), при количестве лейкоцитов 50 000-100 000 достаточно 2-3 капсулы в сутки (1000-1500 мг), при лейкоцитозе 20 000-30 000 -1-2 капсулы в сутки. При нормальном количестве лейкоцитов или небольшом лейкоцитозе (15 000-20 000 в 1 мм^3) назначают поддерживающую дозу по 1 капсуле через сутки или 2 раза в неделю. При больших размерах опухолевой массы (высокий лейкоцитоз, больших размеров селезенка) одновременно необходимо назначать аллопуринол для предотвращения урекемии, [illegible] снижение количества лейкоцитов наступает достаточно быстро. При [illegible] гидреа количество лейкоцитов [illegible] быстро увеличиваться и [illegible] высоких цифр через 10-12 дней. При бластном кризе миелолейкоза и острых лейкозов препарат практически не эффективен. При эритремии (истинной полицитемии) гидреа назначают в дозе от 500 мг до 2000 мг в сутки до наступления нормализации показателей крови. После достижения ремиссии - поддерживающая терапия по 500 мг препарата ежедневно постоянно. В противоопухолевой терапии солидных

опухолей назначают в случаях резистентности опухолей к основным лечебным препаратам. При монохимиотерапии перорально вводят либо в режиме непрерывной терапии- ежедневно по 1-2 г/м^2 в сутки (суточную дозу делят на 2-3 приема); либо в режиме прерывистой терапии - 1 раз в 3 суток в дозе 2-3 г/м^2. Во всех случаях лечение должно быть остановлено при снижении лейкоцитов до 2500 или тромбоцитов до 100 тысяч клеток в 1 мкл. Противопоказан при повышенной чувствительности, лейкоцитопении (менее 3000/мм3), тромбоцитопении (менее 100000/мм3), беременности и периоде кормления грудью. Возможны депрессия костного мозга, которая проявляется нейтропенией, поздней мегалобластной анемией и слабовыраженной тромбоцитопенией; атрофические дерматиты, пятнисто-папулезные высыпания на коже и даже частичная алопеция. Иногда возникают небольшая лихорадка, стоматиты, головокружения и головная боль.

ГИДРОКОРТИЗОН (Hydrocortisonum). Глюкокортикостероид. Аналогичен кортизону, но более активен. Применяют при артритах, вводят в полость суставов (иногда в/м) 0,2-0,3 мл; при острой недостаточности надпочечников в/в 25-50 мг; в офтальмологии (конъюнктивит, блефарит, дерматит век и др.) в виде 0,5 % мази. При в/м введении побочное действие

и противопоказания те же, что и для кортизона ацетата.

ГИДРОПЕРИТ (Hydroperitum). Таблетки, содержащие комплексное соединение перекиси водорода (35%) с мочевиной. Применяют наружно (взамен перекиси водорода) как дезинфицирующее и дезодорирующее средство при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек, кожи, некоторых гинекологических заболеваниях в виде промываний (1-4 табл. на стакан воды).

"ГИОКСИЗОН", МАЗЬ (Unguentum "Hyoxysonum"). В 1 г мази содержится: окситетрациклина гидрохлорида 0,03 г, гидрокортизона ацетата 0,01 г. Оказывает антимикробное и противовоспалительное действие. Применяют при инфицированных язвах и ранах, гнойниковых заболеваниях кожи, эрозиях и т.д.: смазывают пораженные участки 1-3 раза в день. В отдельных случаях аллергические кожные реакции. Противопоказан при туберкулезе кожи, микозе, вирусных и аллергических заболеваниях кожи.

"ГИПОЗОЛЬ" ("Hyposolum"). Комбинированный пенный препарат. Состав (из расчета на 1 баллон): облепиховое масло 15 г, метилурацил 1 г, этазол-натрия 1 г, препарат ОС-20 1,65 г, эмульгатор Т-2 4,35, пропиловый эфир п-окси-

бензойной кислоты 0,05 г, спирт этиловый 95% 0,25 г, вода дистиллированная 26,7 г, дихлордифторметан (хладон-12) 5 г. Оказывает противовоспалительное и стимулирующее действие на репаративные процессы в мягких тканях. Применяют при неспецифических вульвитах, кольпитах, эрозиях шейки матки, проктитах, после диатермокоагуляции шейки матки, после удаления тела матки, при ранах прямой кишки, после операции на прямой кишке и промежности. Наносят на пораженный участок; при вульвитах и кольпитах 1-2 раза в день; при эндоцервиците и эрозии шейки матки - 2-3 раза в неделю. Длительность лечения 2-3 нед. За 1 ч до введения препарата во влагалище проводят спринцевание отваром ромашки или череды. При проктитах предварительно назначают очистительную клизму с отваром ромашки или календулы, затем вводят в прямую кишку аэрозоль-пену. Курс 2-3 нед.

ГИПОТИАЗИД (Hypotiazid). Синонимы: дихлотиазид, Esidrex, Nefrix. Активное диуретическое средство; оказывает также гипотензивное действие. Применяют при отеках при недостаточности кровообращения; циррозах печени с портальной гипертензией, гипертонической болезни, нефрозе и нефрите; токсикозах беременных, глаукоме. Внутрь до еды по 0,025-0,05 г в день, в тяжелых случаях до

0,2 г в день; 3-7 дней с перерывом 3-4 дня. При гипертонической болезни по 0,025-0,05 г в сочетании с другими гипотензивными средствами. Возможны слабость, диспептические явления, дерматиты, гипокалиемия и гипохлоремический алкалоз. Противопоказан при недостаточности функции почек.

ГИСМАНАЛ (Hismanal). Синоним: астемизол. [illegible] препарат, [illegible] рецепторы. Приме[illegible] лечения, [illegible] лихорад[illegible], аллергиче[illegible] хрониче[illegible] 1 табл. (10 мг) [illegible] (10 мг) один раз в [illegible] завтрака. Детям в [illegible] 1/2 табл. (5 мг) или 2,5 мл суспензии [illegible] в день; детям младше 6 лет назначают 2 мг/10 кг массы тела в день. Препарат может повышать аппетит. Не назначают детям младше 2 лет, с осторожностью назначают беременным, не рекомендуется во время кормления грудью.

ГИСТАЗОЛ (Histazol). Противоаллергическое средство. Сильный антагонист гистаминных H1-рецепторов пролонгированного действия. Способен предотвращать симптомы аллергической реакции в течение 24 ч. Применяют для

профилактики и лечения сезонного и хронического аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, хронической крапивницы и других аллергических реакций. Взрослым и детям старше 12 лет - 1 табл. 1 раз в день. Детям 6-12 лет - 1/2 табл. (5 мг) 1 раз в день. Детям младше 6 лет - 0,2 мг/кг массы тела 1 раз в день. В очень тяжелых случаях в начале терапии суточная доза препарата может быть увеличена. Максимальный эффект достигается при приеме гистазола натощак. После длительного приема может отмечаться минимальное увеличение массы тела. Противопоказан беременным.

ГИСТАМИН (Histaminum). Вызывает спазм гладкой мускулатуры, расширение капилляров и снижение АД, учащение сердечных сокращений, усиление секреции желудочного сока. Применяют при полиартритах, ревматизме, боли, вызванной поражением периферических нервов, аллергических заболеваниях; для диагностики и экспериментальных исследований. Внутрикожно, подкожно и в/м по 0,1-0,5 мл 0,1% раствора; для электрофореза 0,1% раствор препарата. При передозировке и повышенной чувствительности коллапс, шок.

ГИСТИДИНА ГИДРОХЛОРИД (Histidini hydrochloridum). Синонимы: Laristin, Stellidin. Применяют при язвен-

ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатите. В/м по 5 мл 4 % раствора в течение 25-30 дней (ежедневно), затем каждые 2-3 мес по 5-6 инъекций.

ГИСТОДИЛ (Histodil). Синонимы: Cimetidin, Tagamet, Belomet. Антигистаминное средство, уменьшает секрецию хлористоводородной кислоты в желудке. Применяют при доброкачественной язве желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагите, синдроме Золлингера-Эллисона, неактивной фазе эрозивных желудочных геморрагий. Внутрь по 200 мг 3 раза в день во время еды и по 400 мг перед сном (1 г в день); можно вводить в/м или в/в медленно в дозе 200 мг (при необходимости инъекции повторяют через 4-6 ч). Возможны головокружение, утомляемость, сыпь. Очень редки нефрит или острый панкреатит.

ГИФОТОЦИН (Hyphotocinum). Препарат гипофиза. Синоним: питуитрин М. Оказывает окситоцическое действие. Применяют при слабой родовой деятельности, переношенной беременности, гипотонических послеродовых кровотечениях; для нормализации инволюции матки после родов и аборта. В/м в первом периоде родов по 0,2-0,4 мл 4-6 раз в день (через каждые 30 мин); во втором периоде родов до 1 мл или в/в капельно в 500 мл 5 % раствора глюкозы или мед-

ленно в 40 мл 40 % раствора. Противопоказан при несоответствии размеров головки плода и таза, рубцах и угрожающем разрыве матки, неправильном положении плода.

ГЛАУЦИНА ГИДРОХЛОРИД (Glaucini hydrochloridum). Алкалоид, выделенный из надземной части растения мачек желтый (Glaucinum flavum Grantz). Синонимы: главент, Tussiglaucin. Оказывает противокашлевое и гипотензивное действие. Применяют для успокоения кашля при заболеваниях легких и верхних дыхательных путей. Особенно показан, если повышено АД. Внутрь после еды по 0,05 г - 2-3 раза в день. Может вызывать легкое кратковременное головокружение. Противопоказан при гипотонии, инфаркте миокарда.

ГЛИБУТИД (Glibutidum). Синонимы: адебит, силубин, буформин и др. Гипогликемизирующее средство, применяемое при легких формах сахарного диабета, сопровождающихся ожирением, в сочетании с инсулином при инсулинорезистентных формах диабета, а также при резистентности к препаратам сульфомочевины; лабильном течении диабета. Внутрь во время еды, начиная с 0,05-0,1 г/сут с последующим повышением дозы до 0,3 г. Поддерживающие дозы 0,05-0,1 г утром и 0,05 г вечером. Возможны потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, ме-

таллический вкус во рту, при длительном применении слабость, похудание. Противопоказан при отсутствии в организме эндогенного инсулина, коматозном состоянии, ацидозе, инфекционных заболеваниях, альбуминурии на почве диабетической нефропатии, поражении печени, гангрене конечностей, беременности.

ГЛИВЕНОЛ (Glyvenol). Синтетическое активное вещество из класса глюкофуранозидов. Уменьшает проницаемость капилляров, обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Применяют при нарушениях венозного кровообращения (ощущение усталости, напряжения и тяжести в ногах, отечность и болезненные явления после длительного стояния или сидения), варикозном расширении вен [illegible] симптомы заболевания, статические отеки, трофические поражения кожи, флебалгия; геморрое; в качестве дополнительного средства при флебите и перифлебите, варикозных язвах, застойных дерматозах. Средняя суточная доза составляет 600-800 мг, т.е. по 1 драже (200 мг) 3-4 раза в день или по 1 капсуле (400 мг) 2 раза в день. Драже и капсулы следует принимать во время либо после еды, не разжевывая, и не прерывать курса в течение нескольких недель даже при исчезновении симптомов заболевания. Рекомендуется периодически повторять курс лечения при хронической

нагрузке на нижние конечности, связанной с профессиональной деятельностью или работой по дому, особенно в теплое время года. Возможны желудочно-кишечные расстройства и высыпания на коже. В последнем случае лучше отменить препарат и провести симптоматическое лечение. Противопоказан при повышенной чувствительности к активному веществу гливенола.

ГЛИНА БЕЛАЯ (Bolus alba). Применяют как обволакивающее и адсорбирующее средство внутрь (10-100 г) при желудочно-кишечных заболеваниях (колика, энтериты); наружно в виде присыпок, мазей, паст при кожных заболеваниях.

ГЛИЦЕРИНОВЫЕ СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ (Suppositoria glicerini). Применяют как слабительное средство при запорах различной этиологии per rectum по 1 суппозиторию 1 раз в сутки через 15-20 мин после завтрака. При длительном применении неприятные ощущения в прямой кишке; иногда катаральный проктит Противопоказаны при трещинах заднего прохода, обострении геморроя, опухоли прямой кишки.

ГЛИЦЕРОФОСФАТ (Glycerophoshatum). Состав: кальция глицерофосфата 10 частей, натрия глицерофосфата 2 части, сахара 88 частей. Применяют в каче-

стве общеукрепляющего и тонизирующего средства при общем упадке питания, переутомлении, истощении нервной системы, рахите. Внутрь по 1/2-1 ч.л. 2-3 раза в день.

ГЛИЦИРАМ (Glycyrramum). Выделен из корней солодки голой (Glycyrrhiza glabla L.). Обладает противовоспалительными свойствами и оказывает стимулирующее влияние на кору надпочечников. Применяют при бронхиальной астме, аллергических дерматитах, экземах и других заболеваниях. Внутрь по 0,05-0,1 г 2-4 раза в день (за 30 мин до еды). Курс от 2 нед до 6 мес. В тяжелых случаях разовая доза составляет 0,1 г 3-6 раз в день. Противопоказан при органических поражениях сердца и нарушениях функции печени и почек.

ГЛУДАНТАН (Gludantanum). Применяют при различных формах паркинсонизма (особенно при нейролептическом и посттравматическом), а также в качестве корректора побочных эффектов, возникающих при применении нейролептических препаратов. Внутрь по 0,2 г после еды 2-4 раза в день. Оптимальная суточная доза 0,8 г.Курс 2-6 мес и более. Возможны изжога, тошнота, сухость во рту, головокружение, боль в области сердца, учащение сердцебиения, зуд кожи. Противопоказан при беременности, ост-

рых и хронических заболеваниях печени, почек и желудка.

"ГЛУТАМЕВИТ" ("Glutamevitum"). Состав: ретинола ацетата 0,001135 г (3300 МЕ), тиамина бромида 0,00258 г, рибофлавина 0,02 г, пиридоксина гидрохлорида 0,003 г, кислоты аскорбиновой 0,1 г, α-токоферола ацетата 0,02 г, никотинамида 0,02 г, кислоты фолиевой 0,00005 г, рутина 0,02 г, кальция пантотената 0,01 г, кислоты глутаминовой 0,25 г, железа сульфата закисного 0,01 г, меди сульфата 0,002 г, калия сульфата 0,0025 г, кальция фосфата 0,04 г. Применяют для повышения работоспособности в качестве лечебно-профилактического средства у взрослых, занятых тяжелым физическим трудом, при длительном умственном напряжении и интенсивных тренировках у спортсменов. Внутрь через 15-30 мин после завтрака и обеда 2 раза в день. Разовая доза 1-3 табл., суточная - 2-6 табл. Для спортсменов 2-4 табл., при наиболее интенсивных нагрузках до 6 табл. в день в течение 2-4 нед. Повторный курс назначают через 1-3 мес.

ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА (Acidum glutaminicum). Играет важную роль в обмене веществ, особенно в белковом обмене. Применяют при заболеваниях ЦНС, эпилепсии, психозах, реактивных состояниях, сопровождающихся депрес-

сией, истощением и др.; в педиатрии при задержке развития, болезни Дауна, полиомиелите (острый и восстановительный период) и др. Внутрь по 1 г 2-3 раза в день; детям 2-3 раза в день в зависимости от возраста: до 1 года по 0,1 г, от 1 года до 3 лет по 0,15 г, в возрасте 3-4 лет 0,25 г, 5-6 лет 0,4 г, 7-9 лет 0,5-1 г, 10 лет и старше 1 г на прием. Возможны рвота, жидкий стул, возбуждение ЦНС; при длительном применении-лейкопения, уменьшение содержания гемоглобина. Противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кроветворных органов, повышенной возбудимости ЦНС.

ГЛЮКОЗА (Glucosum). Синоним: Декстроза. Dextrosum. Повышает энергетические запасы организма и улучшает его функции. Применяют при гипогликемии, инфекционных заболеваниях, декомпенсации сердечной деятельности, заболеваниях печени, отеке легких, геморрагических диатезах, шоке, коллапсе и др., а также для разведения сердечных гликозидов и пополнения организма жидкостью. Внутрь по 0,5-1 г на прием; подкожно до 300-500 мл изотонического раствора; в/в (капельно) и в клизмах до 2 л изотонического раствора в сутки, в/в до 20-50 мл 40% раствора per se и с 1% раствором аскорбиновой кислоты; при отравлениях синильной кислотой с 1% раствором метиленового синего.

ГЛЮРЕНОРМ (*Glurenorm*). Синоним: гликвидон. Пероральный быстродействующий антидиабетический препарат. Стимулирует секрецию инсулина β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Применяют при сахарном диабете у больных среднего и пожилого возраста в тех случаях, когда назначение диеты недостаточно для того, чтобы обеспечить у них нормальный углеводный обмен. Благоприятен при почечной недостаточности. Назначают от 1/2 табл. (15 мг) до 4 табл. (120 мг) в сутки. Обычно средняя суточная доза 45 мг в день (зависит от индивидуальных особенностей обмена у больных). Превышение суточной дозы в 4 табл. (120 мг), как правило, не приводит к дальнейшему улучшению углеводного обмена. Суточные дозы можно принимать однократно за завтраком либо делить на 2-3 приема в часы еды. Препарат не следует применять при диабете, сопровождающемся дефицитом инсулина, диабетической коме и прекоматозном состоянии, при выраженной декомпенсации обмена, сопровождающейся ацидозом и кетозом, при аллергии к сульфаниламидам, а также при беременности. В редких случаях могут наблюдаться гипогликемические реакции, аллергические кожные проявления, изменения картины крови или явления непереносимости со стороны желудочно-кишечного тракта.

"ГЛЮФЕРАЛ" ТАБЛЕТКИ (Tabulettae "Gluferalum"). В 1 табл. 0,025 г фенобарбитала, 0,005 г кофеина-бензоата натрия, 0,07 г бром.изовала, 0,2 г глюконата кальция. Противосудорожное средство, применяемое при эпилепсии и различных видах эпилептических абсансов (petit mal). Внутрь после еды. Для взрослых 2-4 табл. на прием, максимальная суточная доза - 10 табл. Детям от 1/2 до 1 табл. на прием, максимальная суточная доза для детей до 10 лет - 5 табл. В первые дни лечения - сонливость, при передозировке - головокружение, шаткость походки.

ГОМАТРОПИНА ГИДРОБРОМИД (Homatropini hydrobromidum). Аналогичен атропину, но менее активен и действие его менее продолжительно. Применяют в офтальмологии в виде 0,25-1% водных растворов для расширения зрачка и как средство, вызывающее паралич аккомодации (при исследовании глазного дна). Противопоказания те же, что и при применении атропина сульфата.

ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ (Gonadotropinum chorionicum). Гормональный препарат, выделяемый из мочи беременных женщин. Синонимы: хориогонин, Gonabion. Применяют при нарушениях менструального цикла и бесплодии у женщин, связанных с отсутствием овуляции и недостаточностью жел-

того тела (при достаточной эстрогенной функции яичников); у мужчин - при генетических нарушениях с явлениями гипогенитализма, евнухоидизма; гипоплазии яичек, крипторхизме; адипозогенитальном синдроме, гипофизарной карликовости с наличием полового инфантилизма и др. В/м от 500 до 3000 ЕД ежедневно или 1-2 раза в неделю. Курс от 5-6 дней до 6 нед. Возможны аллергические реакции, чрезмерное увеличение яичек в паховом канале. Противопоказан при воспалительных заболеваниях половой сферы, гормонально-активных опухолях половых желез, отсутствии половых желез (врожденное или после операции).

ГОНАДОТРОПИН МЕНОПАУЗНЫЙ (Gonadotropinum menopausalis). Стимулирует рост яичников и созревание в них фолликулов. Применяют при бесплодии у женщин с гипофункцией яичников и ановуляторными циклами (первичная или вторичная аменорея центрального генеза, гипоменструальный синдром), синдроме Шиена, синдроме Киари-Фроммеля, бесплодии у мужчин эндокринного генеза (гипогонадотропный гипогонадизм, евнухоидизм). Женщинам вводят в/м по 75-150 ЕД в день (соответственно в 1 или 2 мл изотонического раствора хлорида натрия) в течение 10 дней или дольше. Мужчинам назначают 75 ЕД

препарата в сочетании с гонадотропином хорионическим (1000-2000 ЕД). Оба препарата вводят в/м через день на протяжении 90-120 дней. При чрезмерной стимуляции яичников их размеры могут увеличиться, при этом появляется боль в области таза и резко возрастает экскреция эстрогенов с мочой; возможна многоплодная беременность у женщин. При появлении симптомов гиперстимуляции яичников введение препарата прекращают.

ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО ТРАВА (Herba Adonidis vernalis). Адонис весенний, черногорка. Содержит сердечные гликозиды - К-строфантин-β, цимарин, адонитоксин; флавоновый гликозид адониверник; сапонины. Кардиотоническое средство. Применяют при хронической недостаточности кровообращения (легкие формы). В виде настоя (4,0:200,0-6:200,0) по 1 ст. л. 3-4 раза в день до еды.

ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО ТРАВА (ПОЧЕЧУЙНАЯ ТРАВА) (Herba Polugoni persicariae). Содержит флавоноиды, гликозиды (гиперозид, авикулярин, кверцитрин), дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, витамин К. Применяют как мягкое слабительное средство при атонических и спастических запорах и кровоостанавливающее при геморроидальных и маточных кровотечениях в виде настоя (10,0:200,0) по 1 ст. л. 3 раза в день.

ГОРЦА ПТИЧЬЕГО ТРАВА (трава спорыша) (Herba Polugoni avicularis). Содержит флавоноловые гликозиды - кверцетин, гиперозид, авикулярин, дубильные вещества. Применяют в качестве противовоспалительного, способствующего отхождению конкрементов средства при камнях в почках и мочевом пузыре в виде настоя (10,0:200,0-15,0:200,0) по 2 ст. л. 3 раза в день перед едой.

ГОРЧИЧНИКИ (Charta sinapis). Листы бумаги, покрытые обезжиренным порошком сарептской горчицы. Применяют в качестве раздражающего кожу и отвлекающего средства.

ГОССИПОЛ (Gossipolum). Продукт, получаемый при переработке хлопчатника. Обладает активностью в отношении различных штаммов вирусов, в том числе дерматотропных штаммов вируса герпеса. Применяют при опоясывающем лишае, простом пузырчатом лишае и псориазе. Линимент госсипола наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 4-6 раз в сутки. Курс 5-7 дней.

ГРАМИЦИДИН С (Gramicidinum C). Продуцируется споровой палочкой Bacillus brevis, var. G-B. Синоним: Gramoderm. Оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие в отношении стрептококков, стафилококков,

пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции и других микробов. Применяют при поверхностных нагноительных процессах, инфицированных ранах, язвенных поражениях кожи, эрозии шейки матки, воспалительных заболеваниях уха, горла. Применяют местно (промывания, орошения, повязки, тампоны), раствором (1:100) в стерильной дистиллированной или кипяченой питьевой воде.

ГРАМИЦИДИНОВАЯ ПАСТА (Pasta gramicidini). Состав: 2% раствор грамицидина С 98,9 г, кислоты молочной 40% до получения пасты pH 3,5-4,5, эмульгатора № 1 150 г, воды дистиллированной до 1000 г. Оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие в отношении различной микрофлоры. Даже в слабых концентрациях убивает сперматозоиды. Используют как контрацептивное средство, а также при воспалительных заболеваниях влагалища и шейки матки, свежих ожогах I и II степени в стадии грануляции, гнойных ранах мягких тканей, пиодермии. Пасту наносят шпателем на стерильную марлевую салфетку, которую кладут на раневую поверхность (меняют через 2-4 дня). В качестве контрацептивного средства 596 г препарата специальным шприцем вводят во влагалище. Возможна небольшая болезненность в случае попадания препарата на ожоговую поверхность, лишенную эпителия.

ГРАМУРИН (Gramurinum). Синоним: Acidum oxolinicum. Химиотерапевтическое средство широкого спектра действия, обладающее антибактериальной активностью. Применяют при цистите, пиелонефрите, пиелите, пиелоцистите, бактериурии, для профилактики инфекций при диагностическом вмешательстве (катетеризация, цистоскопия). Внутрь взрослым и детям старше 12 лет по 2 табл. 3 раза в день, детям от 2 до 12 лет - по 1 табл. 3 раза в день непосредственно после еды в течение 10 дней. Не назначают беременным и детям до 2-летнего возраста.

ГРАНДАКСИН (Grandaxinum). Синоним: Tofisopam. Психовегетативный регулятор, применяемый при заболеваниях, сопровождающихся вегетативными расстройствами, напряжением: в малой психиатрии - при реактивной депрессии, апатии; при синдроме алкогольной абстиненции, при предделириозном и делириозном состоянии для лечения симптомов возбуждения и вегетативных расстройств. Курсовое лечение 1-2 табл. 1-3 раза в день (0,05-0,3 г), в остальных случаях 1-2 табл. на прием. Возможны нарушения функции желудочно-кишечного тракта, зуд, экзантема. С осторожностью назначают водителям транспорта и лицам, работающим на высоте. Не рекомендуется применять в первые 3 мес беременности.

ГРИЗЕОФУЛЬВИН (Griseofulvinum). Синонимы: Biogrisin, Gricin. Обладает фунгистатической активностью по отношению к разным видам дерматофитов (трихофитоны, микроспориумы, ахорионы, эпидермофитоны). Применяют при фавусе, трихофитии и микроспории волосистой части головы и гладкой кожи, эпидермофитии гладкой кожи, онихомикозах, вызванных патогенными грибами, чувствительными к гризеофульвину. Внутрь во время еды по 0,125 г 4 раза в день. При микроспории волосистой части головы доза может быть увеличена на 0,125-0,25 г. Дозы для детей уменьшают в соответствии с возрастом, и препарат назначают в виде суспензии внутрь перед едой по 1 ч. л. или д. л. 2-4 раза в день. Наносят тонким слоем на очаги поражения. Суточная доза не более 30 г. Лечение следует продолжать не менее 2 нед после исчезновения клинических симптомов. Возможны головная боль, головокружение, дезориентация, тошнота, крапивница, эозинофилия, лейкопения, очень редко лейкоцитоз. Противопоказан при лейкопении, системных заболеваниях крови, органических заболеваниях печени и почек, порфириновой болезни, злокачественных новообразованиях, беременности. Не следует назначать препарат амбулаторно водителям транспорта, летчикам, лицам, занятым на высотных работах.

ГРУДНОЙ ЭЛИКСИР (ЛАКРИЧНЫЙ) (Elixir pertrorale seu elixir cum extracto Glycyrrhizae). Состав: экстракта солодкового корня густого 20,7 г, масла эфирного анисового 0,34 г, аммиака водного 3,44 г, спирта этилового 20,41 мл, воды дистиллированной до 100 мл. Применяют в качестве отхаркивающего средства при кашле по 20-40 капель на прием; детям число капель на прием по числу лет ребенка.

ГУМИЗОЛЬ (Humisolum). Препарат морской (хаапсалуской) лечебной грязи. Биогенный стимулятор, применяемый при хронических и подострых радикулитах, плекситах, невралгии, ревматическом артрите (неактивная форма), инфекционной неспецифическом полиартрите, артрозе, хронических заболеваниях среднего уха, околоносовых пазух, фарингитах, ринитах и др. В/м по 1-2 мл 1 раз в день. Курс 20-30 дней. Детям по 1 мл в течение 20-25 дней. При пародонтозе можно применять методом электрофореза (15-20 сеансов через день). Противопоказан при острых лихорадочных заболеваниях, декомпенсированном пороке сердца, выраженном атеросклерозе и тиреотоксикозе, активной форме туберкулеза, нарушениях функции печени и почек, опухолях, психозах.

ГУТТАЛАКС (Guttalax). Содержит двунатриевую соль 4,4-(2-пиколиден)-

бисфенил серной кислоты 75 мг, метиловый эфир пара-оксибензойной кислоты 14 мг, 70% раствор сорбита 5 мл, деминерализованной воды до 10 мл. Оказывает сильное и быстрое слабительное действие путем прямого стимулирования толстой кишки. Применяют при всех видах запоров, как атонических, так и спастических (особенно при запорах, связанных с диетой, неподвижностью, беременностью, чрезмерным весом и т.д.); для облегчения опорожнения кишечника у больных, страдающих геморроем, анальными трещинами, в послеоперационном периоде. Взрослым назначают от 5 до 10 капель в небольшом количестве воды. При стойком запоре дозу можно увеличить до 15 капель и более. Детям 2-12 лет рекомендуется от 2 до 5 капель в небольшом количестве воды. Можно применять в любое время суток, эффект через 6-10 ч. Противопоказан при остром животе, не рекомендуется во время беременности.

ДАКТИНОМИЦИН (*Dactinomycinum*). Синоним: актиномицин D. Антибиотик из группы актиномицинов, противоопухолевое средство, применяемое при хорионэпителиоме матки, опухоли Вильмса, рабдомиосаркоме, ретикулосаркоме, саркоме Юинга, лимфогранулематозе, тератобластоме яичка, миланобластоме. В/в взрослым по 0,0005 г ежедневно в течение 5 дней или через

течение 2-3 нед. Детям из расчета 0,000015 г/кг. Повторные курсы через 2-3 нед при отсутствии токсических явлений. Возможны тошнота, рвота, повышение температуры, стоматит, боль в животе, кожная эритема, алопеция, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения. Противопоказан при общем тяжелом состоянии, лейкопении и тромбоцитопении, беременности, нарушении функции почек и печени.

ДАЛАРГИН (Dalargin). Оказывает влияние практически на все функции органов пищеварительного тракта. Предотвращает развитие дистрофических и атрофических изменений в слизистой желудочно-кишечного тракта и усиливает ее регенерацию, выделение защитных компонентов слизи желудка, снижает секрецию соляной кислоты, нормализует микроциркуляцию и лимфоток в зоне повреждения. Обладает антистрессорным действием, снижая уровень АКТГ и кортикостероидов в крови и тканях. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В/в или в/м по 1 мг в 1 мл изотонического раствора натрия хлорида. Курсовая доза 30-50 мг. При необходимости разовая доза может быть увеличена до 2 мг, а суточная - до 5 мг. Возможно понижение артериального давления. Противопоказан при беременности, склонности к гипотонии.

ДАЛАЦИН-Ц (Dalacin-C). Антибактериальный препарат для лечения смешанных инфекций. Синоним: клиндамицин. Применяют при тонзилите, синусите, скарлатине, бронхите, пневмонии, эмпиеме, абсцессе легкого, фурункулах, абсцессах, ранах кожи и мягких тканей, остеомиелите, септическом артрите, эндометрите, тубоовариальных абсцессах, воспалительных заболеваниях органов малого таза (в том числе вызываемых хламидиями), перитоните, внутрибрюшном сепсисе, эндокардите абсцессе периодонта периодонтите. В капсулах взрослым по 150-450 мг каждые 6 ч. Детям старше 1 мес по 8-25 мг/кг в сутки в 3-4 приема в равных долях. Детям весом менее 10 кг по 37,5 мг 3 раза в сутки (минимальная доза). Стерильный раствор клиндамицина взрослым при тяжелых инфекциях инфузируется в количестве 2400-2700 мг в сутки в 2-4 приема в равных дозах. Менее сложные инфекции лечат клиндамицином в дозах 1200-1800 мг в 3-4 введения в равных дозах. Разовая доза для в/м введения не более 600 мг. Новорожденным из расчета 15-20 мг/кг в сутки в 3-4 введения, детям старше 1 мес - 20-40 мг/кг/сутки за 3-4 введения. За один час инфузии не следует вводить более 1200 мг препарата. Концентрация препарата в инфузионном растворе не должна быть больше 12 мг/мл, а темп

30 мг/мин. Побочное действие - боль в животе, тошнота, рвота, диарея, эзофагит, гиперчувствительность (макулопапулярная сыпь, анафилактоидные реакции), желтуха, аномальные печеночные функциональные пробы, вагинит, дерматит, лейкопения и эозинофилия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, нарушения сердечно-легочной деятельности, гипотония. При в/м введении - местное раздражение, боль и формирование абсцессов; при в/в - тромбофлебит. Не следует принимать при менингите, с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и почек, беременности, в периоде кормления грудью; не сочетается с эритромицином, блокаторами нервно-мышечной проводимости, барбитуратами, ампициллином, эуфиллином.

ДАМИЛЕНА МАЛЕИНАТ (Damileni maleinas). Синонимы: триптизол Amitriptylini maleas. Антидепрессант с тимоаналептическим и седативным действием. Применяют при депрессивных и тревожно-депрессивных состояниях различной этиологии (маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, сенильные и инволюционные депрессии, невротические депрессивные реакции и другие формы депрессии). Назначают внутрь после еды в строго индивидуальной дозе. Средняя суточная доза 0,15-0,3 г, максимальная 0,45 г. Средняя разовая доза 0,05-0,1 г. В начале лечения обычно 0,05

г 3 раза в день. Курс лечения зависит от течения болезни и может продолжаться 1 год. Возможны сухость во рту, расстройства аккомодации, мелкий тремор пальцев рук, лица, сонливость, головокружение, диспептические расстройства, дизартрия, нарушение сердечного ритма, тахикардия, задержка мочеиспускания, которые уменьшаются при снижении доз. Противопоказан при глаукоме, аденоме предстательной железы, атонии мочевого пузыря. При назначении препарата после лечения больного ингибиторами моноаминоксидазы необходим перерыв не менее 2 нед.

ДАНОВАЛ (Danoval). Антигонадотропный препарат. Синоним: даназол. Подавляет выделение гипофизарных гонадотропных гормонов ЛГ и ФСГ у мужчин и женщин. Применяют при эндометриозе с сопутствующим бесплодием, доброкачественных новообразованиях молочной железы (например, фиброкистозном мастите); первичной меноррагии, предменструальном синдроме, первичном преждевременном половом созревании, гинекомастии и других аналогичных эндокринных нарушениях, а также наследственном ангионевротическом отеке. Обычно для *взрослых* дозировка от 200 до 800 мг в день, разделенная на 2-4 приема. При эндометриозе начальная дозировка 400 мг в день. Затем по мере необходимости, дозу увеличивать или уменьшать; курс 6 мес.

При заболеваниях молочной железы доброкачественного характера по 300 мг в течение 3-6 мес. При первичной меноррагии и предменструальном синдроме эффективна дозировка 100-400 мг в день. При гинекомастии у мужчин ежедневная доза от 200 до 600 мг. При наследственном ангионевротическом отеке начальная дозировка - 600 мг в день с последующим снижением до 200 мг. *Для детей* единственное показание при назначении препарата - преждевременное половое созревание, причем ежедневная дозировка зависит от возраста и состояния больного и колеблется в пределах от 100 до 400 мг. Даноval нельзя принимать во время беременности, кормления грудью, при порфирии. В процессе лечения важны периодический контроль активности ферментов печени, внимательное наблюдение за больными, страдающими тяжелыми формами сердечной и почечной недостаточности, сахарным диабетом. Следует соблюдать осторожность, имея дело с больными, которые принимают противосудорожные препараты и антикоагулянты, ибо даноval усиливает их действие. Могут появиться угри, сальные волосы, сальная кожа, возможны задержка жидкости, незначительный гирсутизм, приливы крови к лицу и приступы обильного потоотделения, уменьшение размера молочных желез, огрубление тембра голоса,

тошнота, головокружение, эмоциональная лабильность, спазмы скелетных мышц, головная боль, сыпь, выпадение волос.

ДАТИСКАН Смесь флавоноидов. Получают из травы датиски коноплевой. Спазмолитик, применяемый при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся спазмом гладкой мускулатуры. Внутрь за 15 мин до еды по 0,05-0,1 г 2-3 раза в день ежедневно в течение 10-20 дней. Возможны аллергические реакции, головная боль, тошнота, боль в животе, понос.

ДЕВЯСИЛА КОРНЕВИЩЕ И КОРЕНЬ (Rhizoma et radix Inulae). Содержит сесквитерпеновые лактоны, инулин, смолы. Применяют в качестве отхаркивающего и дезинфицирующего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей в виде отвара (10,0:100,0) по 1 ст. л. 3 раза в день.

ДЕГМИН (Degminum). Антисептик, оказывающий бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии.

ДЕГМИЦИД (Degmicidum). Жидкость, содержащая 30% дегмина. Антисептик. Применяют для обработки рук хирурга и операционного поля в разведении 1:30 (на сырой питьевой воде) по той же методике, что и дегмин.

ДЕЗАМИНООКСИТОЦИН (Desaminooxytocinum). Синонимы: сандопарт, дезокситоцин. Оказывает возбуждающее действие на гладкую мускулатуру матки, сокращает миоэпителиальные клетки молочной железы. Применяют в акушерстве и гинекологии для возбуждения и усиления родовой деятельности при ее первичной и вторичной слабости, для ускорения инволюции матки в послеродовом периоде и для стимуляции лактации. Таблетку закладывают за щеку попеременно с левой и правой стороны и держат во рту (не разжевывая и не проглатывая) до полного рассасывания. Рекомендуется применять таблетки повторно с промежутками 30 мин. Максимальная суммарная доза 500 ЕД (10 табл.), в редких случаях 900 ЕД и больше. При отсутствии эффекта применение препарата повторяют через 24 ч. Для стимуляции лактации со 2-го по 6-й день послеродового периода по 25-50 ЕД (1/2-1 табл.) за 5 мин до кормления ребенка 2-4 раза в сутки. Противопоказания: несоответствие размеров таза и плода, угрожающие разрывы матки, аномалия положения плода, слишком сильные схватки, после операции кесарева сечения и других операций на матке.

ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА АЦЕТАТ (Desoxycorticosteroni acetas). Синонимы: DOKCA, Decorton, Percorten. Минералокортикостероид. Применяют

при болезни Аддисона и временном понижении функции коры надпочечников (гипокортицизм); миастении, астении, адинамии, общей мышечной слабости, гипохлоремии и др. В/м от 0,005 г 3 раза в неделю до 0,01 г ежедневно, при острой недостаточности коры надпочечников 4 раза в сутки. Высшие дозы в/м для взрослых: разовая 0,01 г, суточная 0,025 г. Сублингвально по 2,5-5 мг ежедневно или через день. При передозировке отеки, повышение АД. Противопоказан при гипертонической болезни, сердечной недостаточности с отеками, атеросклерозе, стенокардии, нефрите, циррозе печени.

ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА ТРИМЕТИЛАЦЕТАТ (Desoxycorticosteroni trimethylacetas). Синоним: Percorten-M. Обладает минералокортикоидной активностью, задерживает в организме натрий и воду, усиливает выделения калия, повышает АД и благоприятно влияет на мышечный тонус. Применяют при болезни Аддисона, относительной недостаточности коры надпочечников, диэнцефально-гипофизарной недостаточности (синдром Шихена, болезнь Симмондса), гипотоническом синдроме, астеническом состоянии с гипотонией после инфекционных болезней или операций. В/м 2,5% водную суспензию по 1 мл 1 раз в 2 нед (под контролем АД и содержания калия и хлоридов в крови).

Противопоказан при гипертонии, сердечной недостаточности с застойными явлениями, заболеваниях почек с недостаточностью функции, циррозе печени.

ДЕЗОКСИПЕГАНИНА ГИДРОХЛОРИД (Desoxypeganini hydrochloridum). Ингибитор холинэстеразы. Применяют при поражениях ЦНС (мононевриты, невриты, полиневриты) различной этиологии, заболеваниях с поражением передних рогов спинного мозга, последствиях нарушения мозгового кровообращения (гемиплегии, гемипарезы), миастении и миопатоподобных синдромах различного генеза. Вводят под кожу 1% водный раствор. Разовая доза для взрослых 0,01-0,02 г (1-2 мл 1% раствора). Суточная 0,05-0,1 г. Курс 4-6 нед. Возможны брадикардия, слюнотечение, умеренная боль в конечностях, в первые минуты введения - ощущение жара и головокружение. Противопоказан при бронхиальной астме, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, стенокардии, эпилепсии, гиперкинезах, высоком АД.

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗА (Desoxyribonucleasa). Фермент, содержащийся в поджелудочной железе и слизистой оболочке кишечника. Синоним: Dornavac. Задерживает развитие вирусов. Применяют при герпетических кератитах

...и кератоувеитах, аденовирусных конъ...юнктивитах и кератитах, острых катарах ...верхних дыхательных путей аденовирус...ной природы, необходимости уменьше...ния вязкости и улучшения эвакуации мокроты и гноя при бронхоэктатической болезни, абсцессах легких, ателектазах, пневмонии; в пред- и послеоперационном периоде больным с гнойными заболеваниями и туберкулезом легких назначают препарат в виде 0,2% раствора (2 мг в 1 мл) на изотоническом растворе хлорида натрия. При заболеваниях глаз вводят под конъюнктиву ежедневно по 0,5 мл в течение 2-4 нед или закапывают в глаз по 2-3 капли 0,2% раствора 3-4 раза в день или по 1-2 капли 0,05% раствора через 1 1/2-2 ч в течение дня. При острых катарах верхних дыхательных путей раствор закапывают в нос или применяют в виде аэрозоля; ингаляции по 10-15 мин назначают 2-3 раза в течение 2-5 дней (на ингаляцию применяют 3 мл 0,2% раствора). При заболеваниях легких вводят 3 мл раствора в дыхательные пути в виде аэрозоля (1 мл в течение 10-15 мин) 3 раза в день в течение 7-8 дней. Возможны аллергические реакции.

"ДЕКАМЕВИТ" ["Decamevitum"]. Комбинированный препарат, содержащий (из расчета на 1 табл.) ретинола ацетата 0,002 г (6600 МЕ), токоферола ацетата 0,01 г, тиамина бромида 0,00258

г, рибофлавина 0,01 г, пиридоксина 0,02 г, фолиевой кислоты 0,002 г, рутина 0,02 г, метионина 0,2 г, цианокобаламина 0,0001 г, аскорбиновой кислоты 0,2 г, никотинамида 0,05 г. Применяют как лечебное средство при гиповитаминозах и авитаминозах, для улучшения обмена веществ в пожилом и старческом возрасте, при умственном и физическом истощении, при нарушении сна и аппетита, при умеренно выраженном атеросклерозе и гипертонической болезни, а также в период выздоровления после тяжелых заболеваний и при лечении антибиотиками и химиотерапевтическими средствами. По 1 табл. декамевита 1-2 раза в день после еды. Курс 20 дней; через 2-3 мес может быть повторен.

ДЕКАМИН (Decaminum). Синонимы: Decadin, Gargilon. Обладает антибактериальной и противогрибковой активностью, применяют при молочнице рта, кандидозах кожи, ногтевых валиков и ногтей, эпидермофитии стоп; воспалительных процессах в полости рта и глотке. Местно. При грибковых заболеваниях кожи 0,5-1% мазь; при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки и молочнице рта 1-2 карамели держат во рту (под языком или за щекой) до полного рассасывания, применяют через 3-5 ч; при тяжелых инфекциях через 2 ч.

ДЕКАРИС (Decaris). Синонимы: Ascaridil, Ketrax. Высокоэффективное противогельминтное средство широкого спектра действия. Применяют при аскаридозе, анкилостомозе, некаторозе, стронгилоидозе, трихостронгилезе, трихоцефалезе, энтеробиозе. Внутрь однократно после ужина перед сном взрослым по 0,15 г. Детям дозы устанавливают из расчета 2,5 мг/кг массы тела. В отдельных случаях возможны боль в животе, тошнота, рвота, понос. Необходима осторожность при назначении беременным. Не применим для изгнания ленточных глистов и сосальщиков.

ДЕКСАМЕТАЗОН (Dexamethazonum). Синонимы: гаммакортен, дексазон. Обладает противовоспалительным и антиаллергическим свойством. Применяют при Аддисоновой болезни, остром и подостром тиреодите, гипотериозе, прогрессирующей офтальмопатии, связанной с тиреотоксикозом; некоторых гематобластозах (лейкоз, лимфосаркома и др.), аллергических заболеваниях (бронхиальная астма, сывороточная болезнь, дерматиты и др.), ревматизме, инфекционно-аллергическом полиартрите, заболеваниях соединительной ткани, аутоиммунных гемолитических анемиях, тромбоцитопениях, аплазии и гипоплазии кроветворения, агранулоцитозе. Внутрь во время еды и после еды по 0,0005-0,001 г в день

(в 2-3 приема). Суточная доза 0,002-0,003 г, в тяжелых случаях до 0,004-0,006 г. В тяжелых случаях недостаточности надпочечников, шоковом и бессознательном состоянии вводят в/м или в/в дексаметазон фосфат в виде натриевой соли в ампулах по 1 мл, содержащих 0,004 г препарата. Возможны повышение АД, тахикардия, усиление белкового обмена с отрицательным азотистым балансом, возбуждение, бессонница и другие нарушения со стороны ЦНС. Противопоказан при тяжелых формах гипертонической болезни и болезни Иценко - Кушинга, беременности, остром эндокардите, психозах, нефрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, сифилисе, активной форме туберкулеза, сахарном диабете.

ДЕКСАМЕТАЗОН-ОФТАН (Dexamethazon-oftan). Состав: дексаметазон-21-фосфат натрия 0,001 г, поливиниловый спирт 0,014 г, бензалкония хлорид 0,0002 г, натрия цитрат, натрия пиросульфид в необходимых количествах как стабилизатор, вода стерильная до 1 мл. Обладает выраженным противовоспалительным и антиаллергическим эффектом. Применяют при аллергических конъюнктивитах, кератоконъюнктивитах, кератитах, иритах, иридоциклитах, травмах, а также в восстановительный период после операции на роговице. В виде глазных капель по 1-2 капли через 1-2 ч, затем 4-6

раз в сутки. Длительное применение может вызвать повышение внутриглазного давления, а при истончении роговой оболочки возможно ее прободение. В очень редких случаях может наблюдаться распространение Herpes simplex. Противопоказан при гнойных поражениях глаз.

ДЕКСОНА (Dexona). Комбинированный препарат, содержащий в 1 мл 0,1% дексаметазона фосфата натрия, 0,5% неомицина сульфата и 0,02% бензалкониума хлорида. Оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие. Применяют при блефарите, конъюнктивитах, легком и остром ирите, иридоциклите, инфекционных заболеваниях глаз, поверхностном глубоком кератите, отите, опоясывающем лишае. Закапывать одну или две капли раствора в глаза или уши каждый час в течение дня и каждые два часа в течение ночи. Противопоказан при туберкулезном поражении глаз, остром лишае симплексе, вирусных инфекциях роговой и слизистой оболочек глаз, ветряной оспе, острых гнойных инфекциях слизистой оболочки и век глаз, вызванных стойкими к неомицину микроорганизмами, грибковых инфекциях глаз и ушей, перфорации барабанной перепонки.

ДЕЛАГИЛ (Delagil). Синонимы: Chingamin, Chlorochin, Resochin. Активен в отношении бесполых эритроцитарных

форм всех видов плазмодиев малярии; оказывает угнетающее влияние на синтез нуклеиновых кислот, на активность некоторых ферментов и иммунные процессы. Применяют при различных формах малярии, коллагенозах, инфекционном неспецифическом полиартрите, болезни Бехтерева и др. Внутрь по 0,25 г 1-2 раза в день, в/м и в/в по 10-20 мл 5% раствора. Возможны тошнота, рвота, головокружение, шум в ушах, нарушение аккомодации, понижение остроты зрения, боль в животе, умеренная лейкопения. Быстрое внутривенное введение может вызвать коллапс. Противопоказан при нарушении функции печени и почек, выраженных поражениях сердца с нарушением ритма.

ДЕ-НОЛ (De-nol). Высушенный коллоидный раствор субцитрата висмута, включающий 120 мг окиси висмута в 1 табл. Обеспечивает защиту слизистой при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. По 2 табл. в день за полчаса до завтрака и обеда в течение 4-8 нед. Противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек. Продолжительный прием больших доз препарата не рекомендуется, так как известны случаи возвратной энцефалопатии. Не следует одновременно использовать другие препараты висмута или употреблять алкоголь. Не следует за 0,5 часа до приема и 0,5 часа спустя употреблять молоко.

ДЕПЕРЗОЛОН (Depersolon). Противовоспалительное, антиаллергическое и противозудное средство, применяемое при аллергических заболеваниях кожи, экземе, острых и хронических дерматитах наружно в виде 0,25% мази, 1-3 раза в день на пораженные участки кожи.

ДЕПОСТАТ (Depostat). Синоним: Primostat. Пролонгированный гестаген. Показан для консервативной терапии при аденоме предстательной железы и некоторых заболеваниях матки и молочных желез. В/м 0,2 г (1 ампула) 1 раз в неделю; дозу можно удвоить (0,4 г). Назначают мужчинам в течение 2-3 мес. Контролируют функцию мочевого пузыря и почек. У женщин при хроническом течении болезни курс лечения проводят непрерывно в течение длительного времени. Возможны кашель, одышка, нарушение кровообращения. Противопоказан при герпесе у беременных.

"ДЕРМАЗИН", МАЗЬ (Unguentum "Dermazin"). Синоним: Flamazine. Химиотерапевтическое средство для местного применения, содержит сульфадиазин серебра (1%). Дезинфицирует ожоговые раны, предотвращает процесс некротизации в глубину и ускоряет ранозаживление. Мазь наносят на ожоговую поверхность слоем 2-4 мм 2 раза в сутки с последующим наложением стерильной и фик-

сирующей повязки. При необходимости число ежедневных аппликаций может быть увеличено. Не назначают недоношенным и новорожденным детям. Беременным назначают только в тех случаях, когда площадь ожога превышает 20% всей площади тела и жизни больной угрожает реальная опасность. Назначают с осторожностью больным с повышенной чувствительностью к сульфаниламидным препаратам (особенно при сопутствующих заболеваниях печени и почек).

ДЕРМАТОЛ (Dermatolum). Висмута галлат основной. Применяют в качестве вяжущего, антисептического и подсушивающего средства, наружно при воспалительных заболеваниях кожи, слизистых оболочек (язвы, экземы, дерматиты) в виде присыпок, мазей, свечей.

ДЕРМАТОП (Dermatop). Состав: 1 г каждой лекарственной формы содержит 2,5 мг Prednicarbata. Применяют при экземе острой и хронической, атопической экземе (нейродермите, эндогенной экземе), псориазе, ожоге первой степени. Наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1 или 2 раза в день. В отдельных случаях возможны местные реакции раздражения кожи - покраснение, жжение. Противопоказан при специфических заболеваниях кожи - туберкулезе, сифилисе, varicella, реакциях вакцинации,

грибковых и бактериальных инфекциях кожи, периоральных дерматитах.

"ДЕРМОЗОЛОН" ("Dermosolon"). Состав: преднизолона 0,025 г, 5-хлор-7-иод-8-оксихинолина 0,15 г, мазевой основы 5 г. Применяют как противовоспалительное и антимикробное средство при заболеваниях кожи (экземе, дисгидрозе, язвах голени и др.) наружно.

ДЕТИЦЕН (Deticen). Противоопухолевое цитостатическое средство. Флакон - ампула для инъекций содержит: декарбазин - 100 мг, лимонная кислота - 100 мг, маннитол - 1150мг. Синонимы: декарбазин. В монотерапии препарат применяют для лечения злокачественной меланомы циклами по 5-6 дней из расчета от 150 до 250 мг/м² в сутки с интервалами в 21 день между циклами. В комбинированной терапии препарат, как правило, назначают циклами по 4-5 дней из расчета 100 мг/м² сутки с интервалами в 21 день между циклами. Может вызывать гранулоцитопению и тромбоцитопению; нарушения пищеварения (анорексия, тошнота, рвота, запоры), аменорею, азооспермию; астению, головные и мышечные боли, повышение температуры, боли в месте инъекции.

ДИАЗОЛИН (Diazolinum). Противогистаминный препарат, применяемый

при различных аллергических заболеваниях. Внутрь после еды по 0,05-0,2 г 1-2 раза в день; детям по 0,02-0,05 г 1-3 раза в день. Высшая разовая доза 0,3 г, суточная - 0,6 г. Возможно раздражение слизистой оболочки желудка. Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

ДИАКАРБ (Diacarb). Синонимы: Diamox, Fonurit. Активное диуретическое средство, подавляющее активность карбоангидразы. Применяют при отеках сердечного происхождения, нефрозах, циррозах печени, глаукоме (для понижения внутриглазного давления), эпилепсии. Внутрь по 0,125-0,25 г 1-3 раза в день. При длительном применении возможны сонливость, парестезии в конечностях, которые исчезают при уменьшении дозы или отмене препарата. Противопоказан при болезни Аддисона, повышенном выделении из организма ионов натрия и калия, склонности к ацидозу, острых заболеваниях печени и почек.

ДИАНЕ (Diane). Содержит 2 мг ципротеронацетата и 0,05 мг этилэстрадиола. Антиандрогенный гормональный препарат. Применяют при явлениях андрогенизации у женщин (акне, себорея, легкие формы андрогенетической алопеции, гирсутизм), для предупреждения бере-

менности у женщин с явлениями андрогенизации. Во время первого цикла лечения ежедневно принимают по 1 драже с 5-го по 25-й день менструального цикла, считая 1-й день менструации первым днем цикла. Затем после 5-дневного перерыва, во время которого появляется кровотечение, начинают принимать следующую упаковку (21 драже) препарата. Может вызывать чувство давления в груди, боли в желудке, тошноту, головные боли, изменения массы тела и полового влечения, депрессивные состояния, хлоазму, промежуточные кровотечения. Сильные головные боли (мигрени), острые нарушения зрения, первые симптомы тромбофлебита или тромбоэмболических явлений, запланированные операции, длительная иммобилизация (в результате травмы и т.д.), появление желтухи, сильное увеличение артериального давления, беременность являются основанием для немедленной отмены препарата. Противопоказан при беременности, кормлении грудью, поражениях печени, идиопатической желтухе или тяжелом кожном зуде при беременности в анамнезе, синдромах Дубина-Джонсона и Ратара, раке грудной железы или эндометрии (даже после лечения), нарушениях жирового обмена, пузырчатом дерматозе при беременности в анамнезе, отосклерозе с ухудшением в ходе пре[illegible]

вавших беременностей. Барбитураты, рифампицин, противоэпилептические средства снижают эффективность диане. При применении препарата меняется потребность в противодиабетических средствах.

"ДИАФЕИН" ("Diapheinum"). Состав: анальгина 0,25 г, амидопирина 0,25 г, кофеина-бензоата натрия 0,05 г, фенобарбитала 0,02 г. Применяют как обезболивающее средство по 1 табл. 2-3 раза в день.

ДИАФЕНИЛСУЛЬФОН (Diaphenylsulfonum). Синонимы: Avlosulfon, Dapsone. Оказывает антибактериальное действие. Активен в отношении различных бактерий, особенно микобактерий туберкулеза и лепры. Применяют при лепре, герпетиформном дерматите Дюринга. Внутрь по 0,05-0,1 г 2 раза в день. Лечение длительное, по специальной схеме. Могут наблюдаться общая слабость, понижение аппетита, диспептические явления, головокружение, головная боль, сердцебиение, боль в области сердца. В отдельных случаях цианоз, токсический гепатит, гипохромная анемия. Противопоказан при стойких тяжелых нарушениях функции печени и почек, заболеваниях органов кроветворения, декомпенсации сердечно-сосудистой системы, острых заболеваниях желудочно-ки-

шечного тракта, органических заболеваниях нервной системы. Не принимать в сочетании с амидопирином и барбитуратами.

ДИБАЗОЛ (Dibazolum). Синонимы: Bendazoli Hydrochloridum. Сосудорасширяющее, спазмолитическое и гипотензивное средство. Применяют при заболеваниях, сопровождающихся спазмами кровеносных сосудов (стенокардия, гипертонический криз), гладкой мускулатуры внутренних органов (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмы желудочно-кишечного тракта); остаточных явлениях полиомиелита и др. Внутрь в качестве монопрепарата и в комплексе с папаверином, теобромином, фенобарбиталом по 0,02 г 2-3 раза в день; подкожно 1-5 мл 1% раствора. В качестве гипотензивного средства с осторожностью следует назначать лицам пожилого возраста.

ДИБУНОЛ (Dibunolum). Синонимы: ионол, бутилокситолуол. Применяют при раке и папилломатозе мочевого пузыря в предоперационный период в комбинации с лучевой терапией опухолей мочевого пузыря, поздних лучевых повреждениях мочевого пузыря, циститах, ожогах любой этиологии, незаживающих трофических и лучевых язвах, плохо рубцующихся послеоперационных и травматических

язвах. При заболеваниях мочевого пузыря в виде внутрипузырных инстилляций (10% линимент), и наружно (5% линимент) при ожогах, ранах, язвах. Для внутрипузырного введения 10 г 10% линимента дибунола разводят 25-30 мл 0,25-1% раствора новокаина, раствор шприцем по катетеру вводят в предварительно опорожненный мочевой пузырь. Больной должен удержать дибунол в мочевом пузыре в течение 2-3 ч. Инстилляции проводят ежедневно в течение 10-15 дней, для противоопухолевого эффекта - не менее 25 дней. При ожогах 5% линимент наносят тонким слоем на рану или повязку ежедневно или через день. Курс 7-10 дней. При трофических и лучевых язвах курс 20-30 сут. В связи с многократной катетеризацией возможны уретриты, простатиты, орхиэпидидимиты; при наружном применении - аллергические реакции, влажные некрозы. Противопоказан при раке мочевого пузыря при значительном прорастании опухоли в перивезикальную клетчатку и наличии метастазов (стадия Т4), массивной гематурии, азотемии, остром пиелонефрите, пузырно-мочеточниковом рефлюксе. Необходима осторожность при расположении опухоли в шейке мочевого пузыря.

ДИВАСКАН (Divascan). Одна таблетка содержит 0,0025 г ипреназона. Применяют с профилактической целью

при следующих формах мигрени: мигрень офтальмическая (классическая), мигрень с сопутствующим симптомом тошноты и других вегетативных расстройств, мигрень с ведущим симптомом головокружения. Средняя доза для взрослых 1-2 табл. 3 раза в день. Противопоказан беременным.

ДИГАЛЕН-НЕО (Digalen Neo). Новогаленовый препарат, получаемый из листьев наперстянки ржавой (Digitalis ferruginea L.). Кардиотоническое средство: усиливает систолу, увеличивает диастолу, урежает ритм сердечных сокращений. Применяют при хронической недостаточности кровообращения I-III стадии, тахиаритмической форме мерцания предсердий. Внутрь преимущественно при легких формах сердечной недостаточности по 10-15 капель 2-3 раза в день. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,65 мл (20 капель), суточная 1,95 мл (60 капель). Следует учитывать индивидуальную повышенную чувствительность и опасность кумулятивного эффекта. Противопоказан при выраженной брадикардии, полной атриовентрикулярной блокаде, учащении приступов стенокардии.

ДИГИДРОТАХИСТЕРОЛ (Dihydrotachisterolum). Синонимы: тахистин, антитанил. Регулирует обмен кальция и фосфора, увеличивает абсорбцию каль-

ция в кишечнике и экскрецию фосфора с мочой. Применяют при гипопаратиреозе (послеоперационном и идиопатическом) и других заболеваниях, сопровождающихся нарушением фосфорно-кальциевого обмена, в том числе гипокальциемических судорогах, тетании, спазмофилии, аллергических кожных реакциях и др. Внутрь после еды по 20 капель 3 раза в день ежедневно, в тяжелых случаях по 3 раза в день. Суточная доза 60-90 капель (в зависимости от состояния больного и содержания кальция и фосфора в крови). Возможна тошнота. Противопоказан при повышенном содержании кальция в крови.

ДИГИДРОЭРГОТАМИН (Dihydroergotamin). Синонимы: Diergotan, Dihydroergotamini Mesylas. Антиадренергическое средство; понижает сосудистый тонус. Применяют при мигрени, коронароспазме, болезни Рейно. Внутрь по 10-20 капель в 1/2 стакана воды 1-3 раза в день. При повышенной чувствительности возможны диспептические явления. Противопоказан при выраженном атеросклерозе, гипотонии, органических поражениях сердца, инфаркте миокарда, нарушениях функции почек, в старческом возрасте.

ДИГИДРОЭРГОТОКСИН (Dihydroergotoxin). Понижает АД и расширяет кровеносные сосуды. Применяют при ги-

гипертонической болезни, эндартериите, болезни Рейно, мигрени, спазмах сосудов сетчатки. Внутрь по 5 капель 2-3 раза в день. При необходимости 20-40 капель 3 раза в день. Побочное действие и противопоказания те же, что и для дигидроэрготамина.

ДИГИТОКСИН (Digitoxin). Гликозид, получаемый из различных видов наперстянки (Digitalis purpurea L., Digitalis Lanata Ehrh. и др.). Оказывает сильное кардиотоническое действие, увеличивает силу сокращения мышцы сердца, уменьшает частоту сердечных сокращений; обладает выраженными кумулятивными свойствами, быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта. Применяют при хронической сердечной недостаточности с нарушением кровообращения II и III стадии. Внутрь по 0,1 мг и *per rectum* (суппозитории) 0,15 мг 1-2 раза в день. Высшая разовая доза по 0,5 мг, суточная 1 мг. Побочные действия и противопоказания те же, что и для других препаратов наперстянки.

ДИГОКСИН (Digoxinum). Сердечный гликозид, содержащийся в листьях наперстянки шерстистой (Digitalis Lanata Ehrh.). Оказывает выраженное действие на систолу и диастолу, замедляет сердечный ритм, обладает диуретическим свойством, быстро выводится из организма.

меньше кумулирует, чем дигитоксин. Применяют при недостаточности кровообращения I-III стадии; для подготовки к операции и родам больных с заболеванием сердца. Внутрь в таблетках в 1-й день в суточной дозе 1-1,25 мг (4-5 табл.), во 2-й день в той же дозе или ее уменьшают до 0,75 мг (3 табл.), на 3-й день 0,75 мг/сут. В/в медленно по 0,25-0,5 мг в 10-20 мл 5%, 20%, 40% раствора глюкозы или изотонического раствора хлорида натрия. Возможны тошнота, рвота, потеря аппетита, тахикардия, бигеминия. Противопоказан при выраженной брадикардии, полной атриовентрикулярной блокаде, учащении приступов стенокардии, свежем инфаркте миокарда.

ДИДЕПИЛ (Didepil). Таблетки (для взрослых/для детей) содержат проциклидина гидрохлорид (0,01/0,006 г), фенобарбитал (0,025/0,02 г). Применяют при конвульсивных состояниях, прежде всего при эпилепсии (слабые и сильные приступы). Детям до 3 лет от 1/2 до 2 табл. дидепила в день, средняя доза 1-1 1/2 табл. в день; от 3 до 8 лет 2-4 табл. в день, средняя доза 2 табл. в день; от 8 до 14 лет 3-6 табл. в день, средняя доза 4 табл. в день. Взрослым 2-6 табл. в день, средняя доза 3-4 табл. в день.

ДИКСАФЕН (Dixafen). Комбинированный препарат, состоящий из диметп-

рамида, кофеина и эфедрина. Оказывает противорвотное действие, ослабляет астенические явления в период первичной реакции на облучение, стимулирует сердечную деятельность и периферическую гемодинамику. Применяют для купирования симптомов первичной реакции на облучение (тошноты, рвоты, общей слабости, повышенной утомляемости). Вводят в/м (действие наступает через 10-15 мин, сохраняется 4-5 ч) сразу после облучения однократно в дозе 1 мл.

ДИМЕБОН (Dimebonum). Антигистаминный препарат, применяемый у взрослых при острых аллергических заболеваниях, поллинозах, крапивнице, сенной лихорадке, пищевой, косметической и лекарственной аллергии, отеке Квинке и других аллергических реакциях. Назначают внутрь независимо от приема пищи по 0,01-0,02 г 2-3 раза в день ежедневно в течение 5-12 дней. Возможны ощущение "онемения" слизистых оболочек рта, седативный эффект. Не следует принимать во время работы водителям транспорта и лицам, профессия которых требует быстрой двигательной и психической реакции.

ДИМЕДРОЛ (Dimedrolum). Синонимы: Allergan B, Benadryl. Оказывает противогистаминное, холинолитическое и седативное действие. Применяют при ал-

лергических заболеваниях (крапивница, сенная лихорадка, аллергический конъюнктивит, отек Квинке и др.), паркинсонизме, хорее, синдроме Меньера, в качестве успокаивающего и снотворного средства. Внутрь, в/м, в/в, местно (накожно, в виде глазных капель; на слизистую оболочку носа), ректально. Под кожу не вводят из-за раздражающего действия. Внутрь по 0,025-0,05 г 1-3 раза в день, в/м по 1-5 мл 1% раствора; в виде глазных капель (0,2-0,5% раствор). Высшая разовая доза внутрь 0,1 г, суточная 0,25 г, в/м - 0,05 г и 0,15 г соответственно. Возможны головокружение, головная боль, сухость во рту, тошнота, сонливость, общая слабость. Не рекомендуется назначать препарат во время работы водителям транспорта и лицам, профессия которых требует быстрой реакции.

ДИМЕКОЛИН (Dimecolinum). Активный ганглиоблокатор. Применяют при гипертонической болезни (II-III стадии), гипертонических кризах, спазмах периферических сосудов и гладкой мускулатуры органов брюшной полости, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, для стимулирования родовой деятельности (особенно при нефропатии гипертонии); для достижения искусственной гипотонии. Внутрь по 0,025-0,05 г 2-4 раза в день, подкожно и в/м по 0,5-1мл 1% раствора 2-3 раза в

[illegible] общая слабость, головокружение, сердцебиение, при больших дозах ортостатический коллапс; выраженный мидриаз, сухость во рту; атония мочевого пузыря, ведущая к нарушениям мочеиспускания. Противопоказан при гипотонии, тяжелых паренхиматозных поражениях печени, почек и ЦНС, тромбофлебите.

ДИМЕФОСФОН (Dimephosphonum). Нормализует кислотно-основное состояние при ацидозах различной этиологии, усиливает реабсорбцию бикарбонатов, процессы ацидо- и аммониогенеза в почках, вентиляцию легких. Применяют как антиацидотическое средство у детей старше 8 лет при пневмонии, острых респираторных и других инфекционных заболеваниях, хронических неспецифических заболеваниях легких, сахарным диабете, рахитоподобных заболеваниях и др. Внутрь из расчета 1 мл на 5 кг массы тела 3-4 раза в день. Курс от 3 дней до 4 нед. Возможны диспептические явления. Противопоказан при склонности к аллергическим реакциям.

ДИМЭСТРОЛ (Dimoestrolum). Синоним: Dimethyl-Oestrogen. Эстрогенный гормон продолжительного действия. Применяют при недостаточности функции яичников. В/м в виде 0,6% масляного раствора по 2 мл 1 раз в неделю. Курс

2-3 инъекции. При длительном применении возможны маточные кровотечения. Противопоказан при злокачественных и доброкачественных новообразованиях половых органов, молочных желез и других органов (у женщин в возрасте до 60 лет), мастопатии, эндометрите, склонности к маточным кровотечениям, в гиперэстрогенной фазе климакса.

ДИНЕЗИН (Dinesinum). Синонимы: Antipar, Deparkin. Оказывает центральное антихолинергическое действие. Применяют при экстрапирамидных нарушениях, в том числе паркинсонизме, гиперкинезах; в качестве корректора при нейролептической терапии. Внутрь по 0,1 г/сут. Постепенно дозу увеличивают до 0,3-0,5 г, а в отдельных случаях до 0,6-0,7 г/сут. Возможны сонливость, слабость, головокружение, иногда кожные высыпания. Противопоказан при нарушениях функции печени, почек и мозгового кровообращения.

ДИОКСИДИН (Dioxydinum). Антимикробный препарат широкого спектра действия, применяемый при тяжелых гнойно-воспалительных процессах: плевритах, эмпиеме плевры, абсцессе легкого, перитонитах, циститах, ранах с наличием глубоких гнойных полостей. Перед началом курса лечения провести пробу на переносимость. Ежедневно вводят в поло-

сти по 10-50 мл 1% раствора (100-500 мг). Максимальная суточная доза 70 мл 1% раствора (700 мг). Курс 3 нед. Повторные курсы через 1-1 1/2 мес. Мазь применяют при лечении гнойных и трофических ран, ожогов, гнойничковых заболеваниях кожи. Возможны головная боль, озноб, повышение температуры, диспептические реакции, судорожные подергивания мышц. Не назначать при индивидуальной непереносимости.

ДИПИДОЛОР (Dipidolor). Синоним: Piritramid. Сильное анальгетическое средство. Применяют при болевых синдромах различной этиологии. В/м по 10-15 мг через 2-3 ч. При передозировке угнетение дыхания. Противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности к препарату.

ДИПИН (Dipinum). Подавляет пролиферативную активность тканей, в том числе опухолевых. Оказывает избирательное угнетающее действие на лимфопоэз. Применяют при хроническом лимфолейкозе, протекающем с опухолевидными разрастаниями (при числе лейкоцитов более $7{,}5 \cdot 10^9$/л), метастазах гипернефромы. В/в или в/м. При хроническом лимфолейкозе начинают с введения 0,005 г дипина (1 мл 0,5% раствора) ежедневно или 0,01 г (2 мл 0,5% раствора) через день. Интервал между инъек-

циями удлиняют [illegible] зависимо-
сти от степени [illegible] лейко[illegible]-
тов и тромбоцитов. [illegible] курс до
0,2 г. При метаст[illegible] на-
чинают с 0,03 г (3 [illegible] ра) через
3 дня или 0,04 г (4 [illegible] ра) через
4 дня. Дозу постепенно [illegible] нижают до 20-
10-5 мг. На курс 0,2-0,24 [illegible]. При необхо-
димости курс повторяют. Возможны лей-
копения и тромбоцитопения, в отдельных
случаях понижение аппетита и тошнота.
Противопоказан при тяжелых заболева-
ниях печени и почек.

ДИПРАЗИН (Diprazinum). *Синонимы:* пипольфен, Allergan, Phenergan. *Обладает* выраженной противогистаминной активностью (активнее аминазина и димедрола). Оказывает седативное действие. Применяют при аллергических заболеваниях, ревматизме с выраженным аллергическим компонентом, аллергических осложнениях, вызванных лекарственными средствами, зудящих дерматозах, болезни Меньера и др. Внутрь по 0,025 г 2-3 раза в день, в/м 1-2 мл 2,5% раствора, в/в (в составе литических смесей) до 2 мл 2,5% раствора. Детям назначают в меньших дозах в соответствии с возрастом. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,075 г, суточная 0,5 г; в/м: разовая 0,05 г, суточная 0,25 г. Возможны сухость во рту, тошнота. При в/м введении болезненные инфильтраты, при

в/в - резкое понижение АД. Противопоказан при состояниях алкогольного опьянения; не следует назначать во время работы водителям транспорта.

ДИПРОМОНИЙ (Dipromonium). Оказывает липотропное действие, улучшает антитоксическую функцию печени, стимулирует окислительные процессы, обладает слабой гипотензивной и ганглиоблокирующей активностью. Применяют при хроническом гепатите и жировой дистрофии печени, облитерирующем эндартериите, атеросклерозе сосудов мозга, хронических заболеваниях легких, побочных реакциях, связанных с применением противотуберкулезных препаратов. Внутрь в виде таблеток по 0,02 г 3-5 раз в день после еды. Суточная доза 0,06-0,1 г. Курс 20-45 дней. В/м - содержимое ампулы (0,05 г лиофилизированного препарата) растворяют в 2 мл воды для инъекций. Вводят ежедневно по 0,05 г 1 раз в день в течение 10-20 дней. Курс можно повторить через месяц. При хронических гепатитах и жировой дистрофии печени вводят по 0,05-0,1 г в день в течение 15-20 дней; при побочных реакциях на туберкулезные препараты - по 0,05 г в течение месяца. При применении внутрь возможны тошнота, рвота.

ДИПРОФЕН (Diprophenum). Оказывает сосудорасширяющее и слабое холи-

нолитическое действие. Применяют при спазмах кровеносных (особенно периферических) сосудов (эндартериит, болезни Рейно и др.), гладкой мускулатуры внутренних органов (бронхов, желудочно-кишечного тракта, почевыводящих путей). Внутрь по 0,025 г 3 раза в день с постепенным увеличением дозы до 0,05-0,1 г 3 раза в день. Курс 2-3 нед. Возможны чувство онемения слизистой оболочки полости рта, изредка тошнота, головная боль, легкое головокружение.

ДИПРОФИЛЛИН (Diprophyllinum). Оказывает коронарорасширяющее и бронхорасширяющее действие, несколько увеличивает диурез. Применяют при коронароспазме, бронхоспазме, симптоматической гипертонии, гипертонической болезни. Внутрь по 0,2 г 3-4 раза в день; в/м по 3-5 мл 10% раствора 1-2 раза в день. Возможны диспептические явления.

ДИТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ ГЛАЗНАЯ МАЗЬ (Unguentum Ditetracyclini ophtalmicum). Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий, возбудителей орнитоза, трахомы и некоторых простейших. Применяют при трахоме, эпидемических конъюнктивитах и других инфекционных заболеваниях глаз, вызванных чувствительными к тетрациклину возбудителями. Закладывают за

нижнее или верхнее веко больного 0,2-0,3 г мази через 2-3 дня. Курс лечения трахомы 2-5 мес. Противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности к препарату.

ДИТРАЗИНА ЦИТРАТ (Ditrazini citras). Синонимы: Loksuran (B), Banocid. Противоглистное средство при филяриозах. Назначают внутрь из расчета 2 мг/кг 3 раза в сутки в течение 10 дней. Суточная доза не выше 0,4 г. Проводят 3-5 курсов с интервалами 10-12 дней. Возможны кожный зуд, появление или усиление кожных высыпаний, сухой кашель, эозинофилия, эозинофильные инфильтраты, лимфаденопатии, увеличение размеров печени и селезенки. Противопоказан при онхоцеркозе, сопровождающемся поражением глаз.

ДИТЭК (Ditek). Дозированный аэрозоль. Противоастматическое средство. Эффективно предупреждает спазм мускулатуры бронхов и купирует уже развившиеся спастические состояния бронхиальной системы, предупреждает бронхиальные спазмы. Применяют для лечения и профилактики удушья при бронхиальной астме и других заболеваниях, сопровождающихся обратимым сужением дыхательных путей (хронический обструктивный бронхит и др.). Для профилактики и длительного лечения на-

значают взрослым и детям старше 6 лет по 2 дозы аэрозоля 4 раза в день через равные промежутки времени. При необходимости (начинающийся бронхоспазм) - дополнительно 1-2 дозы аэрозоля; в тяжелых случаях при отсутствии эффекта в течение 5 мин - еще 2 дозы. Следующая ингаляция - не ранее чем через 2 ч. Для профилактики (при предстоящей нагрузке или контакте с аллергеном) ингалируют 2 дозы аэрозоля. Детям 4-6 лет - по 1 дозе аэрозоля 4 раза в день. Не назначать детям до 4 лет. Возможны мелкая дрожь пальцев, беспокойство, сердцебиение, головокружение и головная боль. При передозировке - покраснение лица, тошнота, тахикардия, повышение систолического и снижение диастолического АД, чувство тяжести, экстрасистолия. Противопоказан при тиреотоксикозе, тахиаритмиях, подклапанном стенозе аорты. Применять с осторожностью у больных сахарным диабетом, со свежим инфарктом миокарда, тяжелыми органическими поражениями сердца и сосудов, при беременности и кормлении грудью.

ДИФЕЗИЛ. Обладает антигельминтной активностью в отношении трихоцефалеза. Назначают внутрь натощак за 1 ч до завтрака в 30-50 мл сахарного сиропа или воды взрослым и детям старше 11 лет 5 г, детям младшего возраста 2,5 г. При необходимости лечение повторяют через

2-3 нед. Возможны тошнота, рвота, учащенная дефекация. Противопоказан при заболеваниях печени с выраженным нарушением ее функции.

ДИФЕНИН (Dipheninum). Синоним: [illegible]iphentoin. Оказывает выраженное про[illegible]ивосудорожное действие; снотворного [illegible]ффекта почти не дает. Применяют при [illegible]пилепсии, [illegible] при больших су[illegible]дорожных [illegible] Внутрь после еды [illegible]0,[illegible]-0,3 [illegible] 1-3 ра[illegible] [illegible] Возможны тре[illegible] [illegible], боль в [illegible] [illegible]ожительность, [illegible] повышение [illegible] кишечные рас[illegible]стройства. [illegible] мегалобластиче[illegible]ская анемия, [illegible]ранулоцитоз, стоматиты. [illegible]ротивопоказан при болезнях печени, почек, декомпенсации сердечно-сосуди[illegible]стой системы.

ДИФОРМИН-РЕТАРД (Diformin-retard). Синонимы: Metforminum, Glukofag. Длительно действующее противодиабетическое средство, относящееся к бигуанидам. Угнетает гликонеогенез в печени и повышает периферическую утилизацию глюкозы, в отличие от сульфанилмочевинных препаратов не приводит к повышению секреции инсулина. Создает предпосылки для снижения липогенеза и повышения липолиза, что вследствие угнетения аппетита ведет к

уменьшению массы тела у больных диабетом, страдающих ожирением. Снижает уровень холестерина и триглицеридов в сыворотке крови и повышает фибринолитическую активность крови. Применяют при сахарном диабете, развивающемся в среднем возрасте или позднее. В начале лечения назначают 1 табл. 1 раз в день (утром) во время или сразу после еды. Постепенно осторожно повышают дозу через каждую неделю, после чего назначают поддерживающую дозу (обычно по 1-2 табл. 2 раза в день). Для стабилизации углеводного обмена и снижения потребности в инсулине при лабильном диабете допустима комбинация диформина с инсулином. Возможны металлический привкус во рту, легкие желудочно-кишечные расстройства, значительно реже встречаются аллергические реакции. Длительное лечение может сопровождаться нарушением всасывания витамина B12. Противопоказан при диабетической коме, беременности, тяжелых операциях и травмах. Необходима осторожность при почечной недостаточности, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и печени. Не назначают детям.

ДОКСИУМ (Doxium). Синонимы: добезилат кальция, Dobesifar. Уменьшает повышенную проницаемость и ломкость капилляров, увеличивает пластичность

эритроцитов in vitro. Применяют при диабетической микроангиопатии и ретинопатии, венозной недостаточности, периферических застойных отеках, повышенной проницаемости капилляров и расстройствах микроциркуляции. В терапии при атеросклерозе, циррозе печени, геморрое и др. Назначают внутрь при диабетической микроангиопатии и диабетической ретинопатии по 2-3 табл. в день в течение 4-6 мес (в зависимости от стадии заболевания). Постепенно снижают дозу до 1-2 табл. в день. При поражении венозных сосудов препарат назначают по 1 табл. 3 раза в день в течение 1-3 нед и далее по 1 табл. 2 раза в день. Препарат принимают во время или после приема пищи, запивая большим количеством жидкости. Иногда наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта или аллергические высыпания на коже, которые проходят самостоятельно при уменьшении дозы или отмене препарата.

ДОКСИЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД (*Doxycyclini hydrochloridum*). Полусинтетическое производное окситетрациклина. Синонимы: Vibramycin, Doxacin, Biociclin, Doxylin. Антибиотик широкого спектра антимикробного действия. Активен в отношении большинства грамположительных (стафилококки, пневмококки, стрептоккоки) и грамотрицательных микроорганизмов (менинго- и

...ические, эшерихии [illegible] ...еллы, энтеробактерии [illegible] ...ой, микоплазм, [illegible] пситтакоза, трахомы и [illegible] стейших. Применяют [illegible] старше 8 лет при заболеваниях, [illegible] ных чувствительными к нему микроорга[illegible] низмами: бронхите остром и [illegible] пневмонии, плеврите и инфекциях [illegible] выводящих путей, [illegible] Внутрь после еды. В 1-й день [illegible] дозу для взрослых 0,2 г [illegible] или по 0,1 г каждые 12 ч, в [illegible] дни суточная доза 0,1 г. При тяжелых инфекциях суточная доза в 1-й и в последующие дни 0,2 г. Детям 8-12 лет назначают из расчета 4 мг/(кг•сут) в 1-й день, 2 мг/кг в последующие дни (4 мг/кг при тяжелом течении инфекции). Детям старше 12 лет назначают ту же дозу, что и взрослым. Лечение больных гонореей проводят по схеме. Продолжительность лечения 7-10 дней. Возможны желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, учащение дефекации и др.), дисбактериоз и суперинфекция дрожжеподобными грибами, аллергические реакции. Противопоказан при повышенной чувствительности к тетрациклинам, беременности. Препарат не назначают детям до 8 лет.

ДОПАН (Dopanum). Синоним: Chlorethylaminouracil. Обладает противоопухолевой активностью и угнетает кро-

ветворение (особенно костномозговое). Применяют при лимфогранулематозе II-III стадии и (при удовлетворительном общем состоянии) IV стадии заболевания; сублейкемических формах хронического миелолейкоза, протекающих со спленомегалией; хроническом лимфолейкозе. Внутрь (лучше на ночь) по 0,006-0,012 г один раз в 3-5-7 дней. На курс 5-7 приемов. Детям из расчета 0,2 мг/кг. Наблюдаются угнетение костномозгового кроветворения (лейкопения, тромбоцитопения); иногда через 8-12 ч после приема тошнота и рвота. Противопоказан при лимфогранулематозе при числе лейкоцитов менее $4{,}5 \cdot 10^9$/л и тромбоцитов менее $100 \cdot 10^9$/л, быстротекущих и острых формах этого заболевания; остром лейкозе и хроническом миелолейкозе с резким обострением.

ДОПЕГИТ (Dopegyt). Синоним: Aldomet. Оказывает гипотензивное действие и уменьшает периферическое сопротивление сосудов. Применяют при гипертонической болезни II стадии. Внутрь по 0,25 г 2-3 раза в день, при необходимости суточную дозу увеличивают до 1,5-2 г. Возможны тошнота, рвота, головная боль, покраснение верхней половины туловища, в отдельных случаях лейкопения, субфебрилитет. Противопоказан при острых заболеваниях печени, беременности, феохромоцитоме.

ДУБА КОРА (Cortex [illegible]). [illegible] дубильные веществ[illegible] [illegible] группы, галловую [illegible] [illegible] кислоты, флавоноиды [illegible] флобафен, пектины. [illegible] [illegible] вяжущее и противо[illegible] средства при воспалительных [illegible] ниях слизистой оболочки [illegible] ва, глотки, гортани, [illegible] тах в виде отвара [illegible] полосканий 6-8 раз [illegible] отваров (20,0:200,0) [illegible]

"ДУПЛЕКС" (Dup[illegible]) [illegible] раствор стрихнина нитрата [illegible] трия арсената (1%). Применяют как общеукрепляющее и тонизирующее средство при упадке питания, неврозах, легких формах анемии, псориазе. Вводят под ко[жу] 1 раз в день ежедневно, начиная с 0,2 мл с постепенным повышением дозы до 1 мл. Курс 20-40 дней; при псориазе до 2-3 мес. Высшая разовая доза 1 мл, суточная 2 мл. Детям до 2 лет не назначают, после 2 лет - применяют в меньших дозах. Иногда вызывает тошноту, рвоту, понос, пигментацию кожи. Противопоказан при поражениях почек, невритах, выраженной анемии; диспептических явлениях.

ДУШИЦЫ ТРАВА (Herba Origani vulgaris). Содержит эфирное масло (0,3-1%), в состав которого входят тимол и его изомер карвакрол, дубильные вещества,

аскорбиновая кислота, флавоноиды. Применяют в качестве отхаркивающего (хронический бронхит) и усиливающего перистальтику кишечника (атония кишечника) средства в виде настоя (10,0:200,0-15,0-200,0) внутрь по 1 ст. л. 3 раза в день; наружно для ароматических ванн.

ЖЕЛЕЗА ЛАКТАТ (Ferri lactas). Применяют при гипохромной анемии в капсулах по 1 г 3-4 раза в день.

ЖЕЛУДОЧНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ КРАСАВКИ (Tabulettae stomachicae cum extracto Belladonnae). Состав: экстракта красавки 0,01 г, экстракта полыни 0,012 г, экстракта валерианы 0,015 г. Применяют при заболеваниях желудка, сопровождающихся болью, по 1 табл. 2-3 раза в день.

ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК НАТУРАЛЬНЫЙ (Succus gastricus naturalis). Секрет желудочных желез здоровых собак и других домашних животных, консервированный 0,03-0,04% салициловой кислотой. Применяют при недостаточной функции желудочных желез, ахилии, гипо-, анацидных гастритах, диспепсии. Назначают внутрь во время или после еды 2-3 раза в день по 1-2 ст. л. (детям в зависимости от возраста от 1/2 ч. л. до 1 ст. л.).

ЖЕЛЧЬ МЕДИЦИНСКАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯ (Chole conservata medicata). Препарат, содержащий натуральную желчь убойного скота. Применяют в качестве наружного обезболивающего и рассасывающего средства при острых и хронических артрозах, артритах, бурситах, тендовагинитах, спондилоартрозе, вторичном радикулите в виде компрессов. Курс 6-30 дней. В отдельных случаях возможно раздражение кожи. Противопоказан при нарушении целостности кожи, воспалительные и гнойничковые поражения кожи, лимфангиты, лимфоадениты.

ЖЕНЬШЕНЕВАЯ НАСТОЙКА (Tinctura Ginsengi). Настойка (1:10) на 70% спирте из корней женьшеня настоящего (Panax ginseng) семейства аралиевых (Araliaceae). Содержит эфирное и жирное масла, пектины и другие углеводы, тритерпеновые гликозиды (панаксозиды А и В, панаквилон, панаксин), сапонины и другие вещества. Тонизирующее средство. Применяют при гипотонии, усталости, переутомлении, неврастении. Внутрь (до еды) по 15-25 капель 3 раза в день.

ЖОСТЕРА (КРУШИНЫ СЛАБИТЕЛЬНОЙ) ПЛОД (Fructus Rhamni catharticae). Содержит антрагликозиды (рамнокатартин, рамноксантин, жостерин), флавоноиды (рамноцитрин, ксан-

торамнетин, кемпферол), пектиновые вещества, органические кислоты, сахар. Применяют в качестве слабительного средства при хронических запорах в виде отвара (20,0:200,0) по 1/2 стакана на ночь.

ЗАДИТЕН (Zaditen). Состав: в 1 табл. 1 мг кетотифена. Противоаллергическое средство. Тормозит высвобождение гистамина в организме, препятствуя тем самым возникновению анафилаксии, отеку слизистых оболочек, бронхоспазму и другим проявлениям аллергической реакции. Применяют для профилактики и лечения бронхиальной астмы аллергического происхождения, аллергического ринита. Назначают внутрь взрослым по 1 табл. утром и вечером во время еды. Больным, чувствительным к седативному действию препарата, вначале назначают по 1/2 табл. в день, постепенно повышая дозу до 2 мг в день. При необходимости суточную дозу увеличивают до 4 мг (по 2 табл. 2 раза в день). Детям старше 3 лет назначают по 0,025 мг/кг массы тела 2 раза в день. В начале лечения задитен может давать седативный эффект, иногда сухость во рту, легкое головокружение.

ЗАМАНИХИ НАСТОЙКА (Tinctura Echinopanacis). Настойка (1:5) на 70% спирте из корней и корневищ Echinopanax elatum (эхинопанакс высокий). Применяют как средство, стимули-

рующее ЦНС, при гипотонии, астенических и депрессивных состояних по 30-40 капель до еды 2-3 раза в день.

ЗВЕРОБОЯ ТРАВА (Herba Hyperici). Содержит дубильные вещества типа катехинов, флавоновый гликозид гиперозид, азулен, эфирное масло и другие вещества. Применяют как вяжущее и антисептическое средство при колитах в виде отвара (10,0-200,0) по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды; местно для смазывания десен и полоскания рта в виде настойки (30-40 капель на стакан воды).

ЗЕЛЕНИНА КАПЛИ (Guttae Zelenini). Состав: настойки ландыша 10 мл, настойки валерианы 10 мл, настойки красавки 5 мл, ментола 0,2 г. Применяют при неврозах сердца, сопровождающихся брадикардией, по 20-25 капель 2-3 раза в день.

ЗИТАЗОНИУМ (Zitazonium). Синоним: Tamoxifen, Nolvadex. Обладает антиэстрогенным свойством. Применяют при раке молочных желез у женщин в климактерическом периоде. Назначают по 0,01-0,02 г 2 раза в день при раке молочной железы в постменопаузном периоде; при овуляторной неоплодотворенности по 0,01 г 2 раза в день в течение 4 дней, начиная со 2-го дня менструации, далее дозу можно повысить до 0,02 г, а затем до 0,04 г, назначая препарат по той

же схеме; в случае прекращения отделения молока после родов - по 0,01 г 4 раза в сутки в течение 5 дней; при олигоспермии по 0,01 г дважды в день. Может вызывать отсутствие аппетита, тошноту, позывы к рвоте. При длительном применении иногда возникает тромбофлебит. Противопоказан при беременности.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКА ТРАВА (Herba Centaurii). Содержит горькие гликозиды (генциопикрин, эритроцентаурин), алкалоиды (эритрицин, генцианин), флавоновый гликозид центауреин, аскорбиновую кислоту. Применяют для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения при пониженной функции желудочно-кишечного тракта в виде настоя (10,0:200,0) по 1 ст. л. 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

ИБУПРОФЕН (Ibuprofenum). Синонимы: Brufen, Lamidon. Нестероидный препарат, обладающий противовоспалительным, аналгезирующим и жаропонижающим свойством. Применяют взрослым для лечения ревматоидного артрита, деформирующего остеоартроза, остеохондроза позвоночника, при артралгиях ревматического и неревматического происхождения. Внутрь после еды 0,2 г 3-4 раза в день. Сутояная доза 0,8-1,2 г. Возможны изжога, тошнота, рвота, потливость, кожные аллергические реакции, в

редких случаях - нарушение функции зрения. Противопоказан при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенном колите, амблиопии, нарушении цветового зрения, циррозе печени с портальной гипертензией, повышенной индивидуальной чувствительности к препарату.

ИЗАДРИН (Isadrinum). Синонимы: Aludrin, Isuprel, Novodrin, Euspiran. Адренергическое вещество. Стимулятор β1-, β2-адренорецепторов. Применяют для купирования и предупреждения приступов бронхиальной астмы, при астмоидных и эмфизематозных бронхитах, пневмосклерозе. Внутрь по 1-2 табл. 3-4 раза в день (держать под языком до полного рассасывания); в виде ингаляции по 0,5-1 мл 0,5% или 1% раствора 2-4 раза в день. Парентерально вводят по 0,5-1 мл 0,5% раствора. Возможны тахикардия, аритмия, тошнота и др. Противопоказан при выраженном атеросклерозе и аритмии сердца.

"ИЗАМАН" ("Isamanum"). Состав: изафенина 0,005 г, маннита 0,15 г. Слабительное средство, применяемое при спастических и атонических запорах, неврогенных дискинезиях кишечника. Первые 3 дня ежедневно по 1 табл. 1-2 раза в день, а затем через день и 1-2 раза в неделю, при привычных запорах по 2 табл. однократно.

ИЗАФЕНИН (Isapheninum). Синонимы: Bisatin, Purgophen. Применяют при хронических атонических запорах в качестве слабительного средства по 0,01-0,015 г 1-2 раза в день, детям старшего возраста по 0,005-0,01 г 1-2 раза в день. Высшая разовая доза для взрослых 0,025 г, суточная 0,05 г.

ИЗОБАРИН (Isobarin). Соответствует отечественному препарату октадину. Синонимы: Ismelin, Octadinum. Относится к симпатолитическим веществам. Понижает АД. Применяют при различных стадиях гипертонической болезни, в том числе при тяжелых формах со стойким повышением АД, а также со злокачественным течением. Внутрь (дозы устанавливают индивидуально) от 0,025 г до 0,1 г/сут. Возможны головокружение, слабость, адинамия, диспептические явления, набухание слизистой оболочки носа, боль в околоушной железе, задержка жидкости в организме. В первые недели лечения возможен ортостатический коллапс. Противопоказан при выраженном атеросклерозе и недостаточности функции почек, острых нарушениях мозгового кровообращения, инфаркте миокарда, гипотонии, феохромоцитоме.

ИЗОДИБУТ (Isodibut). Предотвращает накопление сорбитола в хрусталике, нервах, аэроте и предупреждает раз-

витие катаракты, нейро- и ангиопатий, активизирует обменные процессы в головном мозгу. Применяют при сахарном диабете в качестве средства профилактики и лечения диабетических ангиопатий различной локализации, нейропатий, катаракты. Внутрь до еды по 0,5 г 3-4 раза в день. Максимальная суточная доза 4 г. Курс до 3 мес. Повтор курса через 6 мес. При наличии поражений желудочно-кишечного тракта препарат рекомендуется принимать после еды. Возможны аллергические кожные проявления. В этом случае препарат следует отменить. Противопоказан при тяжелых заболеваниях печени и почек с явлениями их недостаточности.

ИЗОНИАЗИД (Isoniazidum). Гидразид изоникотиновой кислоты. Синонимы: Tubazid, Andrazide, INH, Iscotin. Обладает высокой бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза. Применяют при различных формах и локализации туберкулеза. Внутрь, ректально, в/м по 0,3 г 2-3 раза в день; детям по 0,006-0,015 г/(кг.сут) (но не более 0,5 г/сут) в 1-2 приема. Высшая разовая доза внутрь для взрослых 0,6 г, суточная 0,9 г. Полости и свищи промывают 1-2% водным раствором; разовая (и суточная) доза 0,05-0,2 г. Возможны головокружение, головная боль, раздражительность, бессонница, парестезии, полиневриты, тошнота, рвота аллергические

реакции, желтуха, сердцебиение. Противопоказан при эпилепсии, склонности к судорогам, психических заболеваниях, ранее перенесенном полиомиелите, нарушении функции почек и печени, выраженном атеросклерозе.

ИМАП (IMAP). Синонимы: Fluspirilen, Redeptin и др. Нейролептическое средство с выраженным антипсихотическим эффектом. Оказывает пролонгированное действие. Продолжительность действия 1 инъекции - 1 нед. Применяют при заболеваниях, сопровождающихся моторным или психическим беспокойством, параноидными галлюцинациями, олигофрении, шизофрении, эпилептиформных психозах, делирии. В стационаре препарат вводят в/м 1 раз в неделю, начиная с 4-6 мг (2-3 мл), при необходимости повышая дозу до 8-10 мг (4-5 мл). После достижения оптимального эффекта дозу уменьшают до поддерживающей недельной - 2-6 мг (1-3 мл). В амбулаторных условиях назначают 1 раз в неделю по 2-6 мг (1-3 мл). При продолжительном лечении через каждые 3-4 нед делать недельный перерыв. Могут развиваться экстрапирамидные расстройства (для их предупреждения в день введения ИМАП и в следующие 2 дня назначают антипаркинсонические средства). При длительном применении возможны похудание, общая слабость, ухудшение

сна, депрессия. В 1-й день после инъекции возможны тошнота и ощущение усталости. Противопоказан при экстрапирамидных нарушениях, депрессиях, двигательных расстройствах. Не следует назначать в первые 3 мес беременности.

ИМИФОС (Imiphosum). Синоним: Marcophan. Цитостатический препарат. По фармакологической активности и противоопухолевому действию сходен с тиофосфамидом, но менее токсичен и обладает меньшими кумулятивными свойствами. Применяют при эритремии (истинная полицитемия) II стадии, резистентности к радиоактивному фосфору 32P. В/м или в/в по 0,05 через день в виде 0,5% или 0,25% раствора на изотоническом растворе хлорида натрия. При необходимости интервал между введениями удлиняют до 2-4 дней. Доза на курс 0,5-0,65 г. При рецидиве проводят повторные курсы в тех же дозах, но не раньше, чем через 6 мес. Возможны лейкопения и тромбоцитопения. Противопоказан при кахексии, значительной анемии; лейкопении и тромбоцитопении, сердечной недостаточности, тяжелых заболеваниях печени и почек.

ИМОДИУМ (Imodium). Состав: 1 капсула содержит 2 мг лоперамида. Применяют при остром и хроническом гастроэнтерите. Рекомендован взрослым и де-

тям старше 5 лет. При острой диарее начальная доза для взрослых 2 капсулы, для детей - 1 капсула. При хроническом гастроэнтерите начальная доза 2 капсулы в день для взрослых, для детей — 1 капсула. Поддерживающая доза 1-6 капсул в день. Может вызвать непроходимость кишечника, запор.

"ИНГАКАМФ" ("Inhacamph"). Карманный ингалятор, содержащий ткань, пропитанную следующим составом: камфоры 0,3 г, ментола 0,17 г, метилового эфира салициловой кислоты 0,08 г, масла эвкалиптового 0,01 г. Применяют в качестве противовоспалительного и антисептического средства для ингаляций при острых ринитах.

"ИНГАЛИПТ" ("Inhalyptum"). Состав: норсульфазола растворимого 0,75 г, стрептоцида растворимого 0,75 г, тимола 0,015 г, масла эвкалиптового 0,015 г, масла мятного 0,015 г, спирта этилового 95% 1,8 мл, глицерина 2,1 г, твина-80 0,9 г, воды дистиллированной до 30 мл.. Антисептическое и противовоспалительное средство. Применяют при тонзиллитах, фарингитах, ларингитах, афтозных и язвенных стоматитах. Орошение по 1-2 с 3-4 раза в сутки. Препарат удерживают в полости рта 5-7 мин. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам и эфирным маслам.

ИНДОВАЗИН (Indovasin). Состав: 3% индометацина, 2% троксевазина в гельной основе. Сильное противовоспалительное действие индометацина сочетается со способностью троксевазина уменьшать повышенную проницаемость капилляров и улучшать микроциркуляцию в пораженных тканях, ограничивать тромботические процессы. Применяют при бурситах, тендовагините, синовите, варикозном расширении вен и геморрое, сопровождающемся болями и отеками, до- и послеварикозном синдроме, гематомах травматического характера, состоянии после иммобилизации. Выжать из тюбика 1-2 см геля и наносить легкими втирающими движениями на пораженные участки 2-3 раза в день. Очень редко отмечаются жалобы на желудочно-кишечные нарушения. Применять с осторожностью при медикаментозной аллергии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, лейкопении, геморрагическом диатезе.

ИНДОМЕТАЦИН (Indomethacin). Синонимы: Indocid, Methindol. Противовоспалительное, анальгезирующее и болеутоляющее средство. Применяют при ревматическом и инфекционном неспецифическом полиартрите, болезни Бехтерева, подагрическом артрите и др. Назначают внутрь во время или после еды, начиная с 0,025 г в день с последую-

щим повышением дозы до 0,2 г/сут. Мазь наносят 2 раза в сутки на больные суставы или участки тела. Возможны головная боль, головокружение, диспептические явления, в отдельных случаях изъязвление пищевода, желудка и кишечника, усиление боли при язвенном колите. Противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам салициловой кислоты, обострении язвенного процесса, бронхиальной астме.

ИНКАЗАН (Incazanum). Синоним: Metralindol. Антидепрессант четырехциклической структуры. Применяют при депрессии различного генеза (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, циклотимия, сосудистые заболевания головного мозга и др.); вялоапатических, адинамических депрессиях с заторможенностью, неглубоких депрессиях с неврозоподобной и маловыраженной ипохондрической симптоматикой. Внутрь, начиная с 0,025-0,05 г 1-2 раза в день, затем повышая дозу до 0,05-0,1 г/сут каждые 2-3 дня до достижения терапевтического эффекта. Средние суточные дозы 0,1-0,2 г. Возможны сухость во рту, тошнота, колебания АД, брадикардия. Противопоказан при ажитированных депрессиях и других состояниях, сопровождающихся возбуждением. Не следует назначать одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы, а также в течение первых 14 дней после их отмены.

ИНМЕКАРБ (Inmecarbum). Применяют в качестве неспецифического вспомогательного средства в комплексном лечении больных алкоголизмом во время ремиссии. Использование одного инмекарба без комбинации с [illegible] средствами [illegible]. Назначают внутрь после [illegible] 1 г 3 раза в день. [illegible] определяют индивидуально [illegible] состояния больного. Курс [illegible] 2 мес. Курс можно повторить [illegible] года. Вызывает сонливость, [illegible] явления, онемение [illegible] ротовой полости, боль в [illegible] органах и конечностях, [illegible] язвенной болезни желудка и [illegible] ной кишки, понижение АД, [illegible]. Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушении функции печени и почек, сердечно-сосудистой недостаточности, органических заболеваниях головного мозга. Не используют у подростков, беременных и женщин, кормящих грудью.

ИНСУЛИН (Insulinum). Гормональный препарат поджелудочной железы млекопитающих. Применяют как специфическое антидиабетическое средство. Вводят подкожно или в/м за 30-40 мин до еды. Дозы устанавливают индивидуально в зависимости от состояния больного и содержания сахара в моче. В психиатриче-

ской практике инсулин применяют для вызывания гипокликемической комы при лечении некоторых форм шизофрении. Небольшие дозы инсулина вводят при общем истощении, упадке питания и др. В настоящее время выпускается несколько видов инсулина. Наряду с водным раствором кристаллического инсулина (инсулин для инъекций) выпускается ряд препаратов пролонгированного действия, которые можно вводить реже, чем инсулин для инъекций. Инсулин для инъекций оказывает наиболее быстрое и наименее продолжительное действие (около 6 ч); более продолжительное действие (10-12 ч) оказывает суспезия цинк-инсулина аморфного, суспензия цинк-инсулина (20-24 ч), суспензия инсулин-протамина (16-18 ч), суспензия протамин-цинк-инсулина (24-36 ч), суспензия цинк-инсулина кристаллического (30-36 ч). Первые инъекции инсулина и подбор оптимальной дозы желательно производить в условиях стационара. В настоящее время фирма "НОВО" (Дания) разработала новое поколение человеческого инсулина - Ново НМ, который получают из пекарских дрожжей, используя метод рекомбинации ДНК. Фирма "НОВО" выпускает следующие лекарственные формы: актрапид[R] НМ - быстродействующий растворимый инсулин; протафан[R] НМ - изофановый инсулин промежуточного действия; актра-

фан^{R} НМ - готовая форма 30 % быстро действующего и 70 % изофанового инсулина промежуточного действия с выраженным первоначальным эффектом; монотард^{R} НМ - суспензия цинк-инсулина промежуточного действия; ультратард^{R} НМ - суспензия цинк-инсулина пролонгированного действия. Фирма "Эли Лилли" (США) выпускает инсулины Илетин *II* (разновидности регуляр, НПХ и ленте) - *свиной инсулин, прошедший дополнительные* этапы хроматографической очистки; *и* инсулины Хумулин (формы Р, Н, *Л, У*, М1, М2, М3, М4). Выбор препарата и подбор дозы осуществляет врач, в зависимости от характера заболевания, образа жизни и других индивидуальных особенностей больного.

ИНТЕРЛОК (Interlock). Активным веществом препарата является интерферон. Подавляет жизнедеятельность ряда вирусов. Предназначен для лечения вирусных заболеваний глаз (кератиты, кератоувеиты, конъюнктивиты), вызываемых herpes simplex и herpes zoster. Особенно эффективен в начальной стадии заболевания. Содержимое ампулы растворяют в 1 мл стерильной дистиллированной воды. В острой стадии заболевания закапывают по 2-3 капли в каждый глаз 8-10 раз в сочетании с симптоматическим лечением. По мере стихания воспалительного процесса число закапыва-

ний уменьшают до 5-6 раз в день. Курс 12-14 дней, при необходимости - до 30 дней.

ИНТАЛ (Intal). Динатрия хромогликат. Синоним: Chromoglycat. Предупреждает спазмы бронхов. Применяют при бронхиальной астме. Для ингаляций (1 капсула 3-4 раза в день) с помощью специального ингалятора. В отдельных случаях возможно раздражение гортани и горла, особенно в период респираторных заболеваний; в редких случаях бронхоспазм.

ИНТЕРФЕРОН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ (Interferonum leucocyticum). Видоспецифический белок, синтезируемый лейкоцитами человека. Применяют для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных заболеваний вирусной этиологии. Вводят интраназально путем закапывания водного раствора или ингаляций. Содержимое ампулы растворяют в 2 мл кипяченой и охлажденной воды. С целью профилактики введение начинают при непосредственной угрозе заражения и продолжают до сохранения опасности заражения. Вводят по 5 капель (0,25 мл) в каждый носовой ход 2 раза в сутки с интервалом не менее 6 ч (для введения препарата можно также использовать ингалятор любой системы). Для лечения препарат применяют на ранней стадии заболевания при появлении первых

симптомов. Вводят по 5 капель (0,25 мл) в каждый носовой ход через 1-2 ч не менее 5 раз в сутки в течение 2-3 сут.

"ИРУКСОЛ" МАЗЬ (Unguentum "Iruxol"). В 1 г мази содерж[illegible] диопептидазы А 0,6 ЕД, х[illegible] 10 мг. Мазь для фермен[illegible] ран. Применяют при [illegible] ранах, пролежнях, ожогах, II и III [illegible] гангрене, отморожениях, пос[illegible] ранах. Ежедневно нанося[illegible] тонким равномерным слоем. [illegible] проводят аппликации 2 [illegible] В начале лечения в области ран[illegible] отмечаться жжение и боль, что лишь в редких случаях служит поводом к отмене препарата.

ИСИПЕН (Isipen). Бактерицидный полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда, активный в отношении как грамотрицательных патогенных микроорганизмов, так и грамположительных: стрептококков, пневмококков, стафилококков, не производящих пенициллиназу, и энтерококков, а также некоторых анаэробов, в особенности Bacteroides spp. Применяют при системных местных и смешанных инфекциях, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами. В клинической практике можно назначать, не дожидаясь результатов бактериологического исследования. В/в введение: инъекция или ка-

пельное вливание. Суточную дозу 100-200 мг/кг массы тела делят на 2-4 эквивалентные дозы; в наиболее тяжелых случаях дозу 200-300 мг/кг массы тела делят на 3-4 эквивалентные дозы. Максимальная суточная доза 24 г, хотя превышение не приводило к неблагоприятным последствиям. При необходимости лечение может быть продолжено в/м инъекциями. В/м препарат вводится лишь с целью купирования неосложненных инфекций. Доза - 2 г каждые 8-12 ч. Общая суточная доза до 4-6 г. Новорожденным и детям от 2 мес до 14 лет исипен вводят только в/в. Суточную дозу 100-200 мг/кг массы тела делят на 2-4 эквивалентные дозы. В особо тяжелых случаях (септицемия, инфекции ЦНС) суточную дозу можно увеличить до 200-300 мг/кг массы тела, разделив на 2-4 эквивалетные дозы. При нарушении функции почек доза рассчитывается в соответствии с тяжестью нарушения: незначительное - 16 г в сутки, среднее - 12 г, тяжелое - 8 г, больным на гемодиализе - 8 г. Продолжительность лечения зависит от степени тяжести заболевания, обычно занимает еще 2-4 дня после исчезновения клинических симптомов. Медленная в/в инъекция осуществляется за 3-5 мин, в/в вливание - за 20-40 мин, в/м нельзя вводить более 2 г в один участок. При комбинированной терапии необходимо подобрать оптималь-

ную дозу каждого препарата и вводить их отдельно. Редко наблюдается тошнота, появление жидкого стула, болевых ощущений в месте в/м введения. При многократном введении могут возникнуть флебит, изменения формулы крови (эозинофилия, тромбоцитопения, нейтропения), повышение уровня энзимов печени, подавление функции почек, легкие аллергические реакции. Противопоказан при гиперчувствительности к пенициллинам и инфекционном мононуклеозе. Относительные противопоказания: аллергические реакции на цефалоспориновые антибиотики, предрасположенность больного к аллергическим реакциям (бронхиальная астма, крапивница), беременность.

ИХТИОЛ (Ichthyolum). Аммониевая соль сульфокислот сланцевого масла, применяемая при заболеваниях кожи (ожоги, рожистое воспаление, экзема и др.), невралгиях, артритах в виде 10-20% мази, 10-30% водно-спиртового раствора для примочек; при воспалительных заболеваниях органов малого таза в виде свечей и 10% раствора ихтиола в глицерине для смачивания тампонов.

ЙОД (Iodum). Оказывает противомикробное действие; участвуя в синтезе тироксина, влияет на функцию щитовидной железы, усиливает процессы диссимиляции, благоприятно действует на ли-

пидный и белковый обмен. Применяют наружно в виде 5% и 10% спиртового раствора как антисептическое, раздражающее и отвлекающее средство, внутрь по 0,02 г на прием при атеросклерозе, хронических воспалительных процессах в дыхательных путях, при третичном сифилисе, гипертиреозе, эндемическом зобе, хронических отравлениях ртутью и свинцом. Возможны явления йодизма (насморк, крапивница и др.). При приеме внутрь: противопоказан при туберкулезе легких, нефритах, фурункулезе, угревой сыпи, хронической пиодермии, геморрагических диатезах, крапивнице, беременности, повышенной чувствительности к йоду.

ЙОДИНОЛ (Iodinolum). Состав: йода 0,1 г, калия йодида 0,3 г, спирта поливинилового 0,9 г, воды дистиллированной до 100 мл. Антисептический препарат йода с удлиненным действием. Применяют при хроническом тонзиллите для промывая лакун, миндалин и супратонзиллярных пространств (4-5 промываний через 2-3 дня); при гнойных отитах для закапывания по 5-8 капель и промывания в течение 2-4 нед; при атрофических ринитах для пульверизации полости носа и глотки 2-3 раза в неделю в течение 2-3 мес; при трофических и варикозных язвах, гнойных ранах и ожогах повязки 1-2 раза в сутки. Возможны явления йодизма.

ЙОДОНАТ (Iodonatum). Водный раствор комплекса поверхностно-активного вещества с йодом; содержит около 3% йода. Обладает высокой бактерицидной активностью в отношении кишечной палочки, золотистого стафилококка, протея, синегнойной палочки; оказывает фунгицидное действие. Применяют как антисептик только для обеззараживания кожи операционного поля (заменитель раствора йода) в виде раствора, содержащего 1% свободного йода, для чего йодонат разбавляют в отношении 1:3 стерильной кипяченой дистиллированной водой. В конце операции перед наложением на кожу швов повторно обрабатывают края раны 5-7 мл 1% раствора.

ЙОДОПИРИН (Iodopironum). Смесь комплекса поливинилпирролидон-йода с йодидом калия (содержит 6-8% активного йода). Антисептической средство. Обладает бактерицидной активностью в отношении эшерихий, золотистого стафилококка, протея. Применяют у взрослых в качестве кожного антисептика и в комплексном лечении гнойных ран. Для обработки рук хирурга применяют 0,1% (по активному йоду) растворы; для комплексного лечения гнойных ран, обеззараживания операционного поля и обработки локтевых сгибов доноров - 0,5 и 1% (по активному йоду) растворы йодопирона. Препарат используется в стационар-

ных условиях. Противопоказан при индивидуальной непереносимости йода.

ЙОДОФОРМ (Iodoformium). Трийодметан. Синоним: Formylum triiodatum. Применяют в качестве антисептического средства при лечении инфицированных ран и язв в виде присыпок, мазей.

КАВИНТОН (Cavinton). Одна таблетка содержит 5 мг этилового эфира аповинкаминовой кислоты; 1 ампула (2 мл) - 10 мг этилового эфира аповинкаминовой кислоты. Избирательно улучшает мозговой кровоток и снабжение мозга кислородом, не снижая АД и не оказывая непосредственного действия на сердце. Применяют при расстройствах мозгового кровотока различной этиологии с психическими или неврологическими нарушениями (афазия, апраксия, двигательные расстройства, гипертоническая энцефалопатия, ангиоспастические и ишемические мозговые расстройства); заболеваниях сосудистой и сетчатой оболочки глаз, обусловленных артериосклерозом или ангиоспазмом, частичных тромбозах, вторичной глаукоме. вызванной закупоркой сосудов, возрастных сосудистых или токсических поражениях слухового нерва, головокружении лабиринтного происхождения. При остро возникших нарушениях 3 раза в день по 10 мг в/в, затем внутрь по 1-2 табл. 3 раза в день. Поддер-

живающая доза - по 1 табл. 3 раза в день. Противопоказан при беременности.

КАЛАНХОЭ СОК (Succus Kalanchoes). Сок из свежих листьев и травянистой части стебля растения каланхоэ (Kalanchoe pinnata (Lam.) Persoon). Противовоспалительное средство, способствует быстрому очищению ран и язв от некротических тканей. Применяют при трофических язвах, незаживающих ранах, ожогах, пролежнях, трещинах сосков у кормящих матерей, афтозных стоматитах, гингивитах и т.д. На неповрежденную вокруг раны кожу (после туалета раны) наносят тонкий слой синтомициновой эмульсии, фурацилиновой мази, вазелина. При помощи шприца через иглу малого диаметра орошают рану или язву соком (1-3 мл), закрывают марлевой салфеткой (4-5 слоев), обильно смоченной соком, и накладывают повязки (ежедневно или через день). В стоматологической практике в виде аппликаций 3-4 раза в день.

КАЛЕНДУЛЫ ЦВЕТКИ (ЦВЕТКИ НОГОТКОВ) (Flores Calendulae). Содержат горькое вещество календен, каротиноиды (каротин, ликопин, виолаксантин, рубиксантин), флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, салициловую кислоту. Применяют в качестве бактерицидного и противовоспалительного средства при ангине, воспалительных заболеваниях слизистой

оболочки рта в виде настоя (10,0:200,0) и настойки (1 ч. л. на стакан воды) для полоскания.

КАЛЕФЛОН (Caleflonum). Очищенный экстракт из цветков ноготков лекарственных (Calendula officinalis). Применяют в качестве противовоспалительного средства при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите в фазе обострения. Внутрь после еды по 0,1-0,2 г 3 раза в день. Курс лечения 3-4 (до 6) нед. Можно назначать вместе с антацидными и спазмолитическими средствами. Возможны горечь во рту, жжение в подложечной области.

КАЛИМИН (Kalymin). Синонимы: Mestinon, Pyridostigmin. Препарат антихолинэстеразного действия, применяемый при миастении, двигательных нарушениях после травм, параличей, при энцефалите, в восстановительный период после полиомиелита. Внутрь по 0,06 г 1-3 раза в день, в/м по 1-2 мл 0,5% раствора. При передозировке отмечается гиперсаливация, миоз, диспептические явления, учащенное мочеиспускание, подергивание мышц с последующей слабостью. Противопоказан при эпилепсии, гиперкинезах, бронхиальной астме, стенокардии, выраженном кардиосклерозе.

КАЛИЯ БРОМИД (*Kalii bromidum*). Применяют как успокаивающее средство

при неврастении, неврозах, повышенной раздражительности; внутрь per se и в комплексе с калия йодидом по 0,1-1 г/сут.

КАЛИЯ ЙОДИД (Kalii iodidum). Применяют при гипертиреозе, [illegible] ском зобе, воспалительных заболеваниях дыхательных путей, глазных заболеваниях (катаракта, глаукома и др.), [illegible] альной астме в растворах и [illegible] по 0,3 г на прием 3-4 раза в день [illegible] (желательно запивать молоком или киселем). При актиномикозе [illegible] ких по 1 ст. л. 10-20% раствора 4 раза в день.

КАЛИЯ ОРОТАТ (Kalii orotas). Синонимы: Dioron, Oropur. Оказывает анаболическое действие при нарушении белкового обмена, сопровождающегося дефицитом оротовой кислоты. Применяют при заболеваниях печени и желчных путей, вызванных интоксикациями (кроме цирроза с асцитом); инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности, нарушениях сердечного ритма; дерматозах, алиментарной и алиментарно-инфекционной гипотрофии у детей и др. Внутрь (за 1 ч до еды или через 4 ч после еды) по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день. Курс (20-40 дней) при необходимости через месяц повторяют. Детям назначают из расчета 10-20 мг/(кг.сут) (в 2-3 приема). Возможны аллергические дерматозы.

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ (Kalii permanganas). Синоним: калий марганцовокислый. Применяют в качестве антисептического средства для промывания ран, смазывания язвенных и ожоговых поверхностей, полоскания рта и горла, спринцеваний и промываний в гинекологической и урологической практике, наружно в виде водных растворов.

КАЛИЯ ХЛОРИД (Kalii chloridum). Применяют при нарушениях сердечного ритма (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия), интоксикациях после введения сердечных гликозидов и диуретиков, недостатке калия в организме, в том числе при лечении кортикостероидами и др. Внутрь в виде 10% раствора по 15-20 мл 3-4 раза в день (при необходимости разовую дозу увеличивают до 60-120 мл), в/в капельно до 2,5 г в 500 мл изотонического раствора натрия хлорида или в 5% растворе глюкозы. Возможны парестезия, в редких случаях парадоксальная реакция (увеличение числа экстрасистол); при приеме внутрь тошнота, рвота, диарея. Противопоказан при нарушениях выделительной функции почек, полной блокаде сердца; необходима осторожность при нарушениях атриовентрикулярной проводимости.

КАЛЬМАГИН (Calmaginum). Состав: магния карбоната основного 4,5 г,

кальция карбоната осажденного и натрия гидрокарбоната по 3 г. Нейтрализует кислое содержимое желудка. Назначают детям в виде суспензии при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, остром и хроническом гастрите, гастродуоденитах и других заболеваниях, протекающих с гиперацидозом. Детям до 6 лет назначают 5 мл суспензии на прием, 7-12 лет - 7,5 мл, 13 лет и старше - 15 мл и более. Принимают за 30 мин до еды или между приемами пищи 4-6 раз в день. Курс лечения 3-4 нед. У детей младшего возраста, находящихся на молочной диете, может развиться молочно-щелочной синдром Бернетта.

"КАЛЬЦЕКС" ("Calcex"). Комплексная соль гексаметилентетрамина и кальция хлорида, применяемая при простудных заболеваниях по 0,5 г 3-4 раза в день.

КАЛЬЦИТРИН (Calcitrinum). Гормональный препарат, получаемый из щитовидных желез свиней, содержит гипокальциемический гормон кальцитонин (тирокальцитонин). Аналоги: кальцитар, кальцитонин и др. Участвует в регуляции обмена кальция и фосфатов в организме. Назначают взрослым при системных заболеваниях, характеризующихся усиленной перестройкой скелета: болезни Педжета, несовершенном остеогенезе, спонтанном рассасывании костей, асептиче-

ском некрозе головок бедренных костей, климактерическом, стероидном, паратиреоидном и других видах остеопороза, фиброзной дисплазии, при осложненном течении травматического поражения костей (замедленном сращении переломов, травматическом и лучевом остеомиелите, патологической зональной перестройке костей у спортсменов и пародонтозе). В/м или подкожно. Препарат растворяют в воде для инъекций. Перед началом лечения определяют содержание кальция в крови, а также проводят кожную пробу - внутрикожное введение 1 ЕД кальцитрина в 0,1 мл растворителя. Больным с содержанием кальция в крови ниже 2,5 ммоль/л (10 мг %) и больным с выраженной кожной реакцией на кальцитрин лечение не проводят. Вводят 1 раз в день ежедневно в течение месяца, делая перерыв каждый 7-й день, или через день в течение 2-3 мес. Спортсменам с патологической зональной перестройкой костей вводят по 1 ЕД в день; при системных поражениях скелета средней тяжести вводят по 2-3 ЕД в день, при тяжелых формах - по 5 ЕД в день. Повторный курс проводят не ранее 2 мес после окончания применения препарата. Одновременно с кальцитрином рекомендуется прием препаратов кальция внутрь по 4-6 г/сут. Возможны аллергические реакции в месте инъекции, приливы крови к лицу, повы-

шение АД. Повышение дозы (более 5 ЕД на инъекцию) вызывают тошноту, рвоту. Передозировка или повышенная чувствительность к препарату может привести к гипокальциемии (парестезии, подергивание мышц). Противопоказан при гиперкальциемии, беременности и в периоде лактации.

КАЛЬЦИЯ ГЛИЦЕРОФОСФАТ (Calcii glycerophocphas). Применяют как общеукрепляющее и тонизирующее средство при общем упадке питания, переутомлении, истощении нервной системы, рахите per se и в смеси с фитином или кальция лактатом взрослым по 0,25-0,5 г, детям по 0,05-0,2 г 2-3 раза в день.

КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ (Calcii gluconas). Кальциевая соль глюконовой кислоты. Близок к кальция хлориду, но оказывает меньшее раздражающее действие. Применяют в тех же случаях, что и кальция хлорид, внутрь перед едой по 1-3 г 2-3 раза в день; детям от 0,5 г до 2-3 г 2-3 раза в день. В/м и в/в (медленно) вводят 5-10 мл 10% раствора ежедневно или через 1-2 дня; детям только в/в в зависимости от возраста от 1 до 5 мл 10% раствора каждые 2-3 дня. При парентеральном введении в редких случаях наблюдаются тошнота, рвота, понос, замедление пульса.

КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ ОСАЖДЕННЫЙ (Calcii carbonas praecipitatus).

Применяют в качестве антацидного средства, при повышенной кислотности желудочного сока. Внутрь по 0,25-1 г 2-3 раза в день.

КАЛЬЦИЯ ЛАКТАТ (Calcii lactas). Применяют при тех же заболеваниях, что и кальция глюконат внутрь 2-3 раза в день по 0,5 г или по 1 ст. л. 5-10% раствора.

КАЛЬЦИЯ ПАНГАМАТ (Calcii pangamas). Смесь кальциевой соли эфира глюконовой кислоты и диметилглицина с глюконатом кальция и хлоридом кальция в соотношении не менее 70%, не более 25% и не более 6%. Синоним: витамин B15. Улучшает липидный обмен. Повышает усвоение кислорода тканями, а также содержание гликогена в мышцах и печени. Устраняет гипоксию. Применяют при атеросклерозе; эмфиземе легких; пневмонии; хронических гепатитах; алкогольной интоксикации; отравлении наркотиками, хлорсодержащими органическими соединениями, антибиотиками тетрациклинового ряда, кортикостероидами, сульфаниламидными препаратами; зудящих дерматозах. Внутрь: суточная доза для взрослых 100-300 мг, для детей до 3 лет 50 мг, от 3 до 7 лет 100 мг, от 7 до 14 лет 150 мг. Курс (20-40 дней) через 2-3 мес можно повторить. Противопоказан при глаукоме, гипертонической болезни.

КАЛЬЦИЯ ПАНТОТЕНАТ (Calcii pantothenas). Кальциевая соль D-(+)-пантотеновой кислоты. Синоним: витамин B3. Входит в состав кофермента А. Применяют при полиневритах, невралгиях, парестезиях, фотодерматозах, экземе, аллергических реакциях (дерматиты, сенная лихорадка); трофических язвах, ожогах, токсикозах беременных; катарах верхних дыхательных путей, бронхите, бронхиальной астме; послеоперационной атонии кишечника; интоксикации стрептомицином. Внутрь взрослым по 0,1-0,2 г 2-4 раза в день. Детям 1-3 лет по 0,05-0,1 г 2 раза в день, 3-14 лет по 0,1 г 2 раза в день. Суточная доза для взрослых 0,4-0,8 г, для детей 0,3-0,4 г. При атонии кишечника назначают по 0,25 г каждые 6 ч. Парентерально 1-2 мл 20% раствора 1-2 раза в день. Курс 3-4 мес. Возможны тошнота, рвота, азотемия.

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (Calcii chloridum). Применяют при недостаточной функции паращитовидных желез, повышенном выделении кальция из организма; аллергических заболеваниях и осложнениях; необходимости уменьшения проницаемости сосудов; паренхиматозном гепатите, токсических поражениях печени, нефрите, эклампсии; как кровоостанавливающее средство и противоядие (при отравлении солями магния, щавелевой кисло-

той и др.). Внутрь после еды по 1 ст., д. или ч. л. 5-10% раствора 2-3 раза в день; в/в (медленно) по 5-15 мл 10% раствора. Возможны чувство жара при в/в введении. Противопоказан при склонности к тромбозам, выраженном атеросклерозе, повышенном содержании кальция в крови.

"КАМЕТОН" АЭРОЗОЛЬ ("Cametonum" aerosolum). Содержит хлорбутанолгидрат 0,1 г, камфору 0,1 г, ментол 0,1 г, масло эвкалиптовое 0,1 г, масло вазелиновое 9,6 г, фреон 20,0 г. Противовоспалительное и антисептическое средство, применяемое при острых и хронических (в стадии обострения) воспалительных заболеваниях носа, глотки и гортани. Распыляется в области рта и носа 3-4 раза в день в течение 1-2 с. Длительность ингаляции 1-2 мин. Не назначают детям до 5 лет.

"КАМФОМЕН" АЭРОЗОЛЬ ("Camphomenum" aerosolum). Содержит 0,1% спиртового раствора фурацилина 2 мл, ментола 0,06 г, масла эвкалиптового, масла камфорного и масла касторового по 0,61 г, масла оливкового до 10 г, фреона 20 г. Противомикробное и противовоспалительное средство, применяемое при остром рините, фарингите, фаринголарингите. Распыляется в полости рта и носа 3-4 раза в день, по 1-3 распыления на процедуру. Не назначают детям до 5 лет, а

также больным, работающим в условиях значительной запыленности воздуха.

КАМФОНИЙ (Camphonium). Снижает АД, расширяет периферические кровеносные сосуды. Применяют при облитерирующем эндартериите; гипертонической болезни I-II стадии, язвенной болезни желудка. Внутрь независимо от приема пищи. Дозы строго индивидуальны, 0,01-0,1 г 1-2 раза в день. Парентерально вводят, начиная с 0,5-1 мл 1% раствора, при хорошей переносимости разовую дозу можно увеличить до 5 мл; инъекции 1-3 раза в день. Возможны общая слабость, учащение пульса, сухость во рту, расширение зрачков, запор. В этих случаях прием препарата следует прекратить и обратиться к врачу. Противопоказан при гипотонии, выраженном артериосклерозе, органических поражениях миокарда, тромбозах, хронической коронарной недостаточности, глаукоме, инфаркте миокарда, кровоизлиянии в мозг.

КАМФОРА (Camphora). Возбуждает центральную нервную систему, стимулирует кровообращение и дыхание, а также оказывает положительное влияние на обменные процессы в миокарде. Применяют при острой и хронической сердечной недостаточности, гипотонии, коллапсе, для профилактики и лечения нарушений кровообращения при инфекционных за-

болеваниях, пневмонии, гнойном плеврите, отравлениях наркотиками, снотворными. Подкожно по 1-5 мл 20% масляного раствора; внутрь по 0,1-0,2 г растертой камфоры на прием. Наружно для растираний при ревматизме, артритах и др. в виде 10% камфорного масла; для растираний и предупреждения пролежней - камфорный спирт (1 часть камфоры, 7 частей этилового спирта и 1 часть воды). Возможно попадание препарата в просвет сосудов и развитие масляных эмболий. Иногда крапивница, скарлатиноподобная сыпь, возбуждение, бред, судороги. Противопоказано подкожное введение при эпилепсии, склонности к судорожным реакциям, недостаточной лактации. С осторожностью применяют при острых эндокардитах, аневризме крупных сосудов.

КАНАМИЦИНА МОНОСУЛЬФАТ (Kanamycini monosulfas). Препарат широкого спектра антимикробного действия. Устойчивость к нему развивается медленно. Не обладает кумулятивным свойством. Применяют при кишечных инфекциях (дизентерия, дизентерийное бактерионосительство, бактериальный колит и энтероколит); для подготовки больных к операциям на желудочно-кишечном тракте. Внутрь 4-6 раз в сутки по 0,5-0,75 г. Высшая суточная доза 4 г. Детям из расчета 50 мг/(кг.сут); недоношенным и детям 1-го мес. жизни - только по жизненным показаниям. Курс 7-10 дней. В

предоперационном периоде взрослым назначают в 1-е сутки 6 г, а в последующие 2 сут по 1 г 4 раза. В единичных случаях возможны тошнота, жидкий стул. Противопоказан при нарушениях функции почек, поражениях слухового нерва, непроходимости кишечника; не назначать вместе со стрептомицином, мономицином, неомицином, гентамицином и флоримицином.

КАНАМИЦИНА СУЛЬФАТ (Kanamycini sulfat). Образуется при биосинтезе Streptomyces Kanamyceticus. Синонимы: Kanacin, Resistomycin. Широкий спектр антибактериального действия. Высокоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий (включая Mycobacterium tuberculosis), большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий (Aerobacter aerogenes, Kl. pneumoniae. E. coli, Neisseria, Proteus, Salmonella, Shigella, Staphylococcus). Наименее токсичен из препаратов неомицинового ряда, не обладает кумулятивным свойством. Применяют при туберкулезе, вызванном микобактериями, устойчивыми к стрептомицину и фтивазину; инфекционных болезнях (пневмониях, легочных нагноениях, сепсисе, пиелонефрите, пиелите, пиелоцистите); для предупреждения гнойных осложнений при хирургических вмешательствах. В/м при туберкулезе в дозе 1 г в 2 приема или однократно в те-

чение 6 дней в неделю с перерывом каждый 7-й день. При инфекциях нетуберкулезной этиологии по 0,5 г 2-3 раза в сутки в течение 5-7 дней. Детям из расчета 15-20 мг/(кг.сут). Длительное введение может вызвать поражение слухового нерва (неврит) и нарушение функции почек (микрогематурия, альбуминурия и др.). Противопоказан при нарушении функции почек и поражении слухового нерва, не назначать вместе со стрептомицином, мономицином, неомицином, гентамицином, флоримицином.

КАПОТЕН (Capoten). Эффективное средство для лечения больных с сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью. При гипертонической болезни используют per se или в сочетании с другими противогипертоническими препаратами. Рекомендуется для лечения больных с сердечной недостаточностью, слабо или вообще не реагирующих на обычное лечение. Используют вместе с диуретиками. Для взрослых начальная доза при гипертонии составляет 25 мг 2-3 раза в день. Если через 2 нед удовлетворительного снижения АД не отмечается, дозу препарата увеличивают до 50 мг 2-3 раза в день. Начальную дозу вводить при тщательном медицинском контроле. При сердечной недостаточности назначают 25 мг 3 раза в день. Максимальная суточная доза 450 мг. Для детей начальная доза 0,3 мг/кг, препарат вводят под тщательным

медицинским контролем. Наблюдаются зуд, покраснение лица, боль в животе.

"КАПСИН" ("Capsinum"). Состав: этилового (или метилового) эфира салициловой кислоты 1 часть, масла беленого и настойки перца стручкового по 2 части. Применяют при радикулитах, невритах, миозитах, артритах наружно для растирания

"КАПСИТРИН" (Capsitrinum). Состав: настойки стручкового перца 27 мл, настойки зверобоя 1 мл, мыла зеленого 10 г, раствора аммиака 20% 5 мл, спирта этилового 60% 56 мл. Применяют при радикулитах, невритах, миозитах, артритах наружно для растирания.

КАПУСТА МОРСКАЯ (Laminaria). Содержит альгинат (30%), маннит (20-25%), витамины B1, B2, B12, C, Д, каротиноиды, органические соединения йода, микроэлементы (марганец, медь, серебро, кобальт, бор). Применяют в качестве легкого слабительного средства при хронических атонических запорах (особенно больным с явлениями атеросклероза) по 1/2-1 ч.л. на ночь (запивать водой). Противопоказан при нефритах, геморрагических диатезах и заболеваниях, при которых противопоказаны препараты йода.

КАРБЕНИЦИЛЛИНА ДИНАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Carbenicillinum dinatricum).

Синоним: пиопен. Антибиотик из группы пенициллинов, оказывающий антимикробное действие. Применяют при заболеваниях, вызванных чувствительными к этому препарату грамотрицательными микроорганизмами, септицемии, эндокардите, менингите, остеомиелите, раневой инфекции, инфицированных ожогах, перитоните, пневмонии, инфекциях мочевого тракта, гнойном отите и др. Применение при инфекциях, вызванных грамположительными микроорганизмами, нецелесообразно. Вводят в/м, в/в (медленно струйно или капельно) только в условиях стационара в дозе, указанной в инструкции При в/м введении суточная доза для взрослых составляет 4-8 г в зависимости от выделенного возбудителя; суточная доза для детей - 50-100 мг/кг. Суточную дозу делят на 4-6 введений. Продолжительность курса в среднем 10-14 дней. Для в/м введения 1 г препарата растворяют в 2 мл дистиллированной воды для инъекций. Для в/в введения применяют раствор с концентрацией не более 1 г препарата в 20 мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида. При развитии аллергических реакций антибиотик отменяют и проводят соответствующие лечебные мероприятия. При в/м введении отмечается болезненность, при в/в - возможны флебиты. Противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам группы пенициллинов.

КАРБИДИН (Carbidinum). Оказывает нейролептическое, антипсихотическое и одновременно антидепрессивное действие. Применяют при периодической и приступообразной прогредиентной (шубообразной) шизофрении депрессивно-[illegible] структурой приступов, [illegible] формах шизофрении с преобладанием депрессивно-[illegible] расстройств, [illegible] форме шизофрении с [illegible], алкогольных [illegible] и [illegible] тных состояниях. Назначают с [illegible] дозы 12,5 мг (в 3 приема), [illegible] водят ее до 75-150 мг и более. При [illegible] психозах лечение начинают [illegible] ких доз (100-150 мг/сут). [illegible] мор рук, скованность, [illegible] и другие экстрапирамидные нарушения, которые устраняют корректорами ([illegible] и др.). Изредка наблюдаются холестатические гепатиты. Противопоказан при нарушениях функции печени, отравлениях наркотическими и аналептическими средствами.

КАРБОКРОМЕН (Carbocromenum). Синонимы: Intensain, Intencordin. Антиангинальное средство, аналогично интенкордину. Применяют при ишемической болезни сердца с приступами стенокардии. Внутрь после еды по 150 мг 3 раза в день в течение 2 нед - 1 1/2 мес. Затем больного переводят на поддерживающие дозы - по 75 мг 3 раза в день. Возможны

головная боль, общая слабость, сухость во рту, тошнота, рвота, кожный зуд. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, обострении хронического гастрита, заболеваниях печени и почек с нарушением их функции.

КАРБОЛЕН (Carbolenum). Таблетки угля активированного (Tabulettae Carbonis activati) и таблетки угля активированного "КМ" (Tabulettae Carbonis activati "КМ"). Способен адсорбировать газы, алкалоиды, соли тяжелых металлов, токсины и т.д. Применяют как адсорбирующее средство при диспепсии, метеоризме, внутрь по 1-3 табл. 2-4 раза в день.

КАРДИОВАЛЕН (Cardiovalenum). Состав: консервированного и разведенного спиртом сока свежеубранной травы желтушника серого активностью 150 ЛЕД в 1 мл 17 г, адонизида активностью 85 ЛЕД в 1 мл 30 г, настойки свежесобранных корневищ и корня валерианы 46,9 г, жидкого экстракта плодов кроваво-красного боярышника 2 г, камфоры 0,4 г, спирта 96% 1,6 г, натрия бромида 2 г, хлорэтона (или метабисульфита натрия) 0,25%. Применяют при ревматических пороках сердца, кардиосклерозе с нарушением кровообращения I-III стадии; при стенокардии, вегетативных неврозах по 15-20 капель 1-2 раза в день. Противопоказания те же, что и для дру-

гих препаратов, содержащих сердечные гликозиды.

КАРЛОВАРСКАЯ СОЛЬ ИСКУССТВЕННАЯ (Sal carolinum factitium). Применяют в качестве слабительного утром натощак по 1 ст. л. (детям 2-6 лет по 1 ч. л.) на полстакана воды; как желчегонное по 1 ч. л. на стакан теплой воды за 30-45 мин до еды 2-3 раза в день.

КАРМИНОМИЦИН (Carminomycinum). Антибиотик из группы антрациклиновых антибиотиков. Обладает высокой противоопухолевой и [illegible] активностью. Угнетает кроветворение. Гидрохлорид карминомицина применяют при саркоме мягких тканей и костей, диссеминированных формах рака молочной железы, легких, лимфогранулематозе, злокачественных опухолях у детей (симпатобластома, нефробластома, рабдомиосаркома), хорионэпителиоме матки, острых миелобластных и лимфобластных лейкозах, бластном кризе хронического миелолейкоза. Вводят в/в, лечение проводят в "продленном" или "коротком" режиме. В "продленном" режиме взрослым назначают по 10-15 мг (5-7,5 мг/м^2—0,15 мг/кг) 2 раза в неделю. Курсовая доза 60-75 мг, интервал между курсами 4 нед. Детям вводят из расчета 0,15 мг/кг. При "коротком" режиме применяют по 5-10 мг (3-5 мг/м^2—0,1-0,15 мг/кг)

ежедневно в течение 5 дней с интервалами между курсами 3-4 нед. При лейкопении (менее $2 \cdot 10^9$/л) рекомендуется при следующем курсе уменьшить дозу на 25-50%. Растворы готовят непосредственно перед применением (5 мг препарата на 10 мл изотонического раствора натрия хлорида). Возможны тошнота, рвота, лейко- и тромбоцитопения, сердечно-сосудистые нарушения (боль в области сердца, тахикардия, изменение ЭКГ), при попадании под кожу развивается некроз тканей в месте инъекции. Противопоказан при общем тяжелом состоянии больного, тяжелых нарушениях функции сердечно-сосудистой системы, печени, почек, беременности, индивидуальной непереносимости, пониженном содержании лейкоцитов (ниже $4 \cdot 10^9$/л) и тромбоцитов (ниже $100 \cdot 10^9$/л), острых лейкозах - лейкопения ниже $2 \cdot 10^9$/л.

КАРНИТИНА ХЛОРИД (Carnitini chloridum). Синонимы: долотин, новаин и др. Биогенное вещество, участвующее в биохимической динамике мышечной ткани, улучшает аппетит, ускоряет рост и увеличивает массу тела. Применяют при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся понижением аппетита, уменьшением массы тела, истощением, а также при задержке роста у детей. Внутрь за 30 мин до еды, разбавляя водой, чаем, киселем и т.д. Взрослым 1/2-2 ч. л. на прием 2-3 раза в день. Детям в зависимо-

сти от возраста - от 4 до 42 капель на прием 2-3 раза в день, разводить в 5% растворе глюкозы или добавить к сокам, компотам, киселю. При приеме больших доз возможна боль в подложечной области.

КАРОТОЛИН (Carotolinum). Масляный экстракт каротиноидов из мякоти плодов шиповника, содержащий также токоферолы, ненасыщенные жирные кислоты и другие вещества. Применяют наружно при трофических язвах, экземах, атрофических изменениях слизистых оболочек, эритродермии.

КАРФЕЦИЛЛИН (Carphecillinum). Синоним: утициллин. Антибактериальный препарат, активный в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных, а также всех видов индолположительных и индолотрицательных микроорганизмов. Назначают взрослым при острых и хронических инфекциях мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит, уретрит), простатите и др. Внутрь, независимо от приема пищи. Разовая доза 0,5 г, суточная 1,5 г. При тяжелых и хронических заболеваниях разовая - 1 г, суточная - 3 г, разделяя дозу на 3 приема. Длительность лечения 7-14 дней и более. Возможны боль в животе, тошнота, в редких случаях рвота, диарея; аллергия, при длительном применении - развитие дисбактериоза. Противопоказан

при повышенной чувствительности к препарату группы пенициллина.

КАСТОРОВОЕ МАСЛО (Oleum Ricini) (масло клещевинное). Применяют как слабительное средство взрослым по 15-20 г, детям 5-15 г на прием, для стимуляции родовой деятельности - 30-40 г (в сочетании с хинином и др.), при ожогах, язвах, трещинах наружно в составе мазей и бальзамов. Противопоказан при отравлениях жирорастворимыми веществами (фосфор, бензол и др.), экстрактом мужского папоротника.

КАТАХРОМ-ОФТАН (Catachrom-oftan). Синоним: Vitafacolum. Глазные капли, содержащие катахром, цитохром С, сукцинат натрия, аденозин, никотинамид и стабилизирующие вещества. Улучшает кислородный обмен в роговой оболочке и ее питание, способствует ускорению репаративных процессов в переднем отделе глазного яблока. Применяют на начальных стадиях катаракты и для профилактики ее развития, при кератитах различной этиологии (герпетические, экзогенные, травматические). По 1-2 капли в пораженный глаз 3-4 раза в день. Курс при кератитах 1-2 нед, при катаракте - не менее месяца.

КАФИОЛ (Cafiolum). Содержит измельченные листья (0,7 г) и плоды (0,3 г) сенны, плоды инжира (4,4 г) мякоть пло-

...лов сливы (2,2 г) и вазелиновое масло (0,84 г). Слабительное средство, применяемое при запорах различного происхождения. По 1/2-2 брикета на [illegible] однократно или курсами по 10-14 [illegible]. Высшая суточная доза 6 брикетов.

"КВАДЕВИТ" ТАБЛЕТКИ ([illegible] "Quadevitum" obductae). Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов, аминокислот, микроэлементов. Применяют при гиповитаминозе, авитаминозе; недостаточности мозгового кровообращения, сердечно-сосудистой недостаточности, артериолосклеротической хориоретинальной дистрофии макулярной области; для усиления функциональной активности печени и почек, стимуляции заживления ран, уменьшения токсичности и ослабления побочных эффектов нейротропных, химиотерапевтических и других лекарственных средств. Внутрь после еды. С профилактической целью - по 1 табл. 3 раза в день, с лечебной целью - по 2 табл. 3-4 раза в день. Курс 3-4 нед. Повторные курсы после 3-месячного перерыва.

КВАСЦЫ ЖЖЕНЫЕ (Alumen ustum). Как вяжущее и подсушивающее средство в виде присыпок при потливости ног и др.

КВАТЕРОН (Quateronum). Активный ганглиоблокатор, применяемый при

тех же заболеваниях, что и бензогексоний, а также для предупреждения приступов стенокардии. Внутрь после еды по 0,02-0,04 г 3-5 раз в день. Высшая разовая доза для взрослых 0,05 г, суточная 0,2 г. Побочное действие и противопоказания те же, что и для бензогексония.

КВЕРЦЕТИН (Quercetinum). Агликон рутина, понижает проницаемость капилляров и увеличивает резистентность сосудистой стенки, расширяет сосуды, понижает тонус гладкой мускулатуры, обладает спазмолитическим свойством. Применяют при повышенной проницаемости и хрупкости капилляров при гипертонической болезни, атеросклерозе, ревматизме, гематологических, инфекционных и других заболеваниях; повреждении капилляров при лечении антикоагулянтами, мышьяком, висмутом, тиоцианатами; как вспомогательное и профилактическое средство при сосудистых осложнениях атеросклероза (инфаркт миокарда, инсульт, ретинопатия), при лучевой терапии и радиохирургическом методе лечения злокачественных новообразований. Внутрь по 0,02 г 3-5 раз в день. Дозы и продолжительность лечения индивидуальны. Курс до 5-6 нед. Одновременно рекомендуется назначать аскорбиновую кислоту.

КЕНАКОРТ (Kenacort). Синонимы: Kenalog, Polcortolon. Оказывает выра-

женное противовоспалительное, антиаллергическое и десенсибилизирующее действие. Аналогичен дексаметазону и триамцинолону (полькортолону). Внутрь по 0,004-0,02 г в день в 3-4 приема. По получении лечебного эффекта дозу препарата постепенно уменьшают до 0,001 г в день.

КЕНАЛОГ-40 (Kenalog-40) Синонимы: Polcortolon, Kenacort, Ledercort, Triamcinolonacetonid Синтетический глюкокортикостероидный препарат с длительным противоаллергическим и противовоспалительным действием. Применяют при аллергических заболеваниях, дерматозах, ревматоидном артрите. Вводят глубоко в/м в дозах, определяемых тяжестью заболевания и реакцией больного. В среднем начальная доза составляет 60-80 мг 1 раз в 2-4 нед, иногда необходимый эффект дает введение 20 мг и менее. Начальная доза для детей в возрасте от 6 до 12 лет составляет 40 мг препарата. Повторные инъекции назначают при рецидивах заболевания. Противопоказан при острых психозах, рецидивирующем герпетическом поражении роговицы, выраженных грибковых и вирусных инфекциях, активном или леченом туберкулезе, артритах гонококковой или туберкулезной этиологии. Относительными противопоказаниями служат тяжелая миастения, метастазирующий рак, дивертикулит, свежие кишечные анастомозы, яз-

венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертоническая болезнь, синдром Иценко-Кушинга, почечная недостаточность, хронический нефрит, склонность к тромбоэмболии, тромбофлебиты, остеопороз, сахарный диабет, беременность (особенно в первые 3 мес). Детям от 6 до 12 лет назначают в исключительных случаях, детям до 6 лет не назначают.

КЕТАЗОН (Ketason). Синоним: кетофенилбутазон, кебузоне. Предупреждает тяжелые осложнения подагры в тканях и сосудах, снижая концентрацию мочевой кислоты в крови и увеличивая ее выделение почками. Применяют при подагре во всех стадиях и формах. Для лечения хронических форм - 1-2 драже в день или через день в течение нескольких недель, при регулярном контроле гемограммы. Купирование острого приступа производят в/м инъекцией содержимого 1-2 ампул препарата в день, при менее острых формах назначают 4-6 драже в день до исчезновения сильных болей и отеков. Во время длительного приема кетазона ограничивают прием хлористого натрия и рекомендуют минеральные воды, содержащие литий (для предупреждения почечных колик в результате мощного урикозурического действия). Ацетилсалициловая кислота значительно ослабляет эффект препарата. Противопоказан

при лейкопении, острой или в стадии обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, сердечной недостаточности, гипертонии, диабете, кахексии, заболеваниях печени и почек. Не назначать одновременно с антикоагулянтами кумаринового ряда, в преклонном возрасте, при беременности.

КЕФЗОЛ (Kefzol). Полусинтетический цефалоспориновый антибиотик. Синоним: Cephazolin. Обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении многих грамположительных, а также ряда грамотрицательных бактерий, некоторых видов протея. Применяют при заболеваниях, вызванных чувствительными к кефзолу микроорганизмами, тяжелых инфекциях дыхательных и мочевых путей, септицемии, эндокардите, медиастините, остеомиелите, раневой инфекции, инфицированных ожогах, перитоните и др. При инфекциях умеренной тяжести в/в или в/м введением 0,5-1 г препарата каждые 6-8 ч. При инфекциях органов дыхания и мочевого тракта достаточна доза 0,5-1 г 2 раза в сутки. При тяжелых инфекциях до 6 г/сут. Для детей доза 25-30 мг (кг.сут) в 2-3 приема, в тяжелых случаях - до 100 мг/кг. Возможны аллергические реакции (зуд, сыпь), иногда повышение температуры тела, лейкопения, эозинофилия, нейтропения, изменение биохимических показателей без клинических призна-

ков повреждения печени или почек, тошнота, рвота, суперинфекция. Противопоказан при аллергических реакциях на антибиотики цефалоспориновой группы, беременности, не назначать недоношенным детям и детям до 1 мес.

КИНИЛЕНТИН (Kinilentin). Синоним: Chinidin bisulfat. Оказывает антиаритмическое действие; уменьшает скорость прохождения ионов натрия и кальция через клеточную мембрану, уменьшает возбудимость миокарда, увеличивает рефрактерный период. Применяют при мерцательной аритмии, пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии, а также частой экстрасистолии и желудочковой тахикардии. Доза подбирается индивидуально. Обычно по 1-3 табл. с интервалом 12 ч. При нарушении функции печени и почек доза должна быть меньше. Для определения переносимости препарата дают разовую дозу 0,1 г. Возможны тошнота, рвота, понос; при передозировке - головная боль, головокружение, шум в ушах, желудочковые экстрасистолы и мерцания, а также асистолия. При повышенной чувствительности к препарату - крапивница, тромбоцитопения, повышение температуры тела. Противопоказан при повышенной чувствительности к препарату, тромбоцитопенической пурпуре, интоксикации дигиталисом и блокаде предсердий, трепе-

тании предсердий (если больной не принимал препараты дигиталиса).

КИСЛОТА БОРНАЯ (*Acidum boricum*). Применяют как антисептическое средство. Наружно водные и спиртовые растворы (2-4%), мазь (5-10%) и присыпки при заболеваниях кожи. Для полоскания полости рта и зева используют водный 2% раствор по 1 ч. л. на стакан воды. Спиртовой раствор (0,5%, 1%, 2%, 3%, 5%,) на 70% этиловом спирте применяют в виде ушных капель по 3-5 капель 2-3 раза в день. Мазь борную 5% применяют при сухости и трещинах кожи (избегать попадания в глаза; в случае попадания удалить тампоном, глаза промыть). Борная кислота противопоказана детям (в том числе новорожденным). Мазь не используют при острых воспалительных заболеваниях участков кожи, покрытых волосами. Растворы борной кислоты не применяют для обработки молочных желез у кормящих матерей.

КЛАФОРАН (*Claforan*). Синоним: цефотаксим. Антибиотик цефалоспоринового ряда, действует на все грамотрицательные бактерии. Применяют при инфекциях дыхательных путей, почек и мочевыводящих путей, сепсисе, менингитах и др. Вводят в/в и в/м. Дозы подбирают индивидуально. Общепринятая доза - 1 г 2 раза в день. При назначении больным с

аллергией к пенициллину необходимо строгое наблюдение после первой инъекции. Возможны кожные высыпания, лихорадка аллергического происхождения. Противопоказан при аллергии к антибиотикам цефалоспоринового ряда.

КЛИМАКТЕРИН (Climacterin). Состав одного драже: эстрадиола бензоата 25 ЕД, сухого порошка из яичника 0,03 г, нитроглицерина 0,0002 г, теобромина 0,025 г, кофеина 0,025 г, фенолфталеина 0,006 г, кальция фосфата 0,004 г. Применяют при климактерических расстройствах внутрь по 1-2 драже 3 раза в день.

КЛИОН-Д (метронидазол) (Klion-D). Состав: 1 вагинальная таблетка содержит 500 мг метронидазола, 150 мг натрия миконазола. Применяют местно для лечения трихомоноза у женщин. В течение 10 дней на ночь вводят глубоко во влагалище 1 табл., смоченную в воде. Возможны головная боль, тошнота. В процессе лечения запрещаются прием алкоголя и половая жизнь. Противопоказан в первые 3 мес беременности.

КЛИОН ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ (Klion) (метронидазол). Для в/в капельного введения. Состав: в 100 мл содержится 500 мг метронидазола. Применяют при инфекциях, вызванных анаэробными бактериями. Может применяться при абсцессах мозга, перитонитах, послеоперацион-

...раневых инфекций. Взрослым и [illegible] старше 12 лет вводят 100 мл в/в ка[illegible] 5 мл/мин [illegible] 8 ч. Скорость введения 5 мл/мин. Курс 7 дней. Для детей до 12 лет ра[illegible] в/в доза составляет 1,5 мл (7,5 мг) ме[illegible]нидазола на 1 кг массы тела. [illegible] мечаются неприятный вкус во рту, [illegible] та, желудочно-кишечные расстройства [illegible]

КЛОМИФЕНЦИТРАТ (Clomife[illegible]ncitras). Синоним: Clostilbegyt. Стиму[illegible]рует выработку гонадотропинов и [illegible]цию; оказывает выраженное антиэстро[illegible]генное действие. Применяют для стимуляции овуляции при ановуляторных расстройствах гипофизарного и гипоталамического происхождения, вторичной аменорее различной этиологии, кроме гиперпролактиновой и яичниковой форм; при андрогенной недостаточности и олигоспермие у мужчин; олигоменорее; постконтрацептивной аменорее и т.д. Дозу и продолжительность лечения определяют индивидуально. У женщин лечение начинают с 5-го дня менструального цикла и проводят на протяжении 5 дней, [illegible] 50 мг (0,05 г) 1 раз в день ([illegible]). При отсутствии эффекта по[illegible]вторяют назначение, проводя 3-5 курсов, увеличивая при этом дозу до 75-100 мг или увеличивая продолжительность курса до 10 дней. Курсовая доза не должна превышать 500 мг. Мужчинам назначают по 50 мг 1-2 раза в день в течение 3-4 мес

под систематическим контролем спермограммы. Возможны гиперстимуляция яичников (боль внизу живота, метеоризм), меноррагия, кистозное увеличение яичников; многоплодная беременность; тошнота, понос, приливы, головокружение, дерматоз, нарушение зрения. При развитии этих явлений прием препарата следует прекратить. У мужчин возможна болезненность в области яичек. Противопоказан при доброкачественных или злокачественных новообразованиях, беременности, заболеваниях нервной системы, печени; кровотечениях, кистах яичников, выпадении функции гипофиза; не назначать лицам, деятельность которых требует повышенного внимания и быстрой реакции

КЛОТРИМАЗОЛ Clotrimasol). Синоним канестен. Высокоактивный антимикробный препарат с широким спектром действия. Применяют при микозах кожи, вызываемых дерматофитами, почкующимися, плесневыми и другими грибами, играющими роль в развитии кожных микозов, а также при трихомонадном кольпите. Втирать или смазывать кисточкой пораженные участки кожи 2-3 раза в день. При дерматомикозах в течение 3-4 нед, при эритразме - 3 нед, при вульвите и баланопостите 1-2 нед. При трихомонадном кольпите канестен вводят по 1 табл. в течение 6 дней глубоко во влага-

[illegible] ны ночь. В первые 3 мес [illegible] препарат назначают с осторожностью.

КЛОФЕЛИН (Clophelinum [illegible]). Синонимы: гемитон, катапресан, [illegible] и др. Оказывает выраженное гипотензивное действие; понижает АД, [illegible] стоту сердечных сокращений, [illegible] седативное действие и понижает внутриглазное давление. Применяют при [illegible] формах артериальной гипертонии и для купирования гипертонических кризов, в глазной практике - больным первичной открытоугольной глаукомой с умеренно повышенным или высоким внутриглазным давлением и стабилизированными зрительными функциями. Внутрь, в/м, подкожно, в/в и в виде инстилляций в глаз. При лечении артериальной гипертонии - внутрь (независимо от приема пищи) или парентерально, а при глаукоме - в виде инстилляций в глаз. Внутрь назначают по 0,000075 г (0,075 мг) 2-4 раза в день. Суточные дозы составляют обычно 0,3-0,45 мг, иногда 1,2-1,5 мг. Продолжительность лечения от нескольких недель до 6-12 мес или больше в зависимости от эффективности и переносимости препарата. В/м и подкожно вводят по 0,5-1,5 мл 0,01% раствора; для в/в введения 0,5-1,5 мл 0,01% раствора разводят в 10-20 мл изотонического раствора натрия хлорида и вводят медленно в течение 3-5 мин. Парентерально препарат

применяют только в условиях стационара или системы скорой помощи. При глаукоме применяют местно в виде инстилляций в глаз 0,125%, 0,25% или 0,5% растворов 2-4 раза в день без миотиков или (при недостаточном эффекте) в комбинации с ними. При стабильном состоянии поля зрения его применяют длительно (месяцы, годы), при отсутствии эффекта в течение первых 1-2 дней препарат отменяют. Возможны сухость во рту, слабость, сонливость, при больших дозах - запор, ортостатический коллапс. В глазной практике 0,25% и 0,5% растворы могут вызвать нежелательное понижение АД и брадикардию. Не назначать лицам, работа которых требует повышенного внимания, быстрой психической и двигательной реакции. В глазной практике противопоказан при резко выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга, артериальной гипотонии.

КОАМИД (Coamidum). Комплексный препарат кобальта и никотинамида. Стимулятор кроветворения, процессов усвоения и преобразования организмом железа. Применяют при гипохромных и гипопластических анемиях под кожу ежедневно по 1 мл 1% раствора (при железодефицитных анемиях одновременно с препаратами железа). Курс 3-4 нед.

КОБАМАМИД (Cobamamid). Природная коферментная форма витамина

В12. Применяют в качестве анаболического средства у новорожденных и детей младшего возраста; при заболеваниях ПНС, при В12-дефицитных анемиях, болезни печени, крови, при хроническом энтероколите. Внутрь или парентерально (в/м, подкожно или в/в). Дозы, частоту введения, продолжительность лечения устанавливают индивидуально.

КОДЕИН (Codeinum). Метилморфин. Аналогичен морфину, но действует слабее; активно тормозит кашлевой центр. Применяют как противокашлевое средство, иногда в комбинации с седативными и снотворными препаратами в качестве успокаивающего средства. Внутрь по 0,01-0,03 г на прием; детям в зависимости от возраста по 0,001-0,0075 г на прием. Высшая разовая доза для взрослых 0,05 г, суточная 0,2 г. Возможны запоры; длительное применение вызывает привыкание и пристрастие ("кодеинизм"). Не назначают детям в возрасте до 2 лет.

КОДЕИНА ФОСФАТ (Codeini phosphas). Синоним: Codeinum phosphoricum. По фармакологическому действию и показаниям к применению аналогичен кодеину, назначают в тех же дозах.

"КОДТЕРПИН" (Codterpinum"). Состав: кодеина 0,015 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г, терпингидрата 0,25 г. Как

противокашлевое средство по 1 табл. 2-3 раза в день.

ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ. Состав: кодеин 0,001 г, натрия гидрокарбонат 0,2 г, солодки корня порошок 0,2 г, термопсиса трава порошок 0,02 г. Применяют как противокашлевое средство по 1 табл. 2-3 раза в день.

КОКАИНА ГИДРОХЛОРИД (Cocaini hydrochloridum). Местно-анестезирующее средство, применяемое для поверхностной анестезии слизистой оболочки и роговицы глаза (1-3 % растворы), слизистых оболочек ротовой полости, носа, гортани (2-5% растворы). Для уменьшения всасывания кокаина и удлинения его анестезирующего действия к его растворам обычно прибавляют раствор адреналина (на 5 мл раствора кокаина 3-5 капель 0,1% раствора адреналина гидрохлорида). Возможны повышение внутриглазного давления, острый приступ глаукомы. Необходима осторожность при бронхоскопии.

КОКАРБОКСИЛАЗА (Cocarboxylasum). Синонимы: тиаминпирофосфат, Diphosphothiamin. Кофермент тиамина. Применяют при ацидозе и прекоматозном состоянии при сахарном диабете; нарушениях сердечно-сосудистой деятельности (изменение сердечного ритма, экстрасистолия, бигеминия, пароксизмаль-

ная тахикардия) и нарушении коронарного кровообращения; инфаркте миокарда. Вводят в/м и в/в; при сердечно-сосудистых заболеваниях разовая доза для взрослых 0,05-0,1 г, суточная 0,05-0,2 г. Курс 15-30 дней. При сахарном диабете суточная доза для взрослых 0,075-1 г. Курс 5-10 дней. Побочные действия и противопоказания те же, что и при введении препаратов тиамина бромида

КОЛИБАКТЕРИН СУХОЙ (Colibacterinum siccum). Высушенная взвесь живых бактерий антагонистически активного штамма кишечной палочки М-17. Применяют при острой дизентерии (при развитии выраженного дисбактериоза кишечника, при сопутствующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта); непереносимости химиотерапевтических препаратов; долечивании реконвалесцентов дизентерии, сальмонеллеза и смешанных кишечных инфекций, постдизентерийном колите, затяжных и хронических формах дизентерии, колитах и энтероколитах, неспецифическом язвенном колите на фоне дисбактериоза, в том числе возникшего в результате длительной антибиотикотерапии; применяют также при нарушении аэробной микрофлоры. Назначают внутрь за 30-40 мин до еды при хроническом колите: 1-2 дозы 2 раза в день детям от 6 мес до 1 года, 2-4 дозы 2 раза в день детям 1-6 лет, 3-5 доз 2

раза в день детям старше 3 лет и взрослым; при неспецифическом язвенном колите: 2 дозы 2 раза в день детям от 6 мес до 1 года, 3-5 доз 2 раза в день детям 1-3 лет, 4-6 доз 2 раза в день детям старше 3 лет и взрослым; при дисбактериозах: 2 дозы 2 раза в день детям от 6 мес до 1 года, 3-4 дозы 2 раза в день детям 1-3 лет, 3-4 дозы 2 раза в день детям старше 3 лет и взрослым. Курс лечения больных острыми формами - не менее 2 нед, в отдельных случаях - 3-4 нед; при постдизентерийном колите и при длительной кишечной дисфункции - не менее 4-6 нед. При неспецифическом язвенном колите, хронических колитах и энтероколитах курс до 1 1/2-2 мес и более. Целесообразно назначать повторные курсы лечения или поддерживающие дозы (половина суточной дозы) в течение 1-1 1/2 мес. Препарат разводят кипяченой водой перед приемом из расчета 1 ч. л. воды на 1 дозу. Таблетки принимают цельными или размельченными, запивая кипяченой водой. Лицам с повышенной кислотностью желудочного сока рекомендуется за 5-10 мин до приема препарата выпить 1/2 стакана минеральной воды (боржом, ессентуки № 4 или № 17) или раствор гидрокарбоната натрия (1/2 ч. л. на стакан воды). Колибактерин в ампулах принимают с

6-месячного, а в таблетках - с 3-летнего возраста. При лечении колибактерином не рекомендуется принимать антибиотики.

КОЛЛАЛИЗИН (Collalysinum). Синонимы: коллагеназа, клостридиопептидаза А. Обладает протеолитической активностью; влияя преимущественно на коллагеновые волокна, способствует расплавлению струпов и некротических тканей. Применяют для профилактики и лечения симблефарона, рубцовых изменений кожи век, конъюнктивы глазного яблока после ожога, при стриктурах слезоотводящих путей, помутнениях роговицы, пластическом иридоциклите, вторичной катаракте, помутнении стекловидного тела, рубцах сетчатки, при травматическом кровоизлиянии в стекловидное тело, а также как средство для лечения рубцовых изменений кожи. Препарат вводят подконъюнктивально, непосредственно в очаг поражения (спайка, рубец, стекловидное тело и т.д.) с помощью электрофореза, фонофореза, а также применяют накожно. Проверяют чувствительность больного к препарату, для чего под конъюнктиву больного глаза вводят 1 КЕ и наблюдают 48 ч, при кожном применении проводят кожные пробы с нанесением раствора коллализина в лечебных дозах на 24 и 48 ч. Возможно развитие язв роговицы, аллергической реакции. Противопоказан при не-

законченном процессе эпителизации роговицы после ожога, сочетании симблефарона с язвой роговицы, наличии дефектов в склере, кровоизлиянии в стекловидное тело менее 1/2 его объема, наличии признаков свертывания крови в стекловидном теле, резко выраженной реакции после введения 1 КЕ.

КОЛЛАРГОЛ (Collargolum). Синоним: серебро коллоидальное. Применяют в качестве антисептического средства при гнойных ранах, хронических циститах, уретритах, гнойных конъюнктивитах, бленнорее, рожистом воспалении, лимфангите, мягком шанкре в виде 0,2-5% растворов и 15% мази.

КОЛХАМИН (Colchaminum). Синонимы: Omain, Colcemid. Алкалоид, выделенный из луковиц безвременника великолепного (Colchicum speciosum Stev.) и безвременника осеннего (Colchicum autumnale L). Обладает антимитотической активностью (блокирует митоз на стадии метафазы) и при парентеральном введении оказывает ингибирующее влияние на рост опухолевой ткани и угнетает кроветворение; при непосредственном контакте с опухолевыми клетками (например, при раке кожи) препарат приводит к их гибели. Применяют при эндофитной и экзофитной форме рака кожи I и II стадии, раке пищевода, желудка (пе-

реходящем на пищевод), в случаях, не подлежащих хирургическому лечению, в комбинации с сарколизином. При раке кожи ежедневно наружно в виде 0,5% мази. Курс лечения 18-25 дней (при эндофитной форме 30-35 дней). При раке пищевода внутрь по 0,006-0,01 г в 2-3 приема через день в зависимости от переносимости препарата больными. На курс обычно 0,05-0,11 г. При комбинированном лечении 0,005-0,006 г колхамина и 0,015 г сарколизина применяют одновременно 3 раза в неделю; ослабленным больным дозы уменьшают. Курс лечения 12-15 приемов в течение 4-5 нед, после чего перерыв на 1-2 мес или применяют препараты в тех же дозах 1-2 раза в неделю. Возможны гиперемия, болезненность и отечность окружающих тканей; при приеме внутрь одновременно с сарколизином - тошнота и рвота; при передозировке колхамина или повышенной чувствительности к нему могут наблюдаться лейкопения, тромбоцитопения, понос, алопеция. Противопоказан при лейкопении, тромбоцитопении и анемии.

КОМПЛИВИТ (Complivitum) - комплекс витаминов с минеральными веществами. Состав одной таблетки: ретинола ацетат (витамин А) 3300 МЕ, тиамина бромид (витамин В1) 0,00129 г или тиамина хлорид 0,001 г, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 0,005 г, рибофла-

вин-мононуклеотид 0,00127 г, цианокобаламин (витамин B12) 12,5 мкг, аскорбиновая кислота (витамин C) 0,05 г, а-токоферола ацетат (витамин E) 0,01 г, никотинамид (витамир PP) 0,0075 г, рутин (витамин P) 0,025 г, пантотенат кальция (витамин B3) 0,005 г, фолиевая кислота (витамин Bc) 0,0001 г, липоевая кислота 0,002 г, железо сульфат 0,02489 г, меди сульфат 0,002946 г, кальция фосфат 0,217 г, кобальта сульфат 0,000477 г, марганца сульфат 0,01096 г, цинка сульфат 0,008795 г, магния фосфат двузамещенный 0,1176 г, магния карбонат основной 0,0722 г, кальция стеарат 0,0057 г. Компенсирует витаминно-минеральную недостаточность, положительно влияет на содержание гемоглобина в крови и другие ее показатели, повышает переносимость физических нагрузок (профессиональных и спортивных), в том числе длительных. Применяют при нарушениях липидного обмена (гиперлипидемия с повышенным содержанием холестерина, β-липопротеидов, триглицеридов) и снижении толерантности к углеводам. Принимают внутрь после еды по 1 табл. 2 раза в день в течение 3-4 нед. Повторный курс через 3-5 мес (доза препарата может быть снижена до 1 табл. в сутки, а длительность перерыва увеличена до 8-10 мест). Противопоказан при индивидуальной непереносимости.

КОНВАФЛАВИН (Convaflavinum). Суммарный флавоноидный препарат из травы ландыша дальневосточного (Convallaria Keiskei Mig.). Оказывает желчегонное действие и обладает спазмолитическими свойствами. Применяют в качестве желчегонного средства при острых и хронических заболеваниях печени и желчных путей (холециститы, [illegible]гиты и др.). Назначают внутрь по 0,0[illegible] г 3 раза в день до еды ежедневно в течение [illegible] 4 нед. При необходимости курс [illegible]ют. При передозировке иногда могут наблюдаться головокружение, расстройство стула, аллергическая сыпь. В этом случае прием конвафлавина следует прекратить.

КОНВУЛЕКС (Convulex). Антиэпилептическое средство нового типа для проведения моно- и комбинированной терапии при всех типах эпилепсии. Применяют при любых видах припадков при различных типах эпилепсии. Среднюю суточную дозу 0,9-1,2 г принимают в 3 приема равными частями. В более тяжелых случаях суточную дозу можно увеличить до 2,4 г. Начальную дозу (0,01 г/кг) еженедельно увеличивают на 0,01 г/кг и постепенно доводят до 0,03 г/кг. Уже в начальный период лечения следует постепенно сокращать дозы других противосудорожных средств, назначаемых одновременно. Возможны тошнота и рвота; иногда наблюдается кратковременная

тромбоцитопения; в редких случаях — выпадение волос. Во время лечения каждые 2 мес контролировать функцию печени и поджелудочной железы и свертываемость крови. При необходимости уменьшить дозу или прекратить лечение. Беременным назначают с осторожностью (особенно в течение первых 40 дней). Противопоказан при повышенной чувствительности к перпарату, геморрагическом диатезе, нарушении функции печени и поджелудочной железы.

КОНТРАЦЕПТИН Т (Contraceptinum T). Состав: хинозола 0,03 г, борной кислоты 0,3 г, танина 0,06 г, жировой основы 1,46 г. Оказывает антисептическое и сперматоцидное действие. Применяют как противозачаточное средство. Вводят во влагалище до полового акта.

КОНТРИКАЛ (Copntrycal). Полипептид, получаемый из легких крупного рогатого скота. Ингибирует активность ряда ферментов (калликреин, трипсин, химопсин, плазмин), образуя с ними неактивные комплексы. Применяют при остром панкреатите и обострении хронического панкреатита, остром панкреонекрозе; для предупреждения панкреатита при операциях на поджелудочной железе и близко расположенных к ней органах. В/в (медленно одномоментно или капельно) 10000-20000 ЕД, при необходимости по 50000 ЕД/сут, внутри-

брюшинно 10000-20000 ЕД. Возможны аллергические реакции.

КОНФЕРОН (Conferon). Состав: капсулы содержат 250 мг сульфата окиси железа и 35 мг диоктилсульфосукцината натрия. Применяют, как и другие препараты железа, при железодефицитных анемиях различной этиологии. Средняя доза для взрослых и подростков по 1—2 капсулы 3 раза в день; детям 3-6 лет — по 1 капсуле 2 раза в день, 7-12 лет — по 1 капсуле 3 раза в день. Капсулы проглатывают (не разжевывая) после еды.

КОНЬКОВА МАЗЬ (Unguentum Koncovi). Утверждены две прописи мази Конькова следующего состава: 1) этакридина 0,3 г, дистиллированной воды 1,5 г, рыбьего жира витаминизированного 35 г, меда пчелиного 65 г; 2) этакридина 0,3 г, рыбьего жира 33,5 г, меда пчелиного 62 г, дегтя березового 3 г, воды дистиллированной 1,2 г. Применяют наружно как антисептическое и ранозаживляющее средство при пиодермии, вялозаживающих ранах, ожогах.

КОРВАЛОЛ (Corvalolum). Состав: этилового эфира-α-бромизовалериановой кислоты 20 г, фенобарбитала натрия 18,26 г, масла мятного 1,4 г, едкого натра (1 н. раствор) 78,62 мл, спирто-водной смеси (спирта 96% 574 мл, воды 442 мл) до 1 л. Применяют при неврозах с повы-

шенной раздражительностью, нерезко выраженных спазмах коронарных сосудов, тахикардии, бессоннице, ранних стадиях гипертонической болезни и спазмах кишечника по 15-20 капель 2-3 раза в день, при тахикардии и спазмах сосудов по 30-40 капель на прием.

КОРГАРД (Corgard). Селективное кардио-β-адреноблокирующее средство. Синоним: надололар оказывает продолжительное отрицательное хронотропное и инотропное действие, снижает интенсивность метаболизма в миокарде, повышает переносимость сердцем физической нагрузки, уменьшает потребность миокарда в кислороде, улучшает почечный кровоток. Применяют при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, аритмиях, мигрени, тиреотоксикозе. При ишемической болезни сердца начальная доза — 40 мг, при гипертонической болезни — 80 мг в сутки. Препарат принимают 1 раз в день по утрам. Если желаемого эффекта не наступает, дозу повышают через неделю после назначения, и у большинства больных она составляет 160 мг. При гипертонии может доходить до 240 мг (с включением в терапию салуретика и вазодилятатора). Возможны желудочно-кишечные расстройства, брадикардия, утомление, холодные конечности, бессонница, парастезии, сухость во рту, головокружение, в отдель-

ных случаях сердечная недостаточность и атриовентрикулярный блок. Противопоказан при бронхиальной астме, синусной брадикардии, атриовентрикулярной блокаде II и III степени, кардиогенном шоке, вторичной недостаточности правого желудочка при легочной гипертензии, застойном пороке сердца.

КОРГЛИКОН (Corglyconum). Очищенный препарат из листьев ландыша майского и его разновидностей. Аналогичен конваллятоксину и строфантину, дает более продолжительный эффект. Применяют при острой и хронической сердечной недостаточности II и III стадии, пароксизмальной тахикардии. В/в медленно по 0,5-1 мл 0,06% раствора в 20 мл 40% раствора глюкозы. Высшая разовая доза для взрослых в вену 1 мл, суточная 2 мл. Побочное действие и противопоказания те же, что и для строфантина.

КОРДАНУМ (Cordanum). Является β-адреноблокатором, уменьшает сократительную способность миокарда и величину сердечного выброса. Применяют при хронической ишемической болезни сердца, нарушении сердечного ритма, гиперкинетическом синдроме сердца, артериальной гипертонии, гипертрофическом субаортальном стенозе. Внутрь по 1 драже (50 мг) 3 раза в сутки, при необходи-

мости дозу увеличивают до 2 драже 3 раза в сутки. Дальнейшее повышение дозы возможно только при соответствующем контроле. Возможны головная боль, чувство жара, тошнота, усталость и головокружение. Противопоказан (абсолютно) при: выраженной сердечной недостаточности и кардиогенном шоке, постгеморрагическом шоке, антриовентрикулярной блокаде II и III степени, шоковом состоянии. Относительно противопоказан при склонности к гипогликемии, метаболическом ацидозе, нарушениях периферического артериального кровообращения, заболеваниях бронхов и легких.

КОРДАРОН (Cordarone). Синонимы: Amiodaronum, Trangorex. Увеличивает коронарный кровоток и уменьшает сопротивление коронарных сосудов, улучшает снабжение кислородом сердечной мышцы, урежает ритм сердечных сокращений при тахикардии и понижает потребность миокарда в кислороде. Применяют при хронической коронарной недостаточности, аритмиях (желудочковая экстрасистолия, фибрилляция предсердий). Лечение начинают с 0,2 г 3 раза в день во время или после еды. Через неделю дозу уменьшают до 0,1 г 3 раза в день или по 0,2 г 2 раза в день. Курс 2-3 нед; повторяют после 1-2-недельного перерыва. Общая продолжительность лечения устанавливается индивидуально. При на-

рушении сердечного ритма препарат вводят в/в. Возможны аллергические кожные высыпания, диспептические явления (тошнота, понос), повышенная раздражительность, эйфория. Длительное применение больших доз препарата, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, может вызвать брадикардию. Противопоказан при брадикардии, в первые 3 мес после перенесенного инфаркта миокарда, при беременности (препарат обладает тератогенным свойством). Необходима осторожность при назначении кордарона больным с нарушением атриовентрикулярной проводимости, при бронхиальной астме.

КОРДИАМИН (Cordiaminum). Синонимы: Nicaethamidum, Nikethamide. Стимулятор ЦНС, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры. Применяют при нарушении сердечной деятельности; сердечной слабости и ослаблении дыхания при инфекционных заболеваниях и в период выздоровления, при шоке, асфиксии, отравлениях и др. Внутрь по 20-30 капель; подкожно, в/м и в/в (медленно) по 0,5-2 мл 2-3 раза в день; при отравлениях в/в (медленно) до 3-5 мл. Высшие дозы: внутрь разовая 60 капель, суточная 180 капель, парентерально разовая 2 мл, суточная 6 мл.

КОРДИГИТ (Cordigitum). Экстракт

из сухих листьев наперстянки пурпуровой, содержащий сумму гликозидов (дигитоксин, гитоксин и др.). Кардиотоническое средство, применяемое при сердечной недостаточности. Внутрь по 0,4-0,8 мг 2-4 раза в день. При передозировке брадикардия, тошнота, экстрасистолия. Противопоказан при острых эндокардитах; необходима осторожность при свежем инфаркте миокарда, нарушениях ритма.

КОРЕБЕРОН (Coreberon). Состав: в одном драже 20 мг фторида натрия. Кореберон способствует укреплению хрупких суставов, стабилизации скелета и уменьшению ломкости костей. Применяют при первичном остеопорозе (постклимактерический, пресенильный, сенильный и идиопатический); для профилактики и лечения стероидного остеопороза; при особых формах локализованных остеопатий; плазмоцитоме и остеолитических костных метастазах. Дозы индивидуальны, предпочтение отдается непрерывному лечению. Обычно назначают при непрерывном лечении по 2 драже 2 раза в день (утром и вечером) после еды в течение 1 года (не менее); при интермиттирующем лечении по 2 драже 2 раза в день в течение 3 мес, затем перерыв 2-3 мес, после чего лечение продолжают. С профилактической целью назначают по 2 драже в сутки после еды. После 2-3-ме-

сничного лечения могут появиться боли в нижних конечностях (преимущественно в суставах), в этом случае предлагается перейти на интермиттирующую схему лечения или отменить препарат. Не рекомендуется назначать в период роста, беременности и лактации, а также при тяжелых нарушениях функции печени и почек.

КОРИНФАР (Corinfar). Синонимы: Adalat, Nifelat. Одно драже содержит 10 мг нифедипина. Коронарорасширяющее средство, применяемое при стенокардии на почве хронической ишемической болезни сердца и для профилактики ее приступов. По 1-2 драже 3 раза в день с перерывом 6-8 ч. При угрожающем приступе стенокардии драже хорошо смачивают слюной или разжевывают с небольшим количеством жидкости и оставляют во рту. Возможно чувство давления в голове, покраснение кожи, усталость, головокружение, что, как правило, не является поводом к отмене препарата. Противопоказан при остром инфаркте миокарда, кардиогенном шоке, беременности.

КОРТИЗОНА АЦЕТАТ (Cortisoni acetas). Синонимы: Adreson, Cortelan. Глюкокортикостероид. Оказывает противовоспалительное, десенсибилизирующее и антиаллергическое действие, обладает противошоковыми и антитоксическими свойствами; тормозит развитие

лимфоидной ткани; обладая иммунодепрессивной активностью, подавляет развитие соединительной ткани, уменьшает проницаемость капилляров; задерживает синтез и ускоряет распад белка. Применяют при коллагенозах, ревматизме, инфекционном неспецифическом полиартрите, бронхиальной астме, остром лимфобластном и миелобластном лейкозе, инфекционном мононуклеозе, нейродермитах, экземах и других кожных заболеваниях, различных аллергических заболеваниях, болезни Аддисона, острой недостаточности коры надпочечников, гемолитической анемии, гломерулонефрите, остром панкреатите, шоке и коллапсе при хирургических вмешательствах; для подавления реакции отторжения при гомотрансплантации органов и тканей. Внутрь в первые дни по 0,1-0,2 г/сут (в 3-4 приема), затем дозу постепенно уменьшают до 0,025 г/сут. При ревматизме на курс лечения 3-4 г. В/м в виде суспензии 0,025-0,05 г 1-2 раза в сутки. Высшая разовая доза для взрослых 0,15 г, суточная 0,3 г. Детям - в зависимости от возраста от 0,0125 до 0,025 г на прием. При продолжительном применении возможны вирильное ожирение, гирсутизм, появление угрей, нарушение менструального цикла, остеопороз, симптомокомплекс Иценко-Кушинга, изъязвление пищеварительного тракта, прободение не-

распознанной язвы, геморрагический панкреатит, гипергликемия, понижение сопротивляемости к инфекциям, повышение свертываемости крови, психические нарушения. Внезапная отмена препарата может вызвать обострение болезни. Противопоказан при тяжелых формах гипертонической болезни, сахарного диабета и болезни Иценко-Кушинга; беременности, недостаточности кровообращения III стадии, остром эндокардите, психозах, нефрите, остеопорозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, недавно перенесенных операциях, сифилисе, активной форме туберкулеза, в старческом возрасте.

КОРТИКОТРОПИН (Corticotropinum). Полипептидный гормон, состоящий из 39 аминокислот. Синонимы: АКТГ, Acton. Стимулятор коры надпочечников; усиливает биосинтез и выделение в кровь кортикостероидных гормонов. Применяют при межуточно-гипофизарной недостаточности, ревматизме, инфекционном неспецифическом полиартрите, подагре, бронхиальной астме, экземе, аллергических заболеваниях и др. В/м 10-30 ЕД 3-4 раза в сутки. Детям при ревматизме в зависимости от возраста: до 1 года по 15-20 ЕД, от 1 года до 6 лет по 20-40 ЕД, от 6 до 14 лет по 40-60 ЕД/сут. Курс лечения (2-5 нед) при необходимости может быть повторен. Возможны задержка

воды в организме, ионов натрия и хлора с развитием отеков и повышением АД; тахикардия, отрицательный азотистый баланс, бессонница, повышенная возбудимость нервной системы, умеренный гирсутизм, нарушение менструального цикла, задержка рубцевания ран и изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, обострения скрытых очагов инфекции, торможение роста у детей. Может развиться сахарный диабет, а у больных, страдающих диабетом, - усиление гипергликемии и кетов; возможны аллергические реакции. Противопоказан при тяжелых формах гипертонической болезни и диабета, болезни Иценко-Кушинга, беременности, недостаточности кровообращения III стадии, остром эндокардите, психозах, нефрите, остеопорозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, недавно перенесенных операциях, сифилисе, активной форме туберкулеза, в старческом возрасте.

КОРТИНЕФФ (Cortineff). Фторгидрокортизон ацетат. Синоним: Флоринеф, Флюорокортизон ацетат. Обладает сильным противовоспалительным (в 7 раз сильнее гидрокортизона) и минералотропным действием. Применяют при первичной недостаточности надпочечников (болезнь Аддисона), вторичной недостаточности надпочечников при поражении гипофиза, мочеполовом синдроме с поте-

рей ионов натрия, местно при аллергическом кератите и аллергическом поражении глаза. Назначают внутрь при первичной недостаточности коры надпочечников по 1/2 табл. вместе с кортизоном (25 мг) в сутки в течение 6 дней или по 1 табл. препарата вместе с кортизоном в течение 3-5 дней в неделю. Дозу в целом принимают либо только утром, или 50% утром, 20% в полдень и 30% - вечером. Возможны нарушения водно-электролитного обмена, задержка натрия, отеки, гипокалиемия, ослабление памяти, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, затруднение в заживлении ран, зуд, гиперпигментация, гипертензия, повышение внутриглазного давления, головные боли, головокружение, нарушение менструации, синдром Кушинга, торможение роста у детей, обострение диабета, психические расстройства, миопатии. Противопоказан при системных микозах, инфекционных болезнях, гнойных поражениях кожи, беременности и кормлении грудью. Осторожно при остром нефрите и вирусных глазных заболеваниях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В ходе применения препарата нельзя делать противооспенную прививку.

"КОРТОМИЦЕТИН" ("Cortomycetinum"). Мазь, содержащая гидрокортизона ацетата 0,5 г, левомицетина 0,2 г, ва-

зелина 22,5 г, вазелинового масла 22,5 г, ланолина 10 г, стеариновую кислоту 3 г, сорбитанолеат 5 г, воду дистиллированную до 100 г. Противовоспалительное, антиаллергическое, противозудное и антимикробное средство, применяемое при воспалительных и аллергических заболеваниях кожи; инфицированных и микробных экземах, нейродермитах, аллергических дерматозах, псориазе, пиодермии. Наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в день. Суточное количество мази 2-3 г. Курс лечения может продолжаться 7-30 дней, обычно 7-10 дней. Возможны зуд, гиперемия, болезненность, обострение кожных заболеваний с островоспалительной реакцией. Противопоказан при туберкулезе, грибковых и вирусных заболевания кожи при наличии язвенных поражений и ран, беременности.

КОТАРНИНА ХЛОРИД (Cotarnini chloridum). Синонимы: Stypticin, Oxystyptin, Styptogen. Оказывает тонизирующее действие на мускулатуру внутренних органов (особенно матки). Применяют при маточных кровотечениях после родов, абортов и др. Внутрь по 0,05 г 3 раза в день. Высшая разовая доза для взрослых 0,1 г, суточная 0,3 г.

КОФЕИН (Coffeinum). Стимулятор

ЦНС. Применяют при угнетении ЦНС, отравлении наркотическими средствами, недостаточности сердечно-сосудистой системы. Внутрь по 0,05-0,1 г 2-3 раза в день. Противопоказан при повышенной возбудимости, бессоннице, выраженной гипертонии, атеросклерозе, органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме, в старческом возрасте.

КОФЕИН-БЕНЗОАТ НАТРИЯ (Coffeinum natrii benzoas). По фармакологическим свойствам аналогичен кофеину и применяется в тех же случаях. Внутрь по 0,1-0,2 г 2-3 раза в день, подкожно по 1-2 мл 10% раствора.

"КОФЕТАМИН" ("Coffetaminum"). Состав: кофеина 0,1 г, эрготамина тартрата 0,001 г. Применяют при вазопаралитической форме мигрени, артериальной гипотонии, а также в качестве средства, понижающего внутричерепное давление при сосудистых, травматических и инфекционных поражениях ЦНС. Внутрь по 1-2 табл. во время приступа головной боли 2 раза в день, затем по 1 табл. 2-3 раза в день в течение нескольких дней (до 1 мес).

КОФИЦИЛ (Cophicylum). Таблетки состава: ацетилсалициловой кислоты 0,3 г, фенацетина 0,1 г, кофеина 0,05 г. Оказывает болеутоляющее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Применяют при головной и зубной боли, невралгии, артралгии, миалгии, подагре, неревматическом артрите, простудных заболеваниях. Внутрь во время или после еды по 1-2 табл. запивая водой. Суточная доза 3-6 табл. Детям от 2 до 10 лет разовая доза 1/4 табл., старше 10 лет - 1/2 табл. При передозировке или длительном применении возможны тошнота, рвота, боль в животе, анорексия, шум в ушах, ослабление слуха и зрения, диплопия, изъязвление слизистой оболочки желудка и кровотечение из нее, аллергические реакции. При появлении побочных явлений и осложнений препарат следует отменить. Противопоказан при пониженном свертывании крови, кровотечении из легких, желудка, матки и других органов, гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, идиосинкразии, бронхиальной астме и других аллергических заболеваниях, беременности, детям до 2 лет. Препарат не рекомендуется применять при бессоннице, гипертонии, атеросклерозе, органических болезнях сердечно-сосудистой системы, в старческом возрасте, при глаукоме.

КРАПИВЫ ЛИСТ (*Folium Urticae*). Содержит витамин К, витамин B2, пантотеновую кислоту, каротиноиды (β-каротин, ксантофилл, ксантофилл эпоксид, виолаксантин), витамин С, дубильные

вещества, органические кислоты. Применяют как кровоостанавливающее средство (маточные, кишечные, почечные и легочные кровотечения) и источник витаминов в виде настоя (10,0:200,0-15,0:200,0) по 1 ст. л. или по 25-30 капель жидкого экстракта 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

КРАСАВКИ ПРЕПАРАТЫ (Praeparata Belladonnae). По свойствам аналогичны атропину и оказывают спазмолитическое и болеутоляющее действие. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни и других заболеваниях, сопровождающихся спазмами гладкой мускулатуры, брадикардии, вызванной перевозбуждением n. vagus и др. Внутрь в виде настойки по 5-10 капель (детям 1-5 капель) на прием; в виде экстракта (в суппозиториях, пилюлях, микстурах, порошках) по 0,015-0,02 г на прием, а также в виде комплексных таблеток с натрия гидрокарбонатом и фенилсалицилатом. Возможны сухость во рту, головокружение, парез аккомодации, тахикардия. Противопоказан при глаукоме.

КРИЗАНОЛ (Chrysanolum). Смесь кальциевой и натриевой солей 1-ауротио-пропанол-2-сульфоновой кислоты с глюконатом кальция, суспензированная в персиковом масле. Содержит от 33,5 до

35% золота. Применяют при ревматоидном артрите в/м 1 раз в неделю. Разовая доза 1 мл 5% взвеси соответствует 17 мг металлического золота. Курс 58-60 инъекций. Возможны дерматиты, диарея, снижение уровня гемоглобина и уменьшение числа лейкоцитов в крови, альбуминурия и гематурия. Противопоказан при суставно-висцеральных и "септических" формах ревматоидного артрита, лихорадке, значительном похудании, анемии, системной красной волчанке и других коллагенозах, заболеваниях почек и печени, обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, склонности к аллергическим заболеваниям.

КРИСТЕПИН (Cristepin). Состав одного драже: метансульфонат дигидроэргокристина 0,58 мг, клопамид 5 мг, резерпин 0,1 мг. Синоним: бринердин. Оказывает синергическое влияние на АД. Применяют при всех формах гипертензии: эссенциальной, почечной, кардиоваскулярной, эндокринной, нейрогенной. По 1 драже в день (в тяжелых случаях - 2-3 драже в день). При длительном лечении больных гипертонической болезнью по 1 драже в день, иногда 1 драже в 2 дня. Возможны чувство усталости, головокружение, сухость во рту, головная боль.

...та. Применяют при ревматоид-
...те в/м 1 раз в неделю. Разовая
5%... соответствует 17 мг
... Курс 58-60 инъ-
...матиты, диарея,
...глобина и умень-
...тов в крови, альбу-
...рия. Противопоказан
...еральных и "септиче-
...евматоидного артрита,
...ачительном похудании,
...емной красной волчанке и
...ллагенозах, заболеваниях
...ни, обострении язвенной бо-
...дка и двенадцатиперстной
...нности к аллергическим за-

...ПИН (Cristepin). Состав од-
...етансульфонат дигидроэр-
...58 мг, клопамид 5 мг, ре-
... Синоним: бринердин. Ока-
...ческое влияние на АД.
...и всех формах гипертен-
...ной, почечной, кардиова-
...окринной, нейрогенной
...нь (в тяжелых случаях -
...). При длительном лече-
...пертонической болезнью
..., иногда 1 драже в 2 дня
...во усталости, головокру-
...рту, головная боль.

КРОВОХЛЕБКИ КОРНЕВИЩЕ И КОРНИ (Rhizoma et radix Sanguisorbae). Содержат дубильные вещества (12-20%) с преобладанием пирогалловой группы; крахмал. Применяют в качестве вяжущего и кровоостанавливающего средства при кишечных заболеваниях, поносах и внутренних кровотечениях в виде отвара (1 ст. л. на стакан кипящей воды) по 1 ст. л. 5-6 раз в день.

КРУШИНЫ КОРА (Cortex Frangulae). Содержит свободные и связанные антраценпроизводные, глюкофрангулорозид, реоэмодинантранол, франгулоэмодин, хризофанол, франгулин. Применяют как слабительное средство при хронических запорах в виде отвара (20,0:200,0) по 1/2 стакана жидкого экстракта по 20-40 капель или сухого экстракта по 0,2-0,4 г на прием.

КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ (Xantinoli nicotinas). Синонимы: теоникол, компламин, ксавин и др. Расширяет периферические сосуды, улучшает коллатеральное кровообращение, усиливает окислительное фосфорилирование и синтез АТФ. Применяют при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей, болезни Рейно, острых артериальных тромбозах, диабетической ангиопатии, ретинопатии, остром тромбофлебите поверхностных и глубо-

ких вен и посттромбофлебитическом синдроме, трофических язвах нижних конечностей, синдроме Меньера, дерматитах, для усиления мозгового кровообращения. Внутрь, в/м или в/в. В таблетках по 0,15 г 3 раза в день, при необходимости до 0,3-0,6 г 3 раза в день. (после еды, не разжевывая). Курс не менее 2 мес. В/м по 0,3 г (2 мл 15% раствора) 1-3 раза в сутки с постепенным увеличением дозы до 0,6-0,9 г (4-6 мл 15% раствора) 2-3 раза в сутки. Длительность лечения 2-3 нед. При острой закупорке кровеносных сосудов или кровоизлиянии в мозг - в/в струйно (очень медленно) по 0,3 г 1-2 раза в день в течение 5-10 дней. Можно вводить в/в капельно со скоростью 40-50 капель в минуту в течение 1 1/2-4 ч до 4 раз в сутки, длительность курса 5-10 дней. Возможны головокружение, жар, покалывание и покраснение кожи верхней части тела, особенно головы и шеи. Противопоказан при сердечной недостаточности II-III стадии, остром инфаркте миокарда, острых геморрагиях.

КУКУРУЗНЫЕ РЫЛЬЦА (Stigmata Maydis). Содержат ситостерол, стигмастерол, жирные масла, эфирное масло, сапонины, витамины К и С, горькое гликозидное вещество, камедеподобное и другие вещества. Применяют как желчегонное, мочегонное и кровоостанавливающее средство при холециститах, холангитах, гепатитах, крово-

течении (особенно при гипопротромбинемии). Внутрь перед едой в виде настоя (10,0:200,0) по 1-3 ст. л. через 3-4 ч; экстракт по 30-40 капель 2-3 раза в день.

КУПРЕНИЛ (Cuprenil). Синоним: D-Penicillaminum. Применяют при гепатолентикулярной дегенерации, цистинурии, макроглобулинемии, ревматоидных артритах, отравлениях солями тяжелых металлов (свинец, ртуть и др.), в том числе профессиональных. Внутрь 1-1,5 г (в 3-4 приема) ежедневно, при гепатолентикулярной дегенерации до 4 г в день одновременно с препаратами калия; рекомендуется диета, обедненная микроэлементами меди. Возможны аллергические реакции (дерматозы, отек Квинке), диспептические явления; при длительном применении - тромбоцитопения, лейкопения, в редких случаях - альбуминурия. Противопоказан при повышенной чувствительности к пенициллину, заболеваниях почек с нарушением выделительной функции.

КУРАНТИЛ (Curantil). Синоним: Persantin. Коронарорасширяющее средство, применяемое при хронической коронарной недостаточности. Внутрь по 0,0125-0,025 г 3-6 раз в день; в/м или в/в 1-2 мл 0,5% раствора.

ЛАГОХИЛУС ОПЬЯНЯЮЩИЙ (Lagochilus inebrians). Надземные части

содержат лагохиллин, эфирное масло, дубильные вещества и каротин. Ускоряет свертывание крови и оказывает седативное действие. Применяют при кровотечениях при геморрагических диатезах, маточных, геморроидальных, носовых и других, для предупреждения повышенной кровоточивости при хирургических операциях; внутрь взрослым по 1 ч. л. настойки в 1/2 стакана воды или по 1 табл. 3-4 раза в день. По 25-30 капель настойки 2-3 раза в день (до еды), или по 1 табл. 2-3 раза в день. Возможны послабляющее действие, тошнота, учащение пульса, сонливость. Противопоказан в тех же случаях, что и другие кровоостанавливающие средства.

ЛАКТИН (*Lactinum*). Лактогенный гормон передней доли гипофиза крупного и мелкого рогатого скота. Применяют для усиления лактации при гиполактации в послеродовом периоде. В/м по 70-100 ЕД (в 2-4 мл стерильной дистиллированной воды). Курс 5-6 дней. Противопоказан при склонности к аллергическим реакциям.

ЛАКТОБАКТЕРИН СУХОЙ (*Lactobacterinum siccum*). Высушенная микробная масса живых лактобактерий. Обладает антагонистической активностью в отношении шигелл, энтеропатогенных эшерихий, гемолитического стафилококка и протея. Применяют при ос-

рых кишечных инфекциях (острая дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз, вирусная диарея), дисбактериозе кишечника, хронических энтероколитах, неспецифическом язвенном колите; кишечных дисфункциях на фоне дисбактериоза разной этиологии; для санации половых путей при воспалительных заболеваниях и и предродовой подготовке беременных "группы риска" с нарушением чистоты вагинального секрета до III-IV степени. При кишечных заболеваниях внутрь за 30-40 мин до еды детям до 6 мес - 1 доза 3 раза в день, от 6 мес до 1 года - 1 доза 2-3 раза в день, от 1 года до 3 лет - 2 дозы 2 раза в день, старше 3 лет и взрослых 2-5 доз 2 раза в день. При неспецифическом язвенном колите от 5 до 10 доз 2-3 раза в день. Курс при острых формах не менее 2 нед, в отдельных случаях - 3-4 нед; при постдизентерийном колите и при длительной кишечной дисфункции - не менее 4-6 нед; при неспецифических язвенных колитах, хронических колитах и энтероколитах - до 1 1/2 мес и более. При необходимости можно назначать повторные курсы лечения или поддерживающие дозы (половина суточной дозы) в течение 1-1 1/2 мес и более. В акушерско-гинекологической практике - интравагинально по 5-6 доз 1 раз в день в течение 5-8 дней. Можно сочетать с назначением антибиотиков. Препарат разводят кипя-

ченой водой перед применением из расчета 1 ч. л. воды на 1 дозу. Таблетки применяют цельными или размельченными, запивая кипяченой водой.

ЛАМИНАРИД (Laminaridum). Получают из морской капусты. Применяют в качестве слабительного средства при хронических запорах с выраженными спазмами кишечника. Внутрь после еды по 5-10 г (1-2 ч. л. 1-3 раза в сутки, запивая 1/4-1/2 стакана воды.

ЛАНДЫША НАСТОЙКИ (Tinctura Convallariae). Спиртовое извлечение 1:10 на 70% спирте из травы ландыша. Применяют при неврозах сердца, нарушениях сердечной деятельности (без нарушения компенсации), в том числе в сочетании с настойкой валерианы, натрия бромидом. Взрослым по 15-20 капель 2-3 раза в день.

ЛАНТОЗИД (Lantosidum). Новогаленовый препарат, получаемый из листьев наперстянки шерстистой (Digitalis lanata). Применяют при хронической недостаточности кровообращения I-III стадии, сопровождающейся тахикардией, тахиаритмией и мерцанием предсердий. Внутрь по 15-20 капель 2-3 раза в день; при диспептических явлениях микроклизмы: 20-30 капель в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида. Высшая

разовая доза для взрослых внутрь 25 капель, суточная 75 капель.

ЛАПЧАТКИ КОРНЕВИЩЕ (Rhizoma Tormentillae). (Корневище калгана, корневище дубровки, корневище узика). Содержит дубильные вещества (15-30%). Применяют в качестве вяжущего и противовоспалительного средства при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (поносы), воспалительных процессах в полости рта (стоматиты, гингивиты) в виде отвара (10,0:200,0) внутрь по 1 ст. л. 3 раза в день; наружно полоскание и смазывание ротовой полости.

ЛЕВЗЕИ ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ (Extractum Leuzeae carthamoidis fluidum). Применяют как средство, возбуждающее ЦНС, повышающее работоспособность при физическом и умственном утомлении, по 20-30 капель 2-3 раза в день.

"ЛЕВОВИНИЗОЛЬ" АЭРОЗОЛЬ ("Laevovinisolum" aerosolum). Состав: левомицетина 0,136 г, винилина 13,5 г, линетола 13,4 г, спирта этилового 95% 2,9 г, цитраля 0,1 г, пропеллента до 60 г. Антимикробное и противовоспалительное средство, применяемое при поверхностных и ограниченных глубоких ожогах, пролежнях, трофических язвах, инфицированных ранах (площадью не более 20 кв см2). Распыляют по пораженной по-

верхности с расстояния 20-30 см 2-3 раза в неделю (при тяжелых поражениях 1-2 раза в день). Остерегаться попадания в глаза. Противопоказан при обширных гранулирующих ранах, непереносимости левомицетина. Возможно скоропроходящее ощущение жжения.

ЛЕВОМЕКОЛЬ (Laevomecolum). Комбинированный препарат состава: левомицетин 0,75 г, метилурацил 4 г, полиэтиленоксид-400 76,2 г, полиэтиленоксид-1500 19,05 г. Оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и антимикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микробов: стафилококков, синегнойных палочек, эшерихий. Без повреждения биологических мембран проникает в глубь тканей. Применяют при гнойных ранах, инфицированных смешанной флорой, в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки и рыхло заполняют рану. Перевязки проводят ежедневно до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. В гнойные полости вводят через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца, предварительно подогрев до 35-36 С. Возможны аллергические реакции (кожные высыпания). Противопоказан при индивидуальной повышенной чувствительности к левомицетину.

ЛЕВОМИЦЕТИН (Laevomycetinum). Синонимы: Biophenicol, Chloramphenicolum. Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микробов, риккетсий, спирохет и некоторых крупных вирусов; действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллину, стептомицину, сульфаниламидам. Применяют при брюшном тифе и паратифе, дизентерии, бруцеллезе, туляремии, коклюше, пневмонии, гонорее, трахоме, пситтакозе и других инфекционных болезнях. Внутрь за 20-30 мин до еды по 0,25-0,75 г 3-4 раза в сутки; разовая доза для детей до 3 лет 10-15 мг/кг, от 3 до 8 лет - 0,15-0,2 г, старше 8 лет - 0,2-0,3 г 3-4 раза в сутки. Курс лечения 7-10 дней. При упорной рвоте препарат назначают в суппозиториях, дозу при этом увеличивают в 1 1/2 раза. Возможны диспептические явления, раздражение слизистой оболочки полости рта и зева, кожные сыпи, дерматиты, изменения крови (лейкопения или агранулоцитоз, апластическая или гипопластическая анемия); при длительном применении грибковые поражения кожи и слизистых оболочек. Противопоказан при псориазе, грибковых заболеваниях, повышенной чувствительности к препарату.

ЛЕВОМИЦЕТИНА СТЕАРАТ (Laevomycetini stearas). Синоним:

Eulaevomycetin. В желудочно-кишечном тракте омыляется с образованием левомицетина. Применяют в детской практике, когда введение левомицетина затруднено из-за горького вкуса. Внутрь 3-4 раза в день; взрослым обычно по 1 г на прием; детям до 3 лет из расчета 0,02 г/кг, от 3 до 8 лет по 0,3-0,4 г на прием, от 8 лет и старше по 0,4-0,6 г на прием.

ЛЕВОМИЦЕТИНА СУКЦИНАТ НАТРИЯ (Laevomycetinum natrii succinas). Синоним: Chlorocid C. Показания к применению те же, что и для левомицетина. Парентерально (в/в, в/м и подкожно) 2-3 раза в сутки по 0,5-1 г. Детям в/м в суточной дозе: до 1 года из расчета 25 мг/кг, старше 1 года 50 мг/кг 2 раза в сутки с интервалом 12 ч.

ЛЕВОПА (Levopa). Синонимы: L-Dopa, Dopaflex, Levodopa. Устраняет или значительно уменьшает акинезию, в меньшей степени влияя на ригидность. Применяют при болезни Паркинсона, паркинсонизме. Внутрь после еды, начиная с 0,25 г с постепенным повышением дозы в течение 6-8 нед до 4-6 г (в 3-4 приема). Высшая суточная доза 8 г. Возможны тошнота, рвота, потеря аппетита, ортостатическая гипотония, аритмия, покраснение лица, повышенная возбудимость нервной системы или депрессия, тремор. Противопоказан при идиосинк-

разин к препарату, выраженных наруше-
ниях функции печени и почек, функции
желез внутренней секреции, декомпенса-
ции сердечно-сосудистой системы. Нель-
зя применять детям до 12 лет и женщи-
нам в период лактации.

ЛЕВОРИН (Levorinum). Антибиотик,
продуцируемый Streptomyces levoris
Krass. Активен в отношении дрожжепо-
добных грибов (в частности, рода
Candida) и некоторых простейших
(Trichomonas vaginalis). Применяют при
трихомонозе половых органов, заболева-
ниях, вызываемых дрожжеподобным
грибом Candida (кандиоз желудочно-ки-
шечного тракта, поражения кожных по-
кровов, слизистых оболочек, женских по-
ловых органов); с профилактической
целью при кандиданосительстве. Внутрь
по 400 000-500 000 ЕД 2-3 раза в сутки в
течение 10-12 дней. Детям до 2 лет на-
значают из расчета 25000 ЕД/(кг•сут),
от 2 до 6 лет по 20 000 ЕД/(кг•сут), после
6 лет в разовой дозе 20 000-25 000 ЕД 3-4
раза в день. Местно препарат назначают в
виде 5% мази на ланолиново-вазелино-
вой основе и водных взвесей 1:500. Воз-
можны кашель, повышение температуры.
Внутрь не применяют при заболеваниях
печени, острых желудочно-кишечных за-
болеваниях, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки; водные сус-
пензии при маточных кровотечениях.

ЛАВОРИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Levorinum-natrium). Показания к применению, противопоказания и побочное действие те же, что и для леворина. Применяют в виде растворов из расчета 20 000 ЕД в 1 мл для полосканий, спринцеваний, смачивания тампонов, клизм 2-3 раза в день. Для ингаляций применяют раствор, приготовленный перед употреблением из расчета 100 000-200 000 ЕД на 5 мл дистиллированной воды. Ингаляции проводят в течение 15-20 мин 1-3 раза в день. Иногда вызывает бронхоспазм. Не применять при бронхиальной астме.

ЛЕВОСИН (Laevosinum). Комбинированный препарат состава: левомицетин 1 г, сульфадиметоксин 4г, метилурацил 4 г, тримекаин 3 г, полиэтиленоксид-1500 17,6 г, полиэтиленоксид-400 до 100 г. Оказывает антимикробное, противовоспалительное (дегидратирующее), некролитическое и обезболивающее действие. Активен в отношении стафилококков и грамотрицательной флоры (эшерихии, протеи и палочки сине-зеленого гноя). Применяют при гнойных ранах в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки и рыхло заполняют рану, перевязки проводят ежедневно до полного очищения раны. В гнойные полости вводят через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца.

предварительно подогретого до 35-36 С. Возможны аллергические реакции в виде кожных высыпаний. Противопоказан при индивидуальной непереносимости препарата или его компонентов.

ЛЕГАЛОН (Legalon). Синонимы: Hepadestal, Silymarin. Гепатотропный препарат. Действующее вещество - силимарин способно стабилизировать мембраны клеток печени и защитить печень от разнообразных вредных воздействий, а также ускорять репаративные процессы в печени на клеточном уровне. Улучшается общее состояние больного в результате активации детоксицирующей функции печени, уменьшает неприятные ощущения, возникающие в процессе пищеварения, повышает аппетит, способствует увеличению массы тела. Применяют при острых и хронических заболеваниях печени, а также для защиты клеток печени при поступлении токсических веществ (цирроз, ожирение, нарушение функции печени при отравлении и т.д.). По 1 драже (0,035 г) 3 раза в день после еды.

ЛЕДИН (Ledinum). Сесквитерпеновый спирт, выделенный из эфирного масла побегов багульника болотного (Ledum palustre L.). Противокашлевой препарат, применяемый при острых и хронических заболеваниях легких и верхних дыхательных путей. Внутрь по 0,05-0,1 г 3-5

раз в сутки, ежедневно в течение 3-10 дней. Возможны аллергические реакции.

ЛЕЙКОГЕН (Leucogenum). Применяют для увеличения числа лейкоцитов в крови при лейкопении, вызванной лучевой и лекарственной терапией. Внутрь по 0,02 г 3-4 раза в день до нормализации лейкоцитарной формулы (5-7 дней; при стойкой лейкопении 2-3 нед и более). Противопоказан при лимфогранулематозе, злокачественных новообразованиях костного мозга.

ЛЕКОЗИМ (Lekozim). Синонимы: Lekopain, Caricaza. Смесь трех протеолитических ферментов (папаин, химопапаин, протеиназа) и муколитического фермента (лизоцим). Применяют в травматологической, нейрохирургической, ортопедической и офтальмологической практике (остеохондроз позвоночника, грыжи межпозвоночного диска, особенно в поясничном отделе, базальные арахноидиты, непроходимость слезных путей, кератиты, помутнения роговицы и стекловидного тела). Применяют в инъекциях под кожу, методами электрофореза (эндоназально и транскутанно, в офтальмологии фокусированный и локальный электрофорез), фонофореза, в виде парабульбарных и интравитреальных инъекций, путем инстилляций, а также в виде глазных капель. При грыже межпозво-

ночного диска раствор вводят непосредственно в диск. Для предупреждения боли проводят премедикацию анальгетиками и кортикостероидами. При введении в ткани глаза или межпозвоночные диски может появиться боль, поэтому перед введением препарата назначают анальгетики и кортикостероидные препараты (с целью премедикации). При повышенной чувствительности, проявляющейся зудом, повышением температуры тела, проводят антигистаминную терапию. Противопоказан при быстро прогрессирующих неврологических расстройствах, беременности, незавершенном росте, недержании кала и мочи; относительно противопоказан при аллергическом диатезе, в травматологической и нейрохирургической практике у детей до 9 лет. Не применяют в/в и в/м.

ЛЕСПЕНЕФРИЛ (Lespenephril). Препарат из стеблей и листьев бобового растения леспедеза головчатая - 70% спиртовая настойка или лиофилизированный экстракт для инъекций. Повышает диурез и увеличивает выделение из организма солей натрия, в меньшей степени калия, уменьшает азотемию при недостаточности почек, содержание холестерина в крови у больных атеросклерозом. Применяют при острых и хронических гиперазотемических нефритах, азотемиях другой этиологии, для лечения и профилак-

...ики атеросклероза. Внутрь по 1-2 ч. л. в день, в более тяжелых случаях - начиная с 2-3 (до 6) ч. л. в день. Для поддерживающей терапии - длительно по 1/2-1 ч. л. через день. В/м или в/в вводят растворенный в прилагаемом растворителе лиофилизированный препарат (в среднем по 4 ампулы в день). .

ЛИБЕКСИН (Libexin). Синонимы: Prenoxdiazin, Tibexin (в 1 табл. 100 мг пренoксдиазина). Противокашлевый препарат. Применяют при остром и хроническом бронхите, опухоли бронхов, бронхиальной астме, гриппе, эмфиземе легких, сухом и экссудативном плеврите, плевропневмонии, инфаркте легкого, спонтанном пневмотораксе, хирургических вмешательствах на плевре. Внутрь взрослым по 0,1 г 3-4 раза в день, в зависимости от возраста - по 0,025-0,05 г (1/4-1/2 табл.) 3-4 раза в день. Таблетку проглатывают, не разжевывая. Противопоказан при обильном образовании секрета в дыхательных путях, особенно в послеоперационный период после ингаляционного наркоза.

ЛИВ-52 (Liv-52). Комплексный препарат, изготовленный из соков и отваров ряда растений. Предотвращает и устраняет нарушения функции печени. Применяют при вирусном и токсических гепатитах, циррозе печени, хроническом

гепатите, расстройстве функции печени у детей и других заболеваниях печени. Препарат также улучшает аппетит, пищеварение, способствует отхождению газов из кишечника, стимулирует рост организма. Взрослым внутрь по 2-3 табл., детям по 1-2 табл. 3-4 раза в день.

"ЛИВИАН" АЭРОЗОЛЬ ("Livianum" aerosolum): Состав: линетола 69,45 г, рыбьего жира 20 г, α-токоферола ацетата 0,01 г, анестезина 2 г, циминаля 0,05 г, масла подсолнечного 2,99 г, масла лаванды 0,5 г, спирта 95% 5 мл. Обладает ранозаживляющим свойством. Применяют при химических и термических ожогах кожи. Распыляют по пораженной поверхности ежедневно или через день в течение 2-10 сут, на гранулирующие раны с гнойным отделяемым накладывают асептическую повязку, орошенную аэрозолем (меняют 1 раз в день).

ЛИДАЗА (Lidasa). Препарат из семенников крупного рогатого скота. Содержит фермент гиалуронидазу. Аналоги: Hyaluronidasum, Hyason, Hylase, Widase). Увеличивает проницаемость тканей и облегчает движение жидкостей в межтканевых пространствах. Применяют при контрактурах суставов, рубцах после ожогов и операций, анкилозирующем спондилоартрите, гематомах; для ускорения всасывания лекарственных ве-

ществ, вводимых под кожу и в/м (местные анестетики, мышечные релаксанты и др.), в офтальмологии при кератитах, рубцах роговицы, ретинопатии. Вводят подкожно в рубцово-измененные ткани или вблизи места поражения по 1 мл ежедневно или через день. На курс 6-15 инъекций. В офтальмологии - инстилляции 0,1 % раствора одновременно с антибактериальной терапией; при ретинопатии под кожу виска, под конъюнктиву и ретробульбарно. Возможны аллергические кожные реакции. Противопоказан при злокачественных новообразованиях, туберкулезе и других инфекционных болезнях и воспалительных процессах.

ЛИДОКАИН 10% ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Lidocain). Применяют только в/м при желудочковых экстрасистолиях и тахикардиях, особенно в острой стадии инфаркта миокарда, а также вызванных интоксикацией препаратами наперстянки. Общая доза не должна превышать 300 мг. Противопоказан при тяжелых функциональных расстройствах печени. Возможны головная боль, головокружение, сонливость.

ЛИЗОЦИМ (Lysocimum) (мукополисахаридаза). Фермент из белка куриного яйца. Антибактериальный препарат. Применяют при хронических септических состояниях и гнойных процессах, ожогах, отморожениях, конъюнктивитах,

эрозиях роговицы, афтозных стоматитах и других инфекционных болезнях. Курс проводят по 150 мг 2 раза в сутки не менее 7 дней, при необходимости — более. Местно в офтальмологической практике в виде инстилляций 0,25% раствора 3-4 раза в день в течение 3-7 дней. Для лечения ожогов, отморожений и гнойных ран накладывают салфетки, смоченные 0,05% раствором.

ЛИКВИРИТОН (Liquiritonum). Содержит сумму флавоноидов из корня солодки. Обладает спазмолитическими, противовоспалительными и умеренными антацидными свойствами. Применяют при обострении и для профилактики язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при хроническом гастрите с сохраненной секреторной функцией желудка, эрозивных гастритах. Внутрь по 0,1-0,2 г 3-4 раза в день за 20-30 мин до еды в течение 4-5 нед; после 10-12 дней перерыва курс повторяют.

ЛИКОРИНА ГИДРОХЛОРИД (Lycorini hydrochloridum). Оказывает бронхолитическое действие, повышает секрецию бронхиальных желез и разжижает мокроту. Применяют при заболеваниях легких и бронхов. Внутрь по 0,1-0,2 мг 3-4 раза в день. При применении больших доз возможна рвота. Противопоказания те же, что и для апоморфина гидрохлорида.

ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО НАСТОЙКА (Tinctura Schizandrae). Настойка (1:5) на 95% спирте из семян лимонника китайского. Применяют как стимулятор ЦНС при физической и умственной усталости, повышенной сонливости, гипотонии по 20-25 капель 2-3 раза в день. Противопоказан при нервном перевозбуждении, гипертонии, нарушении сердечной деятельности.

ЛИНЕТОЛ (Linaetholum). Смесь этиловых эфиров жирных кислот льняного масла. Ранозаживляющее средство, применяемое наружно при лучевых поражениях кожи, химических и термических ожогах.

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (ПО ВИШНЕВСКОМУ) (Linimentum balsamicum Wischnevsky). Синоним: мазь Вишневского. Состав: дегтя 3 г, ксероформа 3 г, масла касторового 94 г. Применяют в качестве антисептического средства при лечении ран, пролежней, язв.

ЛИНИМЕНТ "САНИТАС" (Linimentum "Sanitas"). Состав: метилсалицилата 24 г, масла эвкалиптового 1,2 г, скипидара 3,2 г, камфоры 5 г, сала свиного 33,3 г, вазелина 33,3 г. Применяют наружно для растираний как обезболивающее и противовоспалительное средство при ревматизме, артритах и др.

ЛИНКОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД (Lincomycini hydrochloridum). Антибиотик, продуцируемый Streptomyces lincolniensis. Синонимы: Lincocin, Mycivin. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов; на грамотрицательные бактерии и грибы не действует. Применяют при стафилокковых инфекциях; септических процессах; остеомиелитах, вызванных устойчивыми к пенициллину возбудителями. Внутрь 3-4 раза в сутки по 500 мг, детям 30-40 мг/(кг.сут); в/м взрослым 2-3 раза в сутки по 300-600 мг (2 мл), детям 10-20 мг/(кг.сут); в/в 3 раза по 600 мг растворенного в 250 мл 5% раствора глюкозы в течение 2 ч, детям 10-20 мг/(кг.сут). При пероральным применении возможны осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта (понос); в единичных случаях - лейкопения и повышение содержания билирубина в крови. Противопоказан при нарушениях функции печени и почек.

ЛИОБИЛ (Liobilum). Таблетки содержат 0,2 г лиофилизированной бычьей желчи. Применяют как желчегонное средство при гепатитах, холециститах, а также для усиления секреторной функции поджелудочной железы, расщепления и всасывания жиров в кишечнике и усиления перистальтики кишечника при привычных запорах. Взрослым внутрь по

1-3 табл. 3 раза в день в конце еды. Курс 1-2 мес. Противопоказан при обтурационной желтухе, остром панкреатите.

ЛИПАМИД (Lipamidum). Амид липоевой кислоты. Принимает участие в обменных процессах, обладает гипохолестеринемическим свойством. Применяют в тех случаях и дозах, что и липоевую кислоту (лучше переносится).

ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА (Acidum lipoicum). Синонимы: Acidum thiocticum, Biletan. Принимает участие в регулировании углеводного и липидного обмена, оказывает липотропное влияние, способствует понижению уровня холестерина, улучшает функцию печени, оказывает детоксицирующее действие. Применяют при атеросклерозе, заболеваниях печени (гепатит, цирроз, вирусный гепатит А), диабетическом полиневрите, интоксикациях. Внутрь после еды до 0,025 г 2-4 раза в день. Суточная доза от 0,05 до 1,5 г. Курс (20-30 дней) после месячного перерыва может быть повторен. Парентерально вводят 1-2 мл 0,5% раствора. Возможны диспептические явления, аллергические дерматозы

ЛИПОСТАБИЛ (Lipostabil). Состав: одна капсула содержит "эссенциальные" фосфолипиды. Применяют при гиперлипопротеинемии, гиперхолестеринемии и

гипертриглицеридемии, атеросклерозе, нарушении коронарного, церебрального и периферического кровообращения, [illegible] кардии, состоянии после инфаркта миокарда и инсульта, заболеваниях сосудов, особенно при сахарном диабете, профилактике тромбоэмболии перед операцией. Содержимое ампулы обычно вводят медленно в/в. Внутрь по 2 капсулы липостабила форте, не разжевывая, 3 раза в день перед едой с небольшим количеством воды. Больным атеросклерозом назначают высокие дозы - 1-2 ампулы по 10 мл ежедневно в течение 2-4 нед. Содержимое двух ампул может вводиться одновременно. Дополнительно перед едой 3 раза в день принимают 2 капсулы липостабила форте, не разжевывая, с небольшим количеством воды. Когда состояние больного улучшится, в/в терапию заменяют поддерживающей терапией - 1-2 капсулы липостабила форте 3 раза в день. Курс - не менее 12 нед. Общая продолжительность лечения зависит от состояния больного. В случае жировой эмболии рекомендуется вводить не менее 8-10 мл липостабила в день посредством медленных в/в инъекций дробными дозами в 20-40 мл до улучшения состояния больного. Назначение липостабила не исключает применения обычных мер для лечения жировой эмболии и шокового состояния: восполнения объема крови, при-

менения седативных средств, кислорода, антибиотиков, искусственного питания и т.д.

ЛИПОЦЕРЕБРИН (Lipocerebrinum). Препарат из липоидов мозга убойного скота. Применяют как укрепляющее средство при нервном истощении, неврозах, гипотонии, переутомлении по 1-2 табл. 3 раза в день.

ЛИПЫ ЦВЕТКИ (Flores Tiliae). Содержат эфирное масло (0,05%), флавоновый гликозид гесперидин, гликозид тилиацин, дубильные вещества, слизь, сапонины. Применяют в качестве потогонного и бактерицидного средства при простудных заболеваниях в виде горячего настоя (10,0:200,0) внутрь по 1-2 стакана; наружно для полоскания полости рта и зева.

ЛИТИЯ КАРБОНАТ (Lithii carbonas). Понижает возбудимость ЦНС, оказывает седативное и антиманиакальное действие. Применяют при маниакальном состоянии различного генеза и для профилактики фазнопротекающих психозов. При маниакальных состояниях внутрь, начиная с 0,6 г в день с постепенным повышением дозы в течение 4-5 дней до 1,5-2,1 г в 2-3 приема; с профилактической целью - 0,6-1,2 г/сут под контролем концентрации препарата в крови. Возможны диспептические явления, дискомфорт, мышечная слабость,

тремор рук, адинамия, сонливость, повышенная жажда. Противопоказан при нарушении выделительной функции почек, тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях с декомпенсацией и нарушением проводящей системы сердца. Относительные противопоказания - нарушения функции щитовидной железы.оновый гликозид гесперидин, гликозид тилиацин, дубильные вещества, слизь, сапонины. Применяют в качестве потогенного и бактерицидного средства при простудных заболеваниях в виде горячего настоя (10,0:200,0) внутрь по 1-2 стакана; наружно для полоскания полости рта и зева.

ЛИТИЯ КАРБОНАТ (Lithii carbonas). Понижает возбудимость ЦНС, оказывает седативное и антиманиакальное действие. Применяют при маниакальном состоянии различного генеза и для профилактики фазнопротекающих психозов. При маниакальных состояниях внутрь, начиная с 0,6 г в день с постепенным повышением дозы в течение 4-5 дней до 1,5-2,1 г в 2-3 приема; с профилактической целью - 0,6-1,2 г/сут под контролем концентрации препарата в крови. Возможны диспептические явления, дискомфорт, мышечная слабость, тремор рук, адинамия, сонливость, повышенная жажда. Противопоказан при нарушении выделительной функции почек, тяжелых сердечно-сосудистых заболева-

ниях с декомпенсацией и нарушением проводящей системы сердца. Относительные противопоказания - нарушения функции щитовидной железы.

ЛИТИЯ ОКСИБУТИРАТ (Lithii oxybutyras). Литиевая соль гамма-оксимасляной кислоты. Психотропное средство, оказывает седативное действие. Применяют при гипоманиакальных и маниакальных состояниях различного генеза, психопатии, неврозах, органических и других заболеваниях с рецидивирующими аффективными расстройствами. В/м или внутрь. Доза подбирается индивидуально. Разовая доза с 0,5 до 1 г, суточная 3 г (в 2-3 приема). При выраженной возбудимости вводят в/м 20% раствор до концентрации препарата в крови не ниже 0,4 ммоль/л (0,4 мэкв/л) и не выше 1,4 ммоль/л (1,4 мэкв/л). Такая концентрация обеспечивает профилактический эффект препарата и позволяет предупредить побочное действие. Лечение можно проводить в сочетании с транквилизаторами, нейролептиками и антидепрессантами. Возможны диспептические и дизурические явления, общее недомогание, головокружение, сонливость, мышечная слабость, нестойкий тремор рук, на более поздних этапах лечения - нарушение ритма сердечной деятельности (синусовая тахикардия, экстрасистолия), гиперкинетические расстройства (тремор, ти-

... в редких случаях развит[illegible] дифф[illegible] неспецифическ[illegible] ... Противопоказ[illegible] при нарушении выделительной функ[illegible] ции почек. Длительное лечение [illegible] показано при болезнях [illegible] системы, стойком нарушении кровообращения и ритма сердечной деятельности, аллергии, обменных и [illegible] ных нарушениях, обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, [illegible]

ЛОПРЕСОР (Lopresor) β-адреноблокирующее средство, обладающее кардиоселективным действием. Применяется при гипертензии, стенокардии, нарушениях сердечного ритма, особенно при суправентрикулярной тахикардии. При гипертензии: по 100-200 мг в день в один (утром) или два приема (утром и вечером). При необходимости назначают дополнительно гипотензивное средство (преимущественно диуретические препараты). При стенокардии: по 100-200 мг в день в два приема. При необходимости доза до 400 мг в сутки. Применяется для длительной профилактики заболевания. При нарушениях сердечного ритма: по 100-150 мг в день в два-три приема. При необходимости доза до 300 мг в сутки. Следует с особой осторожностью назначать больным, страдающим метаболическим ацидозом. Передозировка может привести к сильной брадикардии и гипотензии. При передозировке больному на-

значают 1-2 мг атропина сульфата в/в, а также, если необходимо, гипертензивные средства (норадреналин). Можно назначить и 1-5 (10) мг глюкагона. В отдельных случаях, особенно в начале лечения, могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства, расстройства сна и быстрая утомляемость при физических нагрузках. Противопоказан при предсердно-желудочковой блокаде сердца II-III степени, тяжелой брадикардии, сердечной недостаточности, устойчивой к действию препаратов наперстянки, кардиогенном шоке.

ЛОРИНДЕН А (Lorinden A). Мазь, содержащая 0,02% флуметазона пивалата и 3% салициловой кислоты. Обладает локальным противовоспалительным, противоаллергическим и противозудным свойством. Применяют местно 2-3 раза в сут и при хронической экземе; нейродермите, псориазе, плоском и эритематозном лишае, себорейном дерматите. Курс 3-4 дня до полного исчезновения болезненных проявлений. Мазь можно применять в окклюзионной повязке, сменяемой каждые 24-48 ч. Противопоказан при гнойных осложнениях кожных болезней, вирусных кожных болезнях, туберкулезе кожи, сифилитических поражениях кожи, кожных реакциях после вакцинации; аллергии к кортикостероидам. У особенно чувствительных детей могут появиться раздражение и зуд кожи.

ЛОРИНДЕН С (Lorinden C). Ма...
...держащая 0,02% флуметазо...
...и (локакортена) и 3% йодх...
... Оказывает сильное про...
...алительное, бактери...
противогрибковое действие, ...
зуд. Применяют при гнойных к...
...озных, импетиго, бактериальн...
...сти, воспалении кожи и эпид...
...лергических кожных заболевани...
гнойных осложнениях, уртикар...
сыпаниях, детской крапивнице, ...
аллергическом дерматите. Способ приме-
нения, противопоказания, курс лечения
те же, что и у лориндена А. Не рекомен-
дуется применять мазь на широко распро-
странившиеся кожные изменения более 3
нед. При особой чувствительности может
появиться раздражение кожи, зуд, сыпь.

ЛОФЕНАЛ (Lophenalum). Обладает противоопухолевой активностью в дозах, оказывающих слабое угнетающее действие на гемопоэз, особенно на тромбоцитопоэз. Применяют при раке яичников (неоперабельные случаи): после нерадикальных операций, при диссеминации по брюшине с асцитом; метастазах в легкие, сопровождающихся гидротораксом; как дополнительное средство при хроническом лимфолейкозе, лимфогранулематозе, лимфо- и ретикулосаркоматозе. Внутрь после еды 1-2 раза в день от 0,3 до 1,2 г/сут. На курс лечения 9-50 г. Для

поддерживающей терапии 0,3-0,6 г в неделю (под гематологическим контролем не реже 1 раза в неделю в начале лечения и каждые 3-4 дня во второй половине курса). Иногда наблюдатюся потеря аппетита, тошнота, рвота; лейкопения и тромбоцитопения. Противопоказан при значительной анемии, лейкопении и тромбоцитопении; в терминальной стадии болезни, а также при тяжелых сопутствующих заболеваниях.

ЛЬНА СЕМЯ (Semen Lini). Содержит слизь (5-12%), жирное масло (30-48%), белковые вещества (18-33%), гликозид линамарин. Применяют в качестве обволакивающего и смягчающего средства при заболеваниях кишечника в виде слизи, которую готовят ex tempore из 1 части цельного льняного семени и 30 частей горячей воды.

ЛЮДИОМИЛ (Ludiomil). Тетрациклический антидепрессант. Значительно повышает настроение, таким же образом воздействует на чувство страха и возбуждение, психомоторное торможение и физическое недомогание - основной симптом скрытой депрессии. Эффект препарата ощущается очень быстро. Применяют при депрессиях эндогенных - периодических, циклических, поздних - инволюционных, психогенных - реактивных, невротических, депрессиях истоще-

ния, соматогенных, климактерических при других депрессивных состояниях, со-провождающихся чувством страха, [illegible] форией и раздражительностью, [illegible] психосоматических и соматических [illegible] стройствах на фоне чувства тоски, [illegible] ха. Дозу необходимо подбирать [illegible] дуально, учитывая состояние [illegible] После исчезновения симптомов [illegible] попытка уменьшения дозы: ее [illegible] мо перевести на прежний уровень [illegible] усилении симптоматики. Амбулаторно [illegible] раза в день по 25 мг или 1 раз в день (предпочтительно вечером) по 75 мг внутрь в течение нескольких недель. Для больных с выраженной депрессией: 3 раза в день по 50 мг или 1 раз по 150 мг. При необходимости суточную дозу повышают постепенно и дают в 2-3 приема. При в/в капельном вливании суточная доза - 25-150 мг, разбавляемых в 250 мл физиологического раствора или глюкозы. Вводится капельно на протяжении 1,5-2 ч. В случае необходимости - более высокая доза: 75-150 мг в 500 мл указанных растворов на протяжении 2-3 ч. После инфузионной терапии и появления выраженного терапевтического эффекта больного следует перевести на прием препарата внутрь. При в/в инъекциях разовая доза составляет 25-50 мг, разбавляемых до объема соответственно 10 или 20 мл стерильного физиологического раствора

либо дистиллированной воды, и вводится минимум в течение 3 мин. Суточная доза не должна превышать 150 мг. При депрессивных состояниях у стариков и детей назначают по 10 мг 3 раза в день, затем при необходимости разовые дозы постепенно увеличивают до 25 мг. Подросткам доза может быть доведена до уровня взрослых. Капли специально предназначены для детей и стариков: 1 капля - приблизительно 1 мг активного вещества. Капельную суспензию перед употреблением необходимо встряхивать. С осторожностью рекомендуют больным, страдающим тяжелыми заболеваниями печени и почек, глаукомой, расстройствами мочеиспускания. Больным с сердечными заболеваниями требуется регулярный контроль за функцией сердца, ЭКГ и кровяного давления. При повышенной склонности к судорогам лечение должно проводиться с одновременным применением противосудорожных средств. Больным, получавшим ингибитор МАО, людиомил показан лишь после перерыва в лечении (14 дней). При передозировке возможны сонливость, чувство беспокойства, атаксия, судороги, ступор, кома, тахикардия, гипотония, дыхательная депрессия. Иногда отмечаются: усталость, сухость во рту, запор, расстройство зрения или головокружение, в редких случаях - временное понижение кровяного

давления и тахикардия, аллергические кожные реакции, требующие иногда замены терапии. Препарат противопоказан в первые 3 мес беременности. Назначают с осторожностью в период лактации.

ЛЮТЕНУРИН (Lutenurinum). Сумма алкалоидов, содержащихся в корневищах и корнях кубышки желтой. Применяют при трихомонадных урогенитальных заболеваниях, трихомонозах, осложненных грибковой (трибы рода Candida) и бактериальной (грамположительной) флорой. В качестве противозачаточного средства. При трихомонадных инфекциях местно 0,5% линимент или вагинальные суппозитории ежедневно или через день. Первый курс 10-20 дней. Проводят не менее 3 курсов. В качестве противозачаточного средства применяют вагинальные суппозитории или пенообразующие таблетки, которые вводят во влагалище за 5-10 мин до полового сношения. Таблетки перед употреблением смачивают водой. Возможно местное раздражающее действие. Противопоказан при индивидуальной непереносимости.

МАГНИЯ КАРБОНАТ ОСНОВНОЙ (Magnesii subcarbonas). Синоним: магнезия белая. Применяют в качестве антацидного и послабляющего средства, при повышенной кислотности желудочного сока внутрь по 1-3 г (детям 0,5-2 г) 2-3 раза в день; наружно в виде присыпок.

МАГНИЯ ОКИСЬ (Magnesii oxydum). Синоним: магнезия жженая. Применяют как антацидное средство при повышенной кислотности желудочного сока по 0,025-1 г на прием, при отравлении кислотами, как легкое слабительное по 3-5 г на прием.

МАГНИЯ СУЛЬФАТ (Magnesii sulfas). Синонимы: горькая соль, Magnesium sulfuricum. Применяют как успокаивающее, спазмолитическое и противосудорожное средство в/м (иногда при гипертонических кризах в/в медленно) по 5-20 мл 25% раствора; как слабительное внутрь (на ночь или натощак за 30 мин до еды 10-30 г), как желчегонное по 1 ст.л. 20-25% раствора; при отравлениях препарат используют в виде 1% раствора для промывания желудка. Препарат включают в комплекс противоэпилептического лечения (для купирования эпилептического статуса). При парентеральном введении возможно угнетение дыхания.

МАГУРЛИТ (Magurlit). Состав: пиридоксина гидрохлорид 0,008 г, магния цитрат 0,18 г, кислота лимонная 0,27 г, натрия цитрат 0,723 г, калия цитрат 0,794 г. Способствует нейтрализации мочи. Длительное применение препарата приводит к растворению камней, состоящих из мочевой кислоты и оксалата кальция, и предупреждает их образова-

...ние. Применяют для лечения и профи-лактики мочекаменной болезни с образо-ванием уратов. Назначают внутрь. Дозы определяют индивидуально под контро-лем pH мочи перед каждым приемом препарата с помощью индикаторной бу-маги по шкале цветности (величина pH не должна превышать 6,2–6,8). Средняя начальная доза 6–8 г в день в [illegible]: утром 2 г, после обеда 2 г и [illegible]. В отдельных случаях [illegible] наруше-ния функции желудочно-кишечного тракта. Противопоказан при [illegible] ванной щелочной [illegible]. [illegible] больным с нарушением [illegible].

МАДОПАР (Madopar). Содержит в одной капсуле 100 (Мадопар-125) или 200 (Madopar-250) мг леводопы и 25 или 50 мг (соответственно) бенсеразида. Приме-няют при болезни Паркинсона, паркин-сонизме (кроме лекарственного). Первые 2-3 дня "Мадопар-125" назначают по 1 капсуле 1-2 раза в сутки, при необходи-мости повышая суточную дозу на 1 кап-сулу через каждые 2-3 дня. Оптималь-ный эффект обычно наблюдается при до-зе 4-8 капсул "Мадопара-125" (или 3-4 капсулы "Мадопара-250"). Больным, ра-нее лечившимся левопой, мадопар назна-чают в дозе, составляющей 20% от преж-ней дозы левопы (после 12-часового пе-рерыва). Возможны хореиформные и ди-стонические насильственные движения,

мышечные судороги, блефароспазм, тризм, психические нарушения (бредовые расстройства, депрессия, эйфория, деменция), реже – ортостатическая гипотензия, нарушения ритма сердца, иногда головная боль, атаксия, потливость, задержка мочеиспускания, нарушения функции желудочно-кишечного тракта. Противопоказан при идиосинкразии к препарату, выраженных нарушениях функции печени, почек и желез внутренней секреции, декомпенсации сердечно-сосудистой системы, закрытоугольной глаукоме, психических заболеваниях, беременности и в период лактации, детям до 12 лет. Не назначают одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы.

МАЖЕПТИЛ (Majeptil). Синонимы: Cephalin, Thyoproperazin. Нейролептическое средство с относительно слабым седативным, но мощным антипсихотическим действием. Применяют при шизофрении, кататонических, кататоногебефренических состояниях, острых и хронических психозах. Внутрь по 0,005-0,01 г в день с постепенным повышением дозы до 0,1 г/сут, в/м по 1 мл 1% раствора. Возможны экстрапирамидные расстройства. Противопоказан при органических заболеваниях ЦНС.

МАЗЬ ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ (Unguentum contra congelationem). Состав:

настойки стручкового перца (1:5) 7,4 г, кислоты муравьиной 0,3 г, раствора аммиака 25% 1,45 г, масла камфорного 10% 6,2 г, мыла жидкого калийного 1,0 г, масла касторового 1 г, ланолина безводного (или церезина) 1,3 г, спирта этилового 9,45 г, вазелина 71 г. Применяют наружно для профилактики и лечения отморожении.

МАЛИНЫ ПЛОД (Fructus Rubi idaei). Содержит органические кислоты (салициловая, яблочная, лимонная, винная), антоцианы, кумарины, пектиновые вещества, сахар. Применяют в качестве потогонного средства при простудных заболеваниях в виде настоя (20,0:200,0) или чая (2 ст. л. на стакан кипящей воды) внутрь по 2-3 стакана в течение 1-2 ч.

МАНИНИЛ (Maninil). Синоним: Glibenclamid, Maninll, Daonil. Гипогликемическое средство, применяемое при сахарном диабете у лиц старше 40 лет. Внутрь по 0,0025 г 1 раз в день после завтрака, при необходимости дозу увеличивают до 0,005-0,01 г/сут. В отдельных случаях возможны гипогликемические и аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопения, проходящие парезы. Противопоказан при ацидозе, коматозном и прекоматозном состоянии, выраженном нарушении функции печени и почек, в юношеском возрасте.

"МАРЕЛИН" ("Marelinum"). Комбинированный препарат состава: экстракта марены красильной 0,0325 г, экстракта золотарника канадского 0,025 г, экстракта хвоща полевого 0,015 г, келлина 0,0025 г, коргликона 0,000125 г, салициламида 0,035 г, фосфата магния 0,01 г. Оказывает спазмолитическое, диуретическое и противовоспалительное действие. Способствует перемещению или самостоятельному отхождению конкрементов, уменьшает боль при почечной колике, повышает диурез и подкисляет мочу. При нефролитиазе приводит к обильному отхождению кристаллов мочевых солей, слизи и гноя; нормализует солевой обмен. Применяют при фосфатном и оксалатном нефроуролитиазе, в том числе нефролитиазе, осложненном калькулезным пиелонефритом; наличии конкрементов чашечки и почечной лоханки, камней мочеточника различной величины и локализации; состояниях после оперативного удаления почечных камней или их самостоятельного отхождения; солевом диатезе - фосфатурии и оксалурии. Внутрь перед едой по 2-4 табл. 3 раза в день в течение 20-30 дней. Повторные курсы через 1-1 1/2 мес. Больным с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки препарат принимать по 2 табл. 3 раза в день в течение 2-3 мес. Курс лечения повторяют через 4-6 мес. У

больных с воспалительными заболевания-[illegible] желудочно-кишечного тракта [illegible] [illegible] диспептические явления и [illegible] [illegible] болезни. Противопоказан при [illegible] [illegible] и хроническом гломерулонефрите.

МАРЕНЫ КРАСИЛЬНОЙ ЭКС-ТРАКТ СУХОЙ (Extractum [illegible] [illegible] siccum) [illegible] [illegible] ческое и [illegible] [illegible] бует разр[illegible] [illegible] держащих [illegible] [illegible]. Приме[illegible] [illegible] Внутрь по 0,25-0,5 [illegible] 1/2 стак[illegible] [illegible] мочу в [illegible]

МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЛИСТ (Folium Farfarae) Содержит [illegible] [illegible] сиды, дубильные вещества, [illegible] органические кислоты, сапонины, ситостерин. Применяют в качестве отхаркивающего, смягчающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей в виде настоя (5,0:200,0-10,0:200,0) по 1 ст.л. 3-4 раза в день.

МАФЕНИДА АЦЕТАТ (Mafenidi acetas) Антимикробный препарат широкого спектра действия, активен in vitro в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и патогенных анаэробов, возбудителей газовой гангрены. Применяют при инфицированных

ожогах, гнойных ранах, пролежнях и трофических язвах. 10% мазь наносят непосредственно на раневую поверхность, вводят в полости пропитанные мазью тампоны или накладывают на раны салфетки, смазанные слоем мази толщиной 2-3 см. Смену повязок проводят ежедневно или 2-3 раза в неделю. Длительность лечения 1-5 нед. Возможны местное раздражение, жжение, боль в ране. При сильной боли назначают анальгетики. Противопоказан при токсико-аллергических реакциях на мафенид и сульфамидные препараты.

МЕБИКАР (Mebicarum). Оказывает отчетливое транквилизирующее действие, не давая миорелаксирующего и заметного гипнотического эффекта. Применяют при разнообразных невротических и неврозоподобных состояниях, сопровождающихся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью и эмоциональной неустойчивостью, фобиями и т.д.; легких гипоманиакальных и тревожно-бредовых состояниях без грубых нарушений поведения и психомоторного возбуждения; резидуальных состояниях после острых психозов с явлениями аффективной неустойчивости и остаточной продуктивной симптоматикой; хроническом вербальном галлюцинозе органического генеза; неврозоподобных состояниях у больных алкоголизмом в период ре-

миссии. Внутрь по 0,3-1 г 2-3 раза в день. Курс от 2-3 нед до 6 мес и более. Иногда отмечаются слабость, головокружение, редко - аллергические реакции в виде кожного зуда. Противопоказан при индивидуальной непереносимости.

"МЕГОСИН" ("Megosinum"). Назначают взрослым в качестве антигерпетического средства при вирусных заболеваниях кожи, местно на пораженный участок кожи 3 раза в день. Курс 4-6 дней.

МЕДРОТЕСТРОНА ПРОПИОНАТ (Medrotestroni propionas). Синонимы: метилдигидротестостерона пропионат, местерон. Оказывает противоопухолевое действие, но обладает более высокой анаболической и меньшей андрогенной активностью, чем тестостерона пропионат. Применяют при раке молочной железы (даже при далеко зашедшем процессе с метастазами). Назначают больным с сохраненным к началу лечения менструальным циклом или при менопаузе до 5 лет, а также больным, у которых ранее овариальная функция подавлена облучением яичников, андрогенными препаратами или перенесшим овариэктомию. Вводят в/м ежедневно в период активного метастазирования по 0,1 г, при ремиссии по 0,05 г. Лечение длительное: для профилактики рецидивов и метастазов после мастэктомии 2-3 года, при далеко зашед-

шем процессе (IV стадия) на протяжении всей жизни. Возможны гиперкальциемия и гиперкальциурия, острый паренхиматозный гепатит, сопровождающийся желтухой, нарушение сердечной деятельности, явления вирилизации. Противопоказан при острых заболеваниях печени и почек, острых заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, тяжелая форма гипертонической болезни, криз), в терминальной стадии заболевания.

МЕЗАПАМ (*Mezapamum*). Синонимы: Rudotel, Nobrium и др. Дневной транквилизатор, оказывает успокаивающее, анксиолитическое, миорелаксантное, противосудорожное действие. Применяют при неврозах, психопатиях и других нервно-психических расстройствах с неврозоподобными и психопатоподобными нарушениями, сопровождающихся повышенной возбудимостью, раздражительностью, при абстинентном синдроме. Отсутствие выраженных миорелаксантных и гипноседативных свойств позволяет назначать мезапам ослабленным больным и лицам пожилого возраста. Средняя разовая доза для взрослых 0,01-0,02 г, средняя суточная доза 0,03-0,04 г. Высшая суточная доза 0,06-0,07 г. Суточную дозу распределяют на 2-3 приема. Терапевтический эффект проявляется на 8-15-е сутки, после чего переходят

на поддерживающее лечение в индивидуальных дозах. Продолжительность курса не выше 2 мес. Повторный курс можно назначать не менее [illegible] мед. При алкоголизме [illegible] ют в средних суточных [illegible] курсами в течение 1–2 [illegible] приема возможны [illegible] мышечная вялость, [illegible] ординации движений [illegible] цам, работа которых [illegible] ческой и физическ[illegible] кой точности автомати[illegible] движений. Препарат назначают [illegible] отдельных случаях [illegible] аллергические высыпания на коже. Противопоказан при тяжелых формах печеночной и почечной патологии, миастении, беременности, индивидуальной непереносимости.

МЕЗАТОН (Mesatonum). Синонимы: Adrianol, Isophrin. Активно стимулирует α-адренорецепторы, на β-рецепторы сердца оказывает слабое влияние. Расширяет зрачок и понижает внутриглазное давление. Применяют при гипотонии, суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии; в качестве сосудосуживающего и противовоспалительного средства в офтальмологической и оториноларингологической практике. При коллапсе вводят в/в медленно под контролем АД 0,3-1 мл 1% раствора в 40 мл 40% раствора глюкозы. При необходимости дли-

тельного назначения в/в капельно вводят 1-2 мл 1% раствор в 250-500 мл 5% раствора глюкозы. Под кожу или в/м вводят по 0,5-1 мл 1% раствора; внутрь 0,01-0,025 г 2-3 раза в день. В офтальмологии и оториноларингологии применяют 0,25-1% растворы, при глаукоме - 10% раствор в каплях. Возможны головная боль, тошнота (при повышении АД). Противопоказан при выраженном атеросклерозе, гипертонической болезни (за исключением коллапса). Назначать с осторожностью при гипертиреозе, склонности к ангиоспазмам, а также лицам пожилого возраста.

МЕЗИМ-ФОРТЕ (Mezym-forte). Состав: 140 мг панкреатина, 4200 ЕД амилазы, 3500 ЕД липазы и 250 ЕД протеаз. Обеспечивает хорошую перевариваемость жиров, белков и углеводов. Применяют при недостаточной секреторной и переваривающей способности желудка и кишечника (при хронических гастритах, энтероколитах и др.), при хронических панкреатитах, гепатитах, холециститах. Взрослым по 1-3 драже в день (перед приемом пищи).

МЕКСАМИН (Mexaminum). Вызывает сокращение гладкой мускулатуры, сужение кровеносных сосудов, оказывает седативное действие, усиливает эффект снотворных и анальгетиков. Обладает ра-

диозащитной активностью. Применяют для профилактики общей лучевой реакции при лучевой терапии. Внутрь [illegible] г (1 табл.) за 30-40 мин перед каждым сеансом лучевой терапии. При [illegible] переносимости дозу можно увеличить [illegible] 0,1 г. В отдельных случаях [illegible] легкая тошнота, головокружение, [illegible] подложечной области, реже рвота. Противопоказан при сердечно-сосудистой недостаточности, бронхиальной астме, беременности, заболеваниях почек с нарушением их функции.

МЕЛИПРАМИН (Melipramin). Синонимы: Imizinum, Tofranil. Антидепрессант, оказывающий одновременно стимулирующее влияние на ЦНС. Применяют при депрессивных состояниях различной этиологии, особенно протекающих с заторможенностью. Внутрь по 025-0,05 г/сут с последующим увеличением дозы до 0,3 г/сут, в/м 2 мл 1,25% раствора 1-3 раза в сутки. Возможны головокружение, потливость, сердцебиение, сухость во рту, нарушение аккомодации, эозинофилия, лейкоцитоз; при передозировке возбуждение и бессонница. Противопоказан при заболеваниях печени, почек, кроветворных органов, сахарном диабете, выраженном атеросклерозе, глаукоме, аденоме предстательной железы, атонии мочевого пузыря, беременности (первые 3 мес).

МЕЛЛИКТИН (Mellictinum). Курареподобный препарат, по механизму действия на нервно-мышечную проводимость близок к d-тубокурарину. Оказывает умеренное ганглиоблокирующее действие. Применяют при заболеваниях, сопровождающихся повышением мышечного тонуса, пирамидной недостаточности сосудистого и воспалительного характера болезни Паркинсона, постэнцефалитическом паркинсонизме, болезни Литтля и др. Внутрь по 0,02 г 1-5 раз в день. Курс (3-8 нед) через 3-4 мес может быть повторен. Побочное действие и противопоказания те же, что и для d-тубокурарина.

МЕНОВАЗИН (Menovasinum). Состав: ментола 2,5 г, новокаина 1 г, анестезина 1 г, спирта этилового 70% до 100 мл. Местное обезболивающее и противозудное средство. Применяют при миалгиях, невралгиях, атралгиях, зудящих дерматозах. В виде растирания 2-3 раза в день. Возможны головокружение, общая слабость, понижение АД. Противопоказан при повышенной чувствительности к новокаину.

МЕНТОЛ (Mentholum). Успокаивающее и болеутоляющее средство. Наружно при невралгиях, атралгиях, миалгиях в виде 4% раствора или 10% масляной взвеси; при зудящих дерматозах - 0,5% раствор или 1% мазь (ланолиново-вазе-

линовая основа); капли в нос (в смеси с фенилсалицилатом на вазелиновом масле); при мигренях - ментоловые карандаши. Внутрь как успокаивающее средство в сочетании с препаратами красавки, валерианы и др. Противопоказано смазывание носоглотки детям раннего возраста, так как возможно угнетение и остановка дыхания.

МЕПРОБАМАТ (Meprobamatum). Синонимы: Andaxin, Sedanyl. Транквилизатор, оказывает успокаивающее действие на ЦНС, снимает эмоциональную напряженность, тревогу. Применяют при нервно-психических заболеваниях, особенно сопровождающихся чувством страха, тревоги, напряженности, невротических состояниях, декомпенсации психопатий. Внутрь по 0,2-0,4 г 2-3 раза в день, при необходимости дозу увеличивают до 2-3 г/сут. Высшая разовая доза для взрослых 0,8 г, суточная 3 г. В отдельных случаях возможны кожные высыпания, диспептические явления, сонливость, привыкание. Противопоказан при работе, требующей быстрой психической и двигательной реакции, эпилепсии (grand mal).

МЕРКАЗОЛИЛ (Mercazolilum). Синонимы: Methimazole, Thymidazol. Антитиреоидное (тиреостатическое) вещество. Применяют при диффузном токсическом зобе. Внутрь после еды 0,005-0,01 г 3-4 раза в день. По достижении ремисии

(через 3-6 нед) дозу уменьшают каждые 5-10 дней на 0,005-0,01 г и постепенно подбирают минимальные поддерживающие дозы (0,005 г 1 раз в день, через день или 2 раза в 3 дня). Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,01 г, суточная 0,04 г. Возможны лейкопения, тошнота, рвота, нарушение функции печени, зобогенный эффект, медикаментозный гипотиреоз, кожная сыпь, боль в суставах. Противопоказан при беременности, в период лактации, при выраженной лейкопении и гранулоцитопении, узловой форме зоба. Не сочетать с препаратами, вызывающими лейкопению (амидопирин, сульфанидамиды и др.).

МЕРКАПТОПУРИН (Mercaptopurinum). Синонимы: Leukerin, Mercaleukin, Purinethol. Замедляет течение лейкозов, уменьшает количество незрелых форм (гемоцитобласты и лимфобласты). Токсическое действие препарата на организм проявляется в угнетении кровотворения (лейкопения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения) и нарушениях функции желудочно-кишечного тракта; Применяют в комплексе с другими лекарственными средствами при остром лейкозе, обострении хронического миелолейкоза, протекающего по типу острого лейкоза. Внутрь ежедневно по 0,002-0,0025 г/кг в 1 или 3 приема. При хорошей переносимости дозу повышают до 0,005 г/кг. Ле-

чение проводят при тщательном клини-ческом и гематологическом контроле. При повышенной чувствительности к препара-ту наблюдаются лейкопения, [illegible]-пения, тенденция к геморрагиям и [illegible]-тические явления. Противопоказан при заболеваниях, сопровождающихся нару-шением функции печени и почек.

МЕТАЗИД (Methazidum). Высокоак-тивен в отношении микобактерий тубер-кулеза. Применяют при различных фор-мах и локализации туберкулеза. Внутрь по 0,5 г 2 раза в день. Детям из расчета 0,02-0,03 г/(кг.сут) (но не более 1 г/сут) в 2-3 приема. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 1 г, суточная 2 г. В от-дельных случаях возможны те же ослож-нения, что и при применении изониази-да. Противопоказан при органических заболеваниях нервной системы, стено-кардии, декомпенсированном пороке сер-дца, нарушении функции почек нетубер-кулезного характера.

МЕТАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД (Methacyclinum hydrochloridum). Сино-ним: Rondomycin. Антибиотик тетрацик-линового ряда, активен в отношении большинства грамположительных (ста-филококки, пневмококки, стрептококки) и грамотрицательных микроорганизмов (эшерихии, сальмонеллы, шигеллы и др.), а также возбудителей орнитоза,

пситтакоза, трахомы и некоторых простейших. Применяют при сепсисе, подостром септическом эндокардите, ангинах, отитах, инфекциях желче- и мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, гнойных инфекциях кожи и мягких тканей, инфицированных ожогах и ранах, остеомиелите; гинекологических инфекционных заболеваниях, плевритах, острых и хронических бронхитах, острых пневмониях и обострении хронических пневмоний, осложненных бронхоэктазами. Внутрь (во время или после еды) взрослым и детям старше 5 лет. Разовая доза для взрослых 0,3 г, суточная 0,6 г. Детям от 5 до 12 лет назначают из расчета 7,5-10 мг/кг в 2-4 приема. При тяжелых инфекциях дозу увеличивают до 15 мг/(кг.сут). Детям старше 12 лет назначают в те же дозах, что и взрослым. Длительность курса 5-7 дней. Возможны аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства, раздражение слизистых оболочек полости рта; дисбактериоз и кандидозные осложнения, которые предупреждают параллельным назначением нистатина и леворина. При длительном лечении у детей - отложение препарата в зубной эмали и дентиме, а также пигментация зубов. При нарушении функции печени, почек и лейкопении, назначают с осторожностью; не назначают детям до 5 лет и беременным.

МЕТАЦИН (Methacinum). [illegible] ч-холинолитическое средство, [illegible] тельно действующий периф[illegible] холинолитик. Применяют при [illegible] ниях, сопровождающихся [illegible] гладкой мускулатуры (язвенная [illegible] желудка и двенадцатиперстной [illegible], хронический гастрит, почечная и [illegible] ночная колика и др.), в анес[illegible] для уменьшения секреции [illegible] бронхиальных желез и др. Внутрь по 0,002-0,004 г 2-3 раза в день, парэнте- рально по 0,5-2 мл 0,1 [illegible] раствора. Выс- шая разовая доза для взрослых при при- еме внутрь 0,005 г, суточная 0,015 г, парентерально разовая 0,002 г, суточная 0,006 г. При передозировке сухость во рту, запор, затруднение мочеиспускания. Противопоказан при глаукоме.

МЕТЕРАЗИН (Metherazinum). Сино- нимы: Chlorperazin, Stemetil. Активный нейролептический препарат, аналогич- ный аминазину, но оказывает более вы- раженное антипсихотическое действие. Применяют при различных формах ши- зофрении, психических заболеваниях с бредовыми и галлюцинаторными рас- стройствами, некоторых паранойяльных состояниях. Внутрь по 0,025 г/сут с по- следующим увеличением дозы на 0,025 г до получения максимального эффекта. В некоторых случаях доза может быть уве- личена до 0,3-0,4 г/сут. Возможны сон-

ливость, вялость, экстрапирамидные расстройства, иногда лейкопения. Противопоказан при заболеваниях печени и почек с нарушением их функций.

МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ (Methylenum coeruleum). Синонимы: Methylenblau, Methylthionii choridum. Оказывает антисептическое действие, обладает окислительно-восстановительными свойствами. Применяют в качестве антисептического средства при ожогах, пиодермии, фолликулитах и т.д., воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, в качестве антидота при отравлениях цианидами, окисью углерода, сероводородом, нитритами, анилином и его производными. Наружно в виде 1-3% спиртового раствора; при циститах, уретритах (промывания 0,02% водным раствором), а также внутрь по 0,1 г 3-4 раза в день; при отравлениях окисью углерода, синильной кислотой, сероводородом в/в 50-100 мл 1% водного раствора или 1% раствора в 25% растворе глюкозы; при отравлениях нитритами, анилином - в/в 0,1-0,15 мл 1% раствора на 1 кг массы тела.

МЕТИЛМЕТИОНИНСУЛЬФОНИЯ ХЛОРИД (METHYLMETHIONINSULFONII CHLORIDUM). Витамин "U" (Vitaminum U). Оказывает стимулирующее действие при заживлении повреж-

дочной слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите с нормальной, пониженной и повышенной секреторной функцией желудка, гастралгии. Внутрь после еды по 0,05-0,1 г, суточная доза 0,25 г. Курс 30-40 дней. При индивидуальной непереносимости возможны тошнота, рвота, усиление боли, которые исчезают при уменьшении дозы или отмене препарата.

МЕТИЛСАЛИЦИЛАТ (Methylii salicylas). Метиловый эфир салициловой кислоты. Обезболивающее и противовоспалительное средство, применяемое при артритах, ревматизме, радикулите и др. для растираний per se и в смеси с хлороформом.

МЕТИЛТЕСТОСТЕРОН (Methyltestosteronum). Синонимы: Metandren, Stenendiol. Сильный андроген, по активности несколько уступает тестостерона пропионату. Применяют при половом недоразвитии, функциональных нарушениях в половой сфере; климаксе у мужчин и связанных с ним сосудистых и нервных расстройствах; дисфункциональных маточных кровотечениях в преклимактерическом и климактерическом периодах у женщин; раке молочной железы и яичников. Сублингвально по 0,005-0,1 г/сут. Высшая разовая доза 0,05 г, суточная 0,1 г.

Большие дозы у мужчин могут вызвать повышенное половое возбуждение, задержку воды и солей в организме, у женщин явления маскулинизации, головокружение, тошноту. Противопоказан при раке предстательной железы.

МЕТИЛУРАЦИЛ (Methyluracilum). Синоним: Methazil. Ускоряет процессы клеточного размножения и рост в различных тканях и органах при резорбтивном и местном действии. Применяют при алиментарно-токсической алейкии, агранулоцитозе и лейкопении различной этиологии: лучевых поражениях кожи (эпителииты), вяло заживающих ожогах, ранах, переломах костей, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Внутрь во время или после еды 1 г 3-4 раза в день; в отдельных случаях суточную дозу увеличивают до 5-6 г. Детям в соответствии с возрастом. Наружно в виде 5% или 10% мази с антибиотиками (фурацилин, окситетрациклин, синтомицин и др.) и в виде суппозиториев. Противопоказан при лейкемических формах лейкоза (особенно миелоидных).

МЕТИЛЭРГОМЕТРИН (Methylergomet-rinum). В медицинской практике применяют метилэргометрина тартрат. Усиливает сокращение матки. Применяют при гипотонии и атонии матки после родов, кровотечениях в послеродовом пе-

риоде, при кесаревом сечении и аборте
в/м или в/в (в 20 мл 40% раствора глю-
козы) по 0,25-1 мл 0,02% раствора.

МЕТИНДИОН (Methindionum). Про-
тивосудорожное средство, не угнетающее
ЦНС, уменьшает психомоторное возбуж-
дение, улучшает настроение. Применяют
при эпилепсии (grand mal), особенно при
височной форме и эпилепсии травмати-
ческого генеза. Внутрь по 0,25 г через 1
1/2-2 ч 6-7 раз в сутки. При припадках в
ночное время и утром дополнительно на-
значают фенобарбитал (0,05-0,1 г) или
бензонал (0,1-0,2 г). Возможны голово-
кружение, тошнота, тремор пальцев.

МЕТИОНИН (Methioninum). Сино-
нимы: Acimetion, Thiomedon. Поддержи-
вает рост и азотистое равновесие организ-
ма. Применяют для лечения и профилак-
тики токсических поражений печени
(цирроз, хронические отравления и др.);
в педиатрии при дистрофии, вызванной
белковой недостаточностью. Внутрь за
1/2-1 ч до еды по 0,5-1,5 г 3-4 раза в день;
детям в зависимости от возраста от 0,1 до
0,5 г на прием. Курс лечение 10-30 дней.

МЕТИПРЕД (Methypred). Синони-
мы: Medeson, Urbason. Активный глюко-
кортикостероид, применяемый при ал-
лергических заболеваниях (бронхиаль-
ная астма, крапивница и др.), экземе, де-

рматитах, агранулоцитозе, тромбопении, гемолитической анемии и др. Внутрь при бронхиальной астме до 16-40 мг/сут, при хронических полиартритах 6-12 мг/сут, детям из расчета 0,8-1,5 мг/кг в день. В отдельных (тяжелых) случаях взрослым дозу увеличивают до 100 мг/сут; при необходимости вводят суспензию в полость суставов (10-40 мг), в брюшную и плевральную полости (до 100 мг) и подконъюнктивально (до 20 мг). При длительном применении больших доз развивается гиперкортицизм, гирсутизм. Необходима особая осторожность при сахарном диабете. Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулезном менингите.

МЕТИСАЗОН (Methisazonum). Синонимы: Kemoviran, Viruzona. Подавляет репродукцию вирусов оспенной группы, обладает профилактической активностью в отношении вируса натуральной оспы и оказывает благоприятное влияние при лечении поствакцинальных осложнений, а также эффективен при лечении рецидивирующего генитального герпеса. Внутрь ежедневно через 1-1 1/2 ч после еды 2 раза в день в течение 4-6 дней. Разовая доза для взрослых 0,6 г (1,2 г/сут). Детям до 14 лет из расчета 0,01 г/кг на прием 2 раза в сутки в течение 4-6 дней. В отдельных случаях тошнота, рвота, головокружение. В этих случаях уменьша-

ют дозу. Противопоказан при [illegible] ных поражениях печени и [illegible] нических заболеваниях [illegible] кишечного тракта, злокач[illegible] образованиях.

МЕТОТРЕКСАТ ([illegible]um). Синонимы: Methopterine, [illegible]. Структурный аналог и анта[illegible] вой кислоты, оказывает [illegible] вое действие. Применяют в комплексной терапии острых и подострых лейкозов (в основном у детей), хорионэпителиомы матки, рака молочной железы. Внутрь в/м или в/в. При лейкозе детям ежедневно по 2,5-7,5 мг/сут в зависимости от возраста; при показаниях по 20 мг в день ежедневно курсами по 5-6 дней с перерывами 8-10 дней или по 10-15 мг ежедневно или через день, или по 30-40 мг в день 1 раз в 4 дня. Возможны понос, стоматит, язвенные поражения полости рта и кишечника, угнетение кроветворения с кровоточивостью, анемией, вторичной инфекцией. Противопоказан при беременности, заболеваниях печени и почек с выраженным нарушением функции, угнетении кроветворения.

МЕФЕНАМИНОВАЯ КИСЛОТА (Acidum mephenamicum). Синоним: Coslan. Анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее средство. Применяют при ревматизме, ревматоид-

ном артрите, артралгиях, невралгиях и мышечной боли. Внутрь (после еды) взрослым по 0,5 г 3-4 раза в день. При необходимости и хорошей переносимости дозу доводят до 3 г/сут, а после достижения терапевтического эффекта снижают ее до 1 г/сут. Детям в возрасте от 5 до 10 лет назначают по 0,25 г 3-4 раза в день, старше 10 лет - по 0,3 г 3-4 раза в день. Возможны тошнота, понос, боль в животе, аллергические реакции. Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Соблюдать осторожность при назначении препарата больным с заболеваниями кроветворных органов и почек.

МИДАНТАН (Midantanum). Синонимы: Amantadine, Symmetrel. Обладает н-холинолитической активностью, а также оказывает влияние на катехоламиновый обмен. Применяют при паркинсонизме различной этиологии, особенно с ригидно-брадикинетическим синдромом. Внутрь (per se и в комплексе с циклодолом и др.) по 0,1 г 2-4 раза в день в течение 2-4 мес. Возможны раздражительность, бессонница, головокружение. Противопоказан при заболеваниях печени и почек. Необходима осторожность при повышенной возбудимости, в частности при тиреотоксикозе.

МИДОКАЛМ (Mydocalm). Синоним: Mydeton. Подавляет полисинаптические спинномозговые рефлексы и понижает повышенный тонус скелетных мышц. Применяют при заболеваниях, сопровождающихся повышенным мышечным тонусом, в том числе параличах, парезах, параплегиях, травматических контрактурах, экстрапирамидных расстройствах. Внутрь по 0,05 г 3 раза в день с постепенным повышением дозы до 0,45 г/сут, в/м по 1 мл 10% раствора 2 раза в день; в/в (медленно) 1 мл 1 раз в день. Иногда возникает чувство легкого опьянения, головная боль, повышенная раздражительность, нарушение сна.

МИЕЛОБРОМОЛ (Myelobromol). Синоним: Dibrommanit. Противоопухолевое средство, применяемое при хроническом миелолейкозе (особенно при устойчивости к миелосану), эритремии. Внутрь по 0,25 г/сут в течение 3-6 нед с последующим уменьшением дозы до 0,125 г (ежедневно или через день). Затем поддерживающие дозы 8-12 нед по 0,125-0,25 г 1-3 раза в 7-10 дней. На курс 6-7 г препарата, для поддерживающей терапии - 3 г. Возможны расстройства желудочно-кишечного тракта, тромбоцитопения. Противопоказан при геморрагическом диатезе.

МИЕЛОСАН (Myelosanum). Синонимы: Busulfan, Myleran. Цитостатичес-

кое средство, избирательно угнетающее гранулоцитопоэз и оказывающее сильное антилейкемическое действие. Применяют при обострении хронического миелолейкоза (лейкемическая форма). Внутрь в зависимости от формы заболевания (степень спленомегалии, число лейкоцитов) по 2-10 мг/сут в 1-3 приема. Курс 3-5 нед. При рецидиве курс повторяют. При передозировке возможны гранулоцитопения и тромбоцитопения (последняя иногда сопровождается геморрагиями). У больных пожилого возраста иногда отмечаются головокружение и головная боль, боль в области сердца. При длительном применении - аменорея у женщин и снижение потенции у мужчин. Противопоказан при остром лейкозе, обострении хронического миелолейкоза, протекающего по типу острого лейкоза, алейкемических и сублейкемических формах хронического лейкоза.

"МИКОЗОЛОН" МАЗЬ (Unguentum Mycosoloni). 15 г мази содержат 37,5 мг (0,25%) деперзолона и 300 мг (2%) миконазола. Оказывает противовоспалительное, антиаллергическое, противогрибковое и антибактериальное (в отношении грамположительной микрофлоры) действие. Применяют при инфекционных заболеваниях кожи и ногтей, вызванных дерматофитами или грибами; микозах, сопровождающихся су-

перинфекцией грамположительными бактериями. Мазь наносят на пораженную поверхность кожи 1-2 раза в день или применяют в виде окклюзионной повязки до полного излечения (обычно в течение 2-5 нед.). При поражении ногтей необходимо коротко срезать ногти и тщательно втирать мазь в ногтевое ложе 1 раз в день и накладывать окклюзионную повязку. Лечение продолжают и после отслойки ногтя до полной регенерации ногтевой пластинки (2-3 мес от начала лечения). Противопоказан при туберкулезе кожи, герпесе, ветряной оспе.

МИКОСЕПТИН (Mycoseptin). Состав: кислоты ундециленовой 5 г, цинковой соли ундециленовой кислоты 20 г, мазевой основы до 100 г. Обладает фунгистатической и фунгицидной активностью, оказывает антисептическое и легкое подсушивающее действие. Применяют при грибковых заболеваниях кожи (различные формы эпидермофитии, дрожжевые дерматозы). Смазывают пораженные участки кожи 1-2 раза в день. Курс 15-20 дней, затем назначают 1-2 раза в неделю в течение 4-6 нед.

"МИКРОЙОД" ("Microiodum"). Состав: йода 0,0005 г, калия йодида 0,005 г, корня валерианы в порошке 0,05 г, наполнителя до 0,25 г. Применяют при тиреотоксикозах внутрь по 1 драже после

еды 2-3 раза в день. Курс (20 дней) повторяют с 10-20-дневными интервалами.

МИКРОФОЛЛИН-ФОРТЕ (Microfollin forte). Синонимы: Aethinyloestradiol, Follikoral. Эстрогенный гормон, применяемый при заболеваниях, вызванных недостаточной функцией яичников (дисменорея, гипер- и гипоменорея, бесплодие, климактерические расстройства и др.). Внутрь по 0,05-0,1 мг 1-3 раза в день. При назначении больших доз возможны тошнота, рвота, головокружение. Противопоказан при опухолях у женщин до 60 лет, мастопатии, эндометрите, маточных кровотечениях, в гиперэстрогенной фазе климакса.

МИКРОЦИД (Microcidum). Антибактериальный препарат, получаемый из культуральной жидкости одного из видов плесневого гриба Penicillium. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных микробов. Применяют при инфицированных и длительно не заживающих ранах, язвах, ожогах, пролежнях, экземах; абсцессах, флегмонах и других гнойно-воспалительных заболеваниях. Наружно в виде орошений, промываний, для смачивания повязок и тампонов, а также в виде эмульсии с рыбьим жиром.

МИОФЕДРИН (Myofedrin). Синоним: Oxyphedrin hydrochlorid. Повышает снабжение миокарда кровью, увеличива-

ет силу сокращения сердечной мышцы; без повышения потребности в кислороде активизирует обмен веществ в сердечной мышце. Применяют при коронарной недостаточности, стенокардии, инфаркте миокарда, функциональной слабости сердца. По 1/2-1 табл. после еды (начиная терапию с 1/2 табл.) 3 раза в день. Противопоказан при недостаточности аорты с гемодинамическими изменениями, подклапанном стенозе аорты.

МИСКЛЕРОН (Miscleron). Синонимы: Atromidin, Clofibrat. Гипохолестеринемическое средство, применяемое при атеросклерозе и других заболеваниях, сопровождающихся гиперхолестеринемией. Внутрь до еды по 2-3 капсулы 3 раза в день. Возможны диспептические явления, кожные высыпания и зуд. Противопоказан при нарушениях функции печени и почек, беременности.

МИТРОШИНА ЖИДКОСТЬ (Liquor Mitroschini). Продукт, получаемый термической обработкой зерна. Применяют наружно как антисептическое средство при кожных заболеваниях.

МОДИТЕН-ДЕПО (Moditen-Depo). Синонимы: Fluphenazine-depo, Lyogen-depo. Нейролептик пролонгированного действия. Применяют при различных формах шизофрении, особенно с дли-

тельным неблагоприятным течением ("ядерная" шизофрения, параноидная форма), тенденцией к отказу от терапии. В небольших дозах - при вялотекущей шизофрении, особенно с явлениями навязчивости, дисморфофобии, психопатоподобными расстройствами. В/м 12,5-75 мг 1 раз в 2-4 нед. Возможны явления паркинсонизма, тремор, апатия, углубление депрессии.

МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ПЛОДЫ (Fructus Juniperi). (Можжевеловые ягоды). Содержат эфирное масло (0,5-2%), смолу, пектиновые вещества, органические кислоты, сахар. Применяют в качестве диуретического средства при отеках сердечного происхождения в виде настоя (10,0:200,0) по 1 ст. л. 3-4 раза в день. Противопоказан при нефритах, нефрозонефритах.

МОЗОЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ (Liquor ad clavos). Состав: кислоты салициловой 1 г, спирта этилового 95% 1 г, коллодия 8 г, бриллиантового зеленого 0,01 г. Применяют как кератолитическое и антисептическое средство при мозолях.

МОНОМИЦИН (Monomycinum). Выделен из культуральной жидкости Streptomyces circulatus. var. monomycini. Синоним: Catenulin. Обладает широким спектром антимикробного действия: активен в отношении большинства грампо-

ложительных, грамотрицательных микроорганизмов и кислотоустойчивых бактерий.Применяют при гнойно-воспалительных процессах различной локализации; перитонитах, абсцессах легкого и эмпиеме плевры, заболеваниях желчного пузыря и желчных ходов, остеомиелитах, инфекциях мочевыводящих путей, заболеваниях желудочно-кишечного тракта (дизентерия, эшерихиозы); в предоперационном периоде при подготовкее больных к операции на желудочно-кишечном тракте и др. Внутрь по 0,25 г (250 000 ЕД) 4-6 раз в сутки; детям по 10-25 мг/(кг.сут) в 2-3 приема. В/м по 0,25 г (250 000 ЕД) 3 раза в сутки. Детям из расчета 4-5 мг/(кг.сут) в 3 введения. Возможны неврит слухового нерва, нарушение функции почек, диспептические явления (при приеме внутрь). Противопоказан при тяжелых дегенеративных изменениях печени, почек, неврите слухового нерва различной этиологии.

МОРФИНА ГИДРОХЛОРИД (Morphini hydrochloridum). Активный анальгетик, подавляющий все виды болевой чувствительности без выключения сознания и изменения других видов чувствительности. Применяют при болях различной этиологии (травматическая, при новообразованиях, ишемической болезни сердца и др.). Внутрь по 0,01-0,02 г, подкожно по 1 мл 1% раствора; детям

(старше 2 лет) дозы устанавливают соответственно возрасту. Высшая разовая доза для взрослых 0,02 г, суточная 0,05 г. Возможны тошнота, рвота, запор, угнетение дыхания; для уменьшения побочного действия одновременно назначают холинолитические средства (атропин и др.). Противопоказан при дыхательной недостаточности, в старческом возрасте, при общем истощении; при длительном применении возможно развитие наркомании.

МОЧЕВИНА (Urea pro injectionibus). Оказывает мочегонное действие, способствует предупреждению и уменьшению отека мозга, понижает внутриглазное давление. Применяют при повышенном внутриглазном давлении; для предупреждения и уменьшения отека мозга; при глаукоме и других заболеваниях, сопровождающихся повышением внутриглазного давления. В/в капельно в виде 30% раствора на 10% растворе глюкозы из расчета 0,5-1,5 г/кг 1-3 раза в сутки; внутрь 30-50% раствор на сахарном сиропе (0,75-1,5 г/кг). При приеме per os возможны диспептические явления; при в/в введении в отдельных случаях флебиты и тромбоз вен. Противопоказан при выраженном нарушении функции печени, почек и сердечно-сосудистой системы.

МУКАЛТИН (Mucalthinum). Смесь полисахаридов, получаемая из травы ал-

тея лекарственного (Althaea officinalis L.). Отхаркивающее средство, применяемое при заболеваниях дыхательных путей и легких (трахеиты, бронхиты, пневмонии и др.). Внутрь до еды по 0,05-0,1 г на прием 2-3 раза в день.

МУКАРТРИН (Mucartrin). В 1 мл содержится 0,125 г мукартрина. Восстанавливает обменные трофические процессы в суставах и эластичность суставного хряща. Применяют для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний при сравнительно сохранившемся суставном хряще и отсутствии воспалительной реакции, а также для лечения плечелопаточного периартрита. В/м 125-250 мг (1-2 ампулы). Вводят глубоко в мышцу ежедневно в течение первых 3 дней, затем через день в течение следующих 10 дней. Лечение продолжают в той же дозировке по 2 раза в неделю в течение 3 нед, затем 1 раз в неделю до прохождения полного курса (25-30 инъекций). Нельзя применять при сопутствующем воспалительном процессе в суставах и полной деструкции покровного хряща сустава.

МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ (Spiritus formicicus, Spiritus Acidi formici). Состав: кислоты муравьиной 14 г, спирта этилового 70% 986 мл. Применяют как раздражающее кожу средство при миозитах,

невралгиях и других заболеваниях для растираний.

МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЯ (Folium Menthae piperitae). Содержат эфирное масло 1-3%, в состав которого входит ментол (40-70%); эфиры ментола, кетон ментон, флавоноиды; урсоловую и олеаноловую кислоты. Успокаивающее, спазмолитическое и желчегонное средство. Применяют при тошноте, рвоте, спазме гладкой мускулатуры. Внутрь: настой (5,0:200,0) по 1 ст. л. 3-4 раза в день, настойка по 10-15 капель на прием; мятные таблетки по 1-2 сублингвально; масло мяты перечной как освежающее и антисептическое средство в виде полосканий, зубных порошков и паст, а также для исправления вкуса микстур.

НАКОМ (Nacom). Состав: карбидопы 0,025 г, левопы 0,25 г. Синоним: Sinemet. Применяют при болезни Паркинсона, паркинсонизме (кроме лекарственного). Начинают лечение с 1/2 табл. 1-2 раза в сутки, при необходимости повышая ежедневную дозу на 1/2 табл. через 2-3 дня до достижения оптимального эффекта (но не более 8 табл. в сутки). У больных, которые лечились левопой, делают в лечении 12-часовой перерыв и далее назначают наком в дозе, составляющей 20% от прежней дозы левопы. Возможны хореиформные, дистонические

или иные насильственные движения, мышечные судороги, блефароспазм, тризм; реже психические нарушения (бредовые, депрессивные расстройства, признаки деменции), нарушения ритма сердца, ортостатическая гипотензия, тошнота, рвота, головокружение, еще реже - желудочно-кишечные кровотечения, артериальная гипертензия, флебиты, лейкопения, агранулоцитоз. Противопоказан при идиосинкразии к препарату, выраженных нарушениях функции печени, почек и желез внутренней секреции, декомпенсации сердечно-сосудистой системы, закрытоугольной глаукоме, психических заболеваниях, детям до 12 лет, беременным и при лактации. Не назначают одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы.

НАПРОСИН (Naprosyn). Синоним: Naproxen. Нестероидный противоревматический препарат с противовоспалительным, аналгетическим и жаропонижающим действием. Применяют при ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите, остеоартрите, подагре, а также повреждении мягких тканей. Оказывает пролонгированное действие, назначают 2 раза в сутки. Суточная доза - 0,5 г (по 0,25 г утром и вечером). При необходимости суточную дозу увеличивают до 0,75 г). Иногда возникают неприятные ощущения в области верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (давление,

боль, изжога), а также головная боль, головокружение, усиленное потоотделение. Значительно реже появляются высыпания на коже. Не рекомендуется назначать детям до 16 лет, а также больным, у которых в прошлом имели место желудочно-кишечные кровотечения; беременным, женщинам, в период лактации и больным с нарушением функции печени, с сердечной недостаточностью и аллергией на противовоспалительные препараты (особенно на ацетилсалициловую кислоту).

НАТРИЯ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ (Natrii adenosintriphosphas). Участвуют в обмене веществ. Применяют при мышечной дистрофии и атрофии; хронической коронарной недостаточности, дистрофии миокарда; постинфарктном кардиосклерозе; спазмах периферических сосудов. В/м в первые 2-3 дня 1 раз в день по 1 мл 1% раствора, затем 1 раз в день по 2 мл или 2 раза в день по 1 мл 1% раствора. Курс (30-40 инъекций) через 1-2 мес может быть повторен. Возможны головная боль, усиление диуреза, тахикардия. Противопоказан при остром инфаркте миокарда.

НАТРИЯ АРСЕНАТ (Natrii arsenas). Применяют как общеукрепляющее и тонизирующее средство при упадке питания, неврозах, легких формах анемии, псориазе. Подкожно ежедневно, начиная

с 0,2 мл 1% раствора с постепенным повышением дозы до 1 мл. Курс 20-40 дней, при псориазе до 2-3 мес. Высшая разовая доза для взрослых 1 мл 1% раствора, суточная 2 мл 1% раствора. Детям до 2 лет не назначают, старше 2 лет вводят под кожу по 0,0003-0,0015 г. Возможны тошнота, рвота, понос, пигментация кожи. Противопоказан при поражениях почек, нефритах, выраженной анемии, диспептических явлениях.

НАТРИЯ БЕЗОАТ (Natrii benzoas). Применяют как отхаркивающее средство при заболеваниях дыхательных путей (бронхиты и др.) в порошках, растворах и микстурах по 0,2-0,5 г 3-4 раза в день.

НАТРИЯ БРОМИД (Natrii bromidum). Применяют для восстановления равновесия между процессами возбуждения и торможения при повышенной раздражительности, бессоннице, гипертонической болезни. Внутрь по 0,1-1 г 3-4 раза в день, детям (в зависимости от возраста) по 0,05-0,4 г 3 раза в день. При передозировке или плохой переносимости возможны насморк, кашель, слабость, кожные высыпания.

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАНТ (Natrii hydrocarbonas). Синонимы: Natrium bicarbonicum, Sodium bicarbonate. Применяют в качестве антацидного сред-

[illegible]
[illegible] язвенной [illegible]
и двенадцатиперстной [illegible]
при заболеваниях, сопровождающихся
ацидозом (диабет и др.) внутрь по 0,5-1,5 г на прием; как отхаркивающее в составе микстур; для полосканий, промываний и ингаляций при насморке, конъюнктивитах, стоматитах, ларингитах и др. в виде 0,5-2% раствора. В виде суппозиториев против укачивания при морской и воздушной болезни. Противопоказан при состояниях, сопровождающихся развитием метаболического алкалоза.

НАТРИЯ ЙОДИД (Natrii iodidum). Применяют в тех же случаях, что и калий йодид, внутрь по 0,3-1 г 3-4 раза в день; при поздних сифилитических изменениях зрительного нерва и при актиномикозе легких в/в по 5-10 мл 10% раствора через 1-2 дня (всего 8-12 вливаний). Побочное действие и противопоказания те же, что и для других препаратов йода.

НАТРИЯ НУКЛЕИНАТ (Natrii nucleinas). Способствует увеличению числа лейкоцитов в крови. Применяют как средство, стимулирующее лейкопоэз, при лимфопении и агранулоцитозе, а также при нарушениях фосфорного обмена (фосфатурия, рахит и др.). Внутрь (натощак) по 0,1-0,2 г; в/м 5-10 мл 2% или 5% раствора; детям в соответствии с

возрастом. Длительность лечения 10 дней и более в зависимости от течения заболевания.

НАТРИЯ ПАРА-АМИНОКСАЛИЦИЛАТ (Natrii para-aminosalicylas). Синонимы: ПАСК-натрий, Aminacyl, Propasa и др. Обладает бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза. Применяют при различных формах туберкулеза. Внутрь по 3-4 г 3 раза в день, детям по 0,2 г/(кг.сут) (не более 10 г в сут) в 3-4 приема. В/в (капельно) по 250-450 мл 3% раствора 5-6 раз в неделю. Возможны расстройства желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, лихорадочная реакция, астматические явления, эозинофилия. При нарушении техники в/в введения возможен шок. Противопоказан при нефритах, гепатитах, циррозе, амилоидозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, микседеме, декомпенсированном пороке сердца. В/в введение противопоказано при тромбофлебитах, нарушении свертываемости крови.

НАТРИЯ САЛИЦИЛАТ (Natrii salicylas). Синоним: Nadisal. Оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Применяют при ревматизме, экссудативном плеврите, неревматических артритах, подагре, невралгиях, миалгиях по 0,5-1 г 3-6 раз в сутки после еды до 10-12 г/сут;

иногда вводят в/в (медленно) 3-10 мл 10-15% раствора. Возможны тошнота, рвота, понос, боль в животе, анорексия, шум в ушах, снижение слуха и зрения, диплопия, аллергические реакции. Противопоказаны при [illegible]

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ (Natrii thiosulfas). Синоним: Natrium hyposulfurosum. Оказывает противотоксическое, противовоспалительное и десенсибилизирующее действие. Применяют при аллергических заболеваниях, артритах, невралгиях, отравлениях соединениями мышьяка, ртути, свинца, синильной кислоты и ее солями, солями йода, брома в/в по 5-50 мл 30% раствора; внутрь по 2-3 г в виде 10% раствора..

НАТРИЯ УСНИНАТ (Natrii usninas). Оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных бактерий. Применяют для лечения ран, ожогов, трещин и т.д. Наружно в виде 1% водно-спиртового или 0,5% масляного раствора, а также в виде раствора в глицерине или пихтовом бальзаме с добавлением 2% раствора анестезина. Внутрь в виде порошка или в смеси с сульфаниламидами (1 часть натрия усниата с 3-5 частями стрептоцида, норсульфазола). При

припудривании ран порошком расходуют 0,1-0,2 г препарата на рану размером 16 кв см.

НАТРИЯ ФЛУОРАТ (Natrium fluoratum). Таблетки для сосания. Препарат восполняет дефицит фтора в организме, вызывает созревание и затвердевание зубной эмали, предотвращает зубной кариес, особенно у детей. Применяют для профилактики зубного кариеса. Детям от 3 до 6 лет - 1 1/2 табл. в сутки; 6-16 лет - 2 табл. в сутки. Курс - 200-250 дней. При передозировке возможны гипофункция щитовидной железы, иногда аллергические реакции, герпес, насморк, эозинофилия.

НАТРИЯ ХЛОРИД (Natrii chloridum). Применяют при обезвоживании организма и как дезинтоксикационное средство в виде изотонического раствора подкожно, в/в и в клизмах до 2 л/сут, а также для растворения различных лекарственных средств. Гипертонические растворы (3%, 5%, 10%) наружно для лечения гнойных ран; в/в 10-20 мл 10% раствора при кровотечениях (легочные, желудочно-кишечные).

НАТУЛАН (Nathulan). Противоопухолевое средство, применяемое при генерализованных формах лимфогранулематоза (III-IV стадии). Per se и в комплексе с другими препаратами внутрь, начи-

ная с 0,05 г с постепенным повышением дозы до 0,25-0,3 г ежедневно до получения ремиссии. В дальнейшем поддерживающие дозы 0,05-0,15 г в день. На курс 4-7 г. Возможны понижение или отсутствие аппетита, тошнота, рвота, лейкопения, гепато- и кардиотоксическое действие,в отдельных случаях невриты, полиневриты, аллергические дерматиты. Противопоказан при лейкопении, тромбоцитопении, значительных нарушениях функции печени и почек, беременности.

НАФТАЛАННАЯ МАЗЬ (Unguentum Naphthalani). Состав: нефти нафталанской рафинированной 70 г, парафина 18 г, петролатума 12 г. Оказывает смягчающее, рассасывающее, дезинфицирующее и некоторое болеутоляющее действие. Применяют наружно при заболеваниях кожи (экзема, нейродермит, фурункулез и др.), при ожогах, язвах и др.

"НАФТАЛЬГИН" ЛИНИМЕНТ (Linimentum "Naphthalgini"). Состав: анальгина 2,5 г, метилсалицилата 2,5 , нефти нафталанской 2,5 г, эмульгатора Т-2 13 г, смеси жирных спиртов кашалотового жира 3 г, воды дистиллированной до 100 г. Применяют как аналгезирующее средство для растираний.

НАФТАМОН (Naphthammonum). Синонимы: Alcopar, Debefenium. Анти-

НИГЕДАЗА (Nigedasa). Препарат выделен из семян чернушки дамасской (Nigella damascena). Фермент липолитического действия, вызывает гидролитическое расщепление жиров растительного и животного происхождения. Применяют для возмещения недостающей или отсутствующей липолитической активности дуоденального сока, обусловленной патологией органов пищеварения (панкреатиты, холецистопанкреатиты, хронические гепатиты, хронические гастриты, энтероколиты и т.д.). Внутрь по 1-2 табл. за 10-30 мин до еды, запивая водой, при ахилии, гипо- и анацидных состояниях - 1-2 ст. л. натурального желудочного сока. Курс 3-4 нед, при необходимости более длительный. У больных хроническим колитом возможна боль в животе, которая при уменьшении дозы исчезает.

НИЗОРАЛ (Nizoral). Содержит 200 мг кетоконазола. Противогрибковый оральный препарат широкого спектра действия. Применяют при дерматомикозе и онихомикозе, вызванных дрожжевыми грибами; микозе волосистой части головы, вызванном нитевыми грибами; влагалищном микозе, хроническом мукокутанном кандидозе, отрубевидном лишае. Принимают 1 раз в день до или во время еды. При дерматомикозах и отрубевидных лишаях 1 табл. в день в течение 2-8 нед. При влагалищных кандидозах 2

табл. в день в течение 5 дней; при заражениях полости рта и желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы 1-2 табл. в день в течение 2 нед. Для профилактического лечения 1 табл. в день. Длительность курса - до нескольких месяцев. Для лечения микоза волосистой части головы и общего микоза детям с массой тела до 20 г назначают из расчета 50 мг/сут, при массе тела 20-40 кг-100 мг/сут. Возможны тошнота, рвота, понос, головная боль, зуд. Противопоказан при сверхчувствительности к препарату; беременности; в период лактации; при недостаточности функции печени и почек.

"НИКОВЕРИН" ("Nicoverinum"). Состав: папаверина гидрохлорида 0,02 г, кислоты никотиновой 0,02 г. Применяют как спазмолитическое и сосудорасширяющее средство при гипертонии, стенокардии, мигрени, эндартериите по 1 табл. 2-3 раза в день.

НИКОДИН (Nicodinum). Синонимы: Bilizorin, Isochol, Nicoform. Обладает желчегонным, бактериостатическими и бактерицидными свойствами. Применяют при холециститах, холангитах, гепатохолециститах, желчнокаменной болезни, инфекциях мочевыводящих путей, гастроэнтеритах. Внутрь до еды по 0,5-1 г 3-4 раза в день, запивая 1/2 стакана воды. При лихорадочных состояниях дозу уве-

личивают до 8 г/сут, после снижения температуры тела постепенно уменьшают до 3-4 г, затем до 0,5-1 г в течение 10-14 дней. Курс при необходимости повторяют. Возможны усиление диспептических явлений при анацидных гастритах, иногда усиление боли в правом подреберье.

НИКОТИНАМИД (Nicotinamidum). Синонимы: Ftalicotin, Nicovit. Применяют в тех же случаях, что и никотиновую кислоту. Внутрь взрослым по 0,015-0,025 г, детям по 0,005-0,01 г 1-2 раза в день. Дозы при пеллагре 0,05-0,01 г 3-4 раза в день; для детей 0,01-0,05 г 2-3 раза в день в течение 15-20 дней. При других заболеваниях взрослым по 0,02-0,05 г в день, детям по 0,005-0,01 г 2-3 раза в день. Парентерально (в/в, в/м и подкожно) вводят по 1-2 мл 1%, 2,5% и 5% раствора 1-2 раза в день. Противопоказан при тяжелой форме гипертонии и стенокардии.

НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА (Acidum nicotinicum) Синонимы: витамин PP, Nicovit. Применяют при пеллагре (авитаминозе PP); заболеваниях печени; спазме сосудов; атеросклерозе (снижает содержание холестерина в крови); язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколитах, колитах, длительно не заживающих ранах, язвах и др.; как симптоматическое неспе-

цифическое средство при новообразовании в желудочно-кишечном тракте (таблетки никотиновой кислоты с календулой). Для профилактики взрослым внутрь 0,015-0,025 г, детям 0,005-0,02 г в день. При пеллагре взрослым внутрь по 0,1 г 2-3 раза в день в течение 15-20 дней. Парентерально вводят 1% раствор натрия никотината по 1 мл 1-2 раза в день в течение 10-15 дней. Детям внутрь от 0,005 до 0,05 г 2-3 раза в день. При других показаниях внутрь взрослым 0,02-0,05 и до 0,1 г, детям от 0,005 до 0,03 г 2-3 раза в день; при новообразованиях по 1/4 -2 табл. никотиновой кислоты с календулой 2 раза в день. Возможны покраснение лица и верхней половины туловища с ощущением покалывания и жжения, головокружение, приливы крови к голове; при длительном применении больших доз возможна жировая инфильтрация печени.

НИКОФЛЕКС СПОРТИВНЫЙ КРЕМ (Nicoflex). Содержит: капсаицин 0,0075 г, этилникотинат 1,00 г, этиленгликоль салицилат 4,50 г, лавандовое масло 0,05 г. Современный спортивый крем для разогрева мышц. Применяют при артрозах, миалгиях, спондилоартрозах, невралгиях, хроническом полиартрите, прочих артритах. У спортсменов - для повышения тонуса мышц. На мышечную область, подлежащую разогреванию,

выдавить 1-2 г (полоску крема длиной 4-5 см) и слабым массированием в течение 3-4 мин втирать до слабого покраснения кожи.

НИКОШПАН (Nicospan). Состав: но-шпы 0,078 г, кислоты никотиновой 0,22 г. Оказывает выраженное сосудорасширяющее действие. Применяют при спазмах сосудов головного мозга и периферических сосудов после еды по 1 табл. 1-3 раза в день. Возможны покраснение лица, чувство жара.

НИСТАТИН (Nystatinum). Антибиотик, получаемый из мицелия Streptomyces noursei. Синонимы: Fungistatin, Mycostatin. Применяют для лечения и профилактики заболеваний, вызванных дрожжеподобными грибами рода Candida (кандидоз слизистых оболочек, кожи и внутренних органов). Особенно целесообразно профилактическое применение при лечении препаратами тетрациклинового ряда детей, лиц пожилого возраста и ослабленных больных. Внутрь по 500 000 ЕД 3-4 раза или по 250 000 ЕД 6-8 раз в сутки. Детям до 1 года 200 000-300 000 ЕД, от 1 года до 3 лет 300 000-400 000 ЕД, старше 3 лет 500 000-750 000 ЕД в сутки в 3-4 приема. Курс 10-14 дней. Местно мазь наносят на пораженную поверхность 2 раза в день. Суппозитории и глобули по 1 штуке (250 000-500 000 ЕД) 2

раза в сутки. Возможны тошнота, рвота, понос, иногда повышение температуры, озноб. Противопоказан при повышенной чувствительности к препарату.

НИТАЗОЛ (Nitazolum). Синонимы: Aminitrazolum, Trichocid. Применяют при трихомонадных поражениях мочеполовой сферы женщин и мужчин; лямблиозе. При трихомонадной инфекции у женщин обрабатывают половые органы 2,5% суспензией, затем на ночь суппозитории; сочетают с назначением препарата внутрь по 0,1 г 3 раза в день. Проводят 15 процедур. Повторяют 2-3 раза. При лечении мужчин назначают только внутрь по 0,1 г 3 раза в день ежедневно. Курс (15 дней) повторяют 2-3 раза через 1-2 нед. При лямблиозе внутрь взрослым по 0,1 г 3 раза в день. Возможны головная боль, тошнота, недомогание.

НИТРАЗЕПАМ (Nitrazepamum). Синонимы: Neozepam, Eunoctin, Radedorm и др. Оказывает снотворное, транквилизирующее, анксиолитическое миорелаксантное противосудорожное действие. Применяют при нарушениях сна различной этиологии, неврозах различного генеза, психопатии с преобладанием тревоги и беспокойства; для купирования абстинентного синдрома при хроническом алкоголизме. В качестве снотворного средства внутрь за 30 мин до сна, взрослым 0,0025-0,01 г. Максималь-

ная разовая доза 0,02 г. Детям в зависимости от возраста и состояния больного. В качестве транквилизатора и противосудорожного средства 2-3 раза в день по 0,005-0,01 г. Максимальная суточная доза 0,03 г. Курс 30-45 дней. Большие дозы вызывают сонливость, вялость, атаксию, нарушение координации движений, головную боль, в редких случаях кожный зуд, тошноту. Противопоказан при миастении, беременности. не следует назначать лицам, деятельность которых требует быстрой психической и физической реакции, водителям транспорта.

НИТРОГЛИЦЕРИН (Nitroglycerinum). Синонимы: Anginine, Trinitrol. Расширяет кровеносные сосуды (преимущественно коронарные артерии и сосуды мозга), расслабляет гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей и других органов. Применяют для купирования приступов стенокардии; иногда при дискинезии желчевыводящих путей и эмболии центральной артерии сетчатки. По 1/2-1 табл. (или 1-2 капли 0,5-1% раствора) сублингвально. Возможны шум в ушах, головная боль, головокружение, коллапс. Противопоказан при глаукоме, повышенном внутричерепном давлении, нарушении мозгового кровообращения, в остром периоде инфаркта миокарда. Назначают с осторожностью при выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга.

НИТРОКСОЛИН (Nitroxolinum). Обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении грибов рода Candida и др. Применяют при инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит). Внутрь во время еды по 0,05-0,1 г 3-4 раза в день. Максимальная суточная доза 0,8 г. Курс 2-3 нед. Повторные курсы проводят с 2-недельным перерывом. Для детей старше 5 лет 0,2-0,4 г 4 раза в день моложе 5 лет 0,2 г/сут. Курс 2-3 нед. Повторные курсы можно проводить по 2 нед с 2-недельным перерывом. Возможны диспептические явления. Противопоказан при выраженном нарушении выделительной функции почек (возможность кумуляции).

НИТРО-МАЗЬ (Nitro 2% voide-salva). Способствует расширению венозных сосудов. Применяют при стенокардии, назначают только взрослым. Эффективная разовая доза 7,5-30 мг (2-8 см) 2% мази, которую наносят на специальную бумагу размером 10.6 см и накладывают на левую верхнюю часть грудной клетки. В зависимости от состояния больного мазь можно применять 1-3 раза в течение суток. Возможны покраснение лица, головокружение, тахикардия, головная боль. У больных, длительно принимавших нитроглицерин и резко закончивших его прием, может обост-

риться стенокардия. Не следует применять мазь во время беременности, лактации; при резко выраженных сужениях просвета мозговых сосудов, тяжелой анемии.

НИТРОНГ (Nitrong). Сосудорасширяющее средство, обеспечивает пролонгированное действие нитроглицерина (до 6-8 ч), аналогичен сустаку. Применяют для предупреждения приступов стенокардии. Внутрь перед едой в зависимости от тяжести заболевания 1-2 табл. по 2,6 мг 2-3 раза в день. Максимальная разовая доза 13 мг, суточная 39 мг препарата. Действие препарата наступает через 1 ч после приема. Таблетки глотать, не разжевывая. Возможны головная боль, головокружение, ощущение жара. Противопоказан при кровоизлиянии в мозг, повышенном внутричерепном давлении, в первые дни после острого инфаркта миокарда.

НИТРОСОРБИД (Nitrosorbidum). Синонимы: Carvasin, Dinitrate. Применяют для предупреждения приступов стенокардии; иногда применяется при спазмах периферических сосудов. Внутрь по 0,005-0,01 г 2-3 раза в день. Курс лечения (15-20 дней) при необходимости может быть повторен. Возможны головокружение, шум в ушах, головная боль, тошнота. Противопоказан при глаукоме, повышенном внутричерепном давлении, остром нарушении мозгового кровообра-

щения, в остром периоде инфаркта миокарда; необходима осторожность при выраженном атеросклерозе сосудов мозга, артериальной гипотонии.

НИТРОФУНГИН (Nitrofungin). Состав: 2-хлор-4-нитрофенола 1 г, триэтиленгликоля 10 г, спирта этилового 50% до 100 мл. Применяют при грибковых заболеваниях кожи: эпидермофитии, трихофитии, грибковой экземе; кандидозе кожи. Смазывают пораженные места 2-3 раза в день до исчезновения клинических симптомов заболевания, затем 1-2 раза в неделю в течение 4-6 нед.

НИТТИФОР (Nittifor). Препарат оказывает педикулецидное действие, губительно действует на яйца насекомых, половозрелых особей и личинок. Применяют для уничтожения головных и лобковых вшей. Волосы головы или волосистые части тела обильно увлажняют раствором "Ниттифор" и ватным или марлевым тампоном (можно губкой) втирают препарат в корни волос. Ниттифор наносят из расчета 10-60 мл на одного человека в зависимости от густоты волос. Голову повязывают косынкой. Через 40 мин после обработки препарат смывают теплой проточной водой с мылом или шампунем. После мытья волосы расчесывают частым гребнем для удаления погибших насекомых.

НОВИКОВА ЖИДКОСТЬ (Liquor Novicovi). Состав: танина 1 г, бриллиантового зеленого 0,2 г, спирта этилового 96% 0,2 г, масла касторового 0,5 г, коллодия 20 г. Антисептическое средство. Наносят на мелкие кожные повреждения. Противопоказан при обильных кровотечениях, инфицированных ранах.

НОВОИМАНИН (Novoimaninum). Антибактериальный препарат, получаемый из растения зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.). Активен в отношении грамположительных бактерий, в том числе стафилококков, устойчивых к пенициллину. Обладает способностью подсушивать раневую поверхность и стимулировать регенерацию тканей. Применяют при абсцессах, флегмонах, инфицированных ранах, ожогах II и III степени, язвах, пиодермиях, маститах, ринитах, фарингитах, гайморитах. Наружно в виде раствора для влажных повязок, промываний полостей, электрофореза, ингаляций и капель (в ухо и нос).

√ **НОВОКАИН** (Novocainum). Синонимы: Procaini hydrochloridum, Aminocaine, Citocain, Panacain, Syntocain. Местноанестезирующее средство, применяемое при инфильтрационной, проводниковой эпидуральной и спинномозговой анестезии, вагосимпатической и паранефраль-

ной блокаде; для потенцирования действия основных наркотических средств при общей анестезии; для купирования боли при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, при трещинах заднего прохода, геморрое и др. При инфильтрационной анестезии высшие дозы в начале операции не более 500 мл 0,25% раствора или 150 мл 0,5% раствора, далее на каждый час до 1000 мл 0,25% раствора или 400 мл 0,5% раствора в течение каждого часа. Для проводниковой анестезии применяют 1-2% растворы, при перидуральной 20-25 мл 2% раствора, для спинномозговой 2-3 мл 5% раствора, при паранефральной блокаде 50-80 мл 0,5% раствора, при вагосимпатической блокаде 30-100 мл 0,25% раствора, как местно-анестезирующее и спазмолитическое средство препарат применяют в суппозиториях по 0,1 г. Возможны головокружение, слабость, гипотония, аллергия. Противопоказан при индивидуальной непереносимости.

НОВОКАИНАМИД (Novocainamidum). Синонимы: Amidoprocain, Cardiorytmin, Procardyl, Procainamidi hydrochloride. Понижает возбудимость мышц сердца, подавляет эктопические очаги возбуждения, а также обладает местно-анестезирующим свойством. Применяют при нарушениях сердечного ритма (экстрасистолия, пароксизмальная тахи-

кардия, пароксизмы мерцания предсердий и др.). Внутрь по 0,5-1 г 3-4 раза в сутки; в/м 5-10 мл 10% раствора, в/в (капельно) для купирования острых приступов 2-10 мл 10% раствора в 5% растворе глюкозы или растворе натрия хлорида. Возможны коллаптоидные реакции, общая слабость, головная боль, тошнота, бессонница. Противопоказан при выраженной сердечной недостаточности, нарушении проводимости, повышенной чувствительности к препарату.

"НОВОМИГРОФЕН" ("Novomigrophenum"). Состав: амидопирина 0,2 г, фенацетина 0,1 г, кофеина 0,015 г, лимонной кислоты 0,015 г, наполнителей не более 15%. Применяют в качестве анальгезирующего средства при головной боли, невралгии, как жаропонижающее при простудных заболеваниях по 1 табл. 2-3 раза в день.

НОЗЕПАМ (Nozepamum). Синонимы: Tazepam, Oxazepam, Adumbran, Serenal и др. Транквилизатор. Оказывает успокаивающее действие на ЦНС. Применяют при неврозах, психопатии, неврозоподобных и психопатоподобных расстройствах, сопровождающихся страхом, тревогой, потенцирует действие алкоголя и снотворных препаратов, может понижать тонус мышц и обладает противосудорожной активностью. Внутрь по-

сле еды. Начальная доза 0,005-0,01 г, средняя разовая доза 0,02-0,03 г 3-4 раза в день, суточная доза в пределах 0,03-0,09 г. Возможны сухость во рту, сонливость, вялость, мышечная слабость, расстройство оккомодации, аллергические реакции и диспептические явления. Противопоказан при острых заболеваниях печени и почек, миастении.

НОЛИЦИН (Nolicin). Уроантисептик сильного бактерицидного действия группы хинолонов. Активен в отношении большинства грамотрицательных бактерий, а также в отношении некоторых грамположительных микроорганизмов. Применяют при острых и хронических инфекциях мочевых путей. Обычная суточная доза - 1 табл. по 400 мг 2 раза в день. Максимальная суточная доза - 1500 мг. Противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам хинолиновой группы, печеночной недостаточности. Не следует принимать кормящим матерям и в течение первых 3 мес. беременности.

НОНАХЛАЗИН (Nonachlazinum). Увеличивает кровоток и улучшает кровоснабжение сердца, устраняет спазмы мускулатуры кишечника. Применяют при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда с постинфарктной стенокардией. Внутрь за час до еды по 0,03 г 3-4 раза в день; суточная доза может быть

увеличена до 0,18-0,24 г. Курс 3-4 нед. Противопоказан при выраженных нарушениях функции печени и почек, нельзя сочетать с β-адреноблокаторами.

НОН-ОВЛОН (Non-Ovlon). Состав 1 драже: норэтистерона ацетат 0,001 г, этинилэстрадиол 0,00005 г. Оказывает угнетающее влияние на гонадотропную функцию гипофиза [illegible] норэтистерона ацетат уменьшает [illegible] лютеинизирующего гормона, а [illegible] эстрадиол – фолликулостимулирующего [illegible], что тормозит овуляцию. Применяют в качестве противозачаточного [illegible], а также при дисфункциональных маточных кровотечениях, функциональном бесплодии, недоразвитии матки [illegible] контрацептивное средство назначают [illegible] по 1 драже ежедневно в течение 21 дня, начиная с 5-го дня менструального цикла. Целесообразно принимать вечером после еды (желательно в один и тот же час). В начале лечения возможны тошнота, увеличение массы тела, нагрубание молочных желез. Противопоказан при беременности, угрожающем аборте, опухолях, наклонности к тромбоэмболиям, отосклерозе, циррозе печени, гепатите.

НОРАКИН (Norakin). Синонимы: Akineton, Biperiden. Оказывает корригирующее действие при паркинсонизме и треморе. Применяют при паркинсонизме

различной этиологии, спастической кривошее и др; для коррекции нейролептической терапии. Внутрь по 0,001-0,002 г 2-3 раза в день; при необходимости -до 0,005-0,01 г/сут. Возможны головная боль, головокружение, тошнота. Противопоказан при глаукоме.

НОРКОЛУТ (Norcolut). Синонимы: Norethisterone, Anovule, Anzolan, Hormoluton. Гестагенный гормональный-препарат. При менструальном синдроме, мастодинии, а также нерегулярных циклах назначают по 1-2 табл. в сутки от 16-го до 25-го дня цикла. Допустимо совместное назначение норколута с одним из эстрогенных гормонов. При дисфункциональных маточных кровотечениях, кистозной гландулярной гиперплазии эндометрия (если функциональный характер кровотечения подтвержден гистологическим анализом в течение первых 6 мес) назначают для прекращения кровотечения на протяжении 6-12 дней по 1-2 табл., а для предупреждения рецидивов кровотечения - в той же дозе от 16-го до 25-го дня цикла. При эндометриозах, аденомиозах препарат назначают в течение 6 мес по 1 табл. в сутки с 5-го по 25-й день цикла или же по схеме постоянного курса, начиная с 1/2 табл. в сутки, на 5-й день цикла во избежание маточных кровотечений постепенно с осторожностью повышают дозу на 1/2 табл. в каждые 2-3

нед в течение 4-6 мес. Возможна тошнота, исчезающая самостоятельно в последующие циклы. Иногда возможны отек, аллергические кожные реакции, парестезия, утомляемость, нарушение функции желудочно-кишечного тракта.

НОРСУЛЬФАЗОЛ (Norsulfazolum). Синонимы: Ci[illegible], Sulfathiazol. Сульфаниламидный п[illegible]ктивный в отношении грамп[illegible] и грамотрицательных ба[illegible]. Применяют при пневмонии, [illegible] менингите, гонорее, стаф[illegible] стрептококковом сепсисе, [illegible]. При пневмонии и менингите [illegible] прием 2 г, затем по 1 г каждые 4-6 [illegible] курсовая доза 20-30 г); при стафило[illegible] инфекциях на первый прием 3-4 [illegible] по 1 г 4 раза в день в течение 5-6 дней. При дизентерии по 6-4-3 г/сут по специальной схеме. Детям дозы уменьшают соответственно возрасту. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г. Возможны диспептические явления, аллергические реакции, лейкопения, невриты, нарушение функции почек (кристаллурия). Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидным препаратам.

НОРСУЛЬФАЗОЛ-НАТРИЙ (Norsulfazolum-natrium). Синонимы: Norsulfazolum solubile, Sulfathiazolum sodium. Свойства, побочное действие и противо-

показания те же, что и для норсульфазола; применяется в тех же случаях, а также при инфекционных заболеваниях глаз. Вводят в/в при необходимости создания в крови высокой концентрации препарата по 10-20 мл 5-10% раствора. В офтальмологии применяют 10% раствор по 2 капли 4 раза в день.

НОРЭТИСТЕРОН (Norethisteron). Синонимы: Norlutan, Norlutin acetate. Синтетический гестагенный гормональный препарат; оказывает эффективное действие на эндометрий и тормозит овуляцию. Применяют при вторичной аменорее, дисфункциональных кровотечениях, полименорее с укороченной фазой желтого тела, эндометриозе, раке эндометрия, мастодинии и диффузной мастопатии. При вторичной аменорее перорально назначают по 5 мг препарата в течение 2 последующих дней. При дисфункциональных кровотечениях - в течение 10 дней ежедневно по 5 мг норэтистерона+0,05 мг местранола; при эндометриозе - начиная с 5-го дня цикла ежедневно по 10 мг препарата в течение нескольких месяцев. Противопоказан при беременности, нарушении функции печени.

НО-ШПА (No-spa). Синоним: Drotaverium. Оказывает выраженное спазмолитическое действие. Применяют при спазме желудка и кишечника, спаз-

матических запорах, приступах желчно-
и мочекаменной болезни, стенокардии.
Внутрь по 0,04-0,08 г 2-3 раза в день; в/в
(медленно) 2-4 мл 2% раствора, при не-
обходимости внутриартериально (облите-
рирующий эндартериит). Возможны голо-
вокружение, сердцебиение, потливость,
чувство жара, аллергический дерматит.

НОФЕЛАН (Nofelan) Ферментатив-
ный гидролизат белка. Применяют иск-
лючительно для лечения детей старше 1
года, больных фенилкетонурией (под по-
стоянным контролем уровня фенилала-
нина в крови). Диету, назначаемую на
базе нофелана, содержащую малое коли-
чество фенилаланина, следует пополнять
углеводами и жирами в количествах, со-
ответствующих потребностям здорового
ребенка. Суточную дозу рассчитывают
индивидуально и дают в 2-3 приема по
содержанию в крови фенилаланина. Воз-
можны рвота, тошнота и нежелание при-
нимать нофелан, в исключительных слу-
чаях; особенно у детей старшего возраста,
непереносимость препарата. Не назнача-
ют детям до 1 года из-за отсутствия жи-
ров и углеводов.

"ОБЛЕКОЛ" ("Oblecolum"). Коллаге-
новая пленка с облепиховым маслом.
Оказывает ранозаживляющее действие
(стимулирует репаративные процессы в
ране, способствует оздоровлению и росту

грануляций, ускоряет эпителизацию). Применяют для лечения различных ран: скальпированных, послеоперационных, поверхностных ожоговых ран II и III степени (при подготовке их к дерматопластике), ссадин, трофических язв. После санации раны накладывают облекол. Вырезают пленку по размеру раневой поверхности, пинцетом помещают ее на 10-20 с в изотонический раствор натрия хлорида или раствор фурацилина и накладывают на раневую поверхность, плотно прижимая ее ко дну раны. Поверх повязки накладывают обычную асептическую повязку. Смену повязки проводят через 2-3 дня. В зависимости от характера и степени тяжести раневого процесса на курс требуется от 3 до 15 аппликаций. В первые часы наложения пленки возможны ощущения боли и жжение раны. Противопоказан при профузном кровотечении и обильном гнойном отделяемом из раны.

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО (Oleum Hippophcae). Содержит смесь каротинов и каротиноидов (180 мг%), токоферолы (110 мг%) и глицериды олеиновой, линолевой, пальмитиновой и стеариновой жирных кислот. Применяют наружно при ожогах, пролежнях, лучевых поражениях кожи, кольпитах (курс лечения 10-15 процедур), эндоцервицитах и эрозиях шейки матки (курс лечения 8-12 процедур). Внутрь назначают при язвен-

ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, поражениях пищевода.

"ОВИДОН" ("Ovydon"). Этинилэстрадиол. Противозачаточное средство для перорального применения. Назначают внутрь по 1 драже ежедневно в течение 21 дня, начиная с 5-го менструального цикла. Целесообразно принимать вечером после еды (желательно в один и тот же час). В начале лечения возможны тошнота, увеличение массы тела, нагрубание молочных желез. Противопоказан при опухолях, наклонности к тромбоэмболиям, отеросклерозе, циррозе печени, гепатите.

ОДУВАНЧИКА КОРЕНЬ (Radix Taraxaci). Содержит горький гликозид (тараксацин), смолы, инулин (до 40%) и другие вещества. Применяют как горечь для возбуждения аппетита, как желчегонное при запорах в виде настоя (1 ч. л. на стакан кипятка) по 1/4 стакана за 30 мин до еды 3-4 раза в день.

ОКСАЗИЛ (Oxazylum). Синонимы: Ambenonii chloridum, Mysuran chloride. Антихолинэстеразное средство, применяемое при миастении, парезах и параличах после травм, менингите и энцефалита; в восстановительный период после полиомиелита; при боковом амиотрофическом склерозе; периферическом параличе лицевого нерва. Внутрь по 0,001-

0,01 г после еды 2-4 раза в день. Высшая доза 0,025 г; суточная 0,05 г. Возможны гиперсаливация, обильное потоотделение, диспептические явления, частое мочеиспускание, нарушение зрения, голов-ная боль, головокружение, подергивание мышц языка и скелетной мускулатуры. Противопоказания те же, что и для прозерина.

ОКСАФЕНАМИД (Oxaphenamidum). Синоним: Driol. Усиливает образование и выделение желчи. Уменьшает спазмы желчных путей; понижает содержание холестерина в крови. Применяют как желчегонное средство при хронических холециститах, холангитах, желчнокаменной болезни и др. Внутрь до еды по 0,25-0,5 г 3 раза в день в течение 15-20 дней; при необходимости курс продлевают и повторяют. Иногда возможно послабляющее действие.

ОКСАЦИЛЛИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (Oxacillinum-natrium). Синонимы; Cryptocillin, Resistopen. Эффективен в отношении пенициллиназообразующих микроорганизмов, устойчивых к бензилпенициллину и феноксиметилпенициллину. Сохраняет активность в кислой среде желудка. Применяют при инфекциях, вызванных пенициллиназообразующими стафилококками, устойчивыми к бензилпенициллину и феноксиметилпенициллину (септицемия, пневмония, эм-

пиема, абсцессы, флегмоны, холецистит, пиелит, цистит, остеомиелит, послеоперационные раневые инфекции, инфицированные ожоги и др.). Внутрь новорожденным и недоношенным детям в суточной дозе 90-150 мг/кг, детям до 3 мес 200 мг/кг, от 3 мес до 2 лет 1 г, от 2 до 6 лет 2 г; детям старше 6 лет и взрослым по 0,25-0,5 г (до 1 г) 4-6 раз в сутки за 1 ч до еды или через 2-3 ч после еды. Средняя суточная доза 3 г. При тяжелых инфекциях дозы увеличивают до 6-[illegible] г/сут. В/м вводят в сутки новорожденным и недоношенным детям 20-40 мг/кг, детям до 3 мес 60-80 мг/кг, от 3 мес до 2 лет 1 г, от 2 до 6 лет 2 г, старше 6 лет и взрослым 2-4 г. Возможны аллергические реакции; при приеме внутрь нарушения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос). Противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к препаратам группы пенициллина и аллергических заболеваниях.

ОКСИДЕВИТ (Oxidevitum). Синонимы: 1α-оксихолекальциферол; 1α-оксивитамин D3; 1α-кальцидиол; 1αOHD3. Синтетический аналог 1α, 25-диоксивитамина D3. Регулирует обмен кальция и фосфора, стимулирует всасывание кальция и фосфора в кишечнике, их реабсорбцию в почках. Назначают при рахите и рахитоподобных заболеваниях:

витамин D-резистентном рахите, почечно-тубулярном ацидозе, болезни Дебре-де Тони-Фанкони, витамин D-зависимом рахите, а также при несовершенном костеобразовании. Показан при костной патологии (остеопороз и остеомаляция) различного генеза: климактерический, инволюционный и ювенильный остеопороз, стероидные остеопатии; послеоперационная гиперпаратиреоидная остеодистрофия, гипокальциемия при гипопаратиреозе и псевдогипопаратиреозе, тиреотоксикозе, а также при остеопорозах, связанных с нарушением всасывания в кишечнике. Применяют внутрь. Детям при рахитоподобных заболеваниях назначают 0,0005-0,003 мг/сут в зависимости от возраста и массы тела в течение 2-3 мес, иногда до 1 года. При рахите применяют по 0,001 мг/сут ежедневно в течение 10 дней. Проводят 3 курса с перерывом между ними 2 нед. При хронической почечной недостаточности (ХПН) детям, находящимся на лечении гемодиализом, с целью купирования остеодистрофии назначают по 0,001 мг/сут с одновременным применением витамина D2 по 2000 МЕ ежедневно в течение длительного времени. Взрослым при ХПН, находящимся на гемодиализе, назначают 0,001-0,002 мг/сут ежедневно или через день с последующим снижением дозы до 0,0005 мг в зависимости от нормализации содержания каль-

ция в крови и активности щелочной фосфатазы. Курсы по 2-3 мес рекомендуется
повторять 2-3 раза в году. При ХПН тре-
буется предварительная коррекция ги-
перфосфатемии. Больным после транс-
плантации почек с профилактической
целью назначают по 0.00025-0.001
мг/сут ежедневно или через день. При
костной патологии (остеопороз, остеома-
ляция) различного генеза препарат при-
меняют по 0,0005-0,001 мг/сут в течение
длительного времени (от 2-3 мес до 1 года
и более). Терапию препаратом необхо-
димо проводить под постоянным контро-
лем содержания кальция и фосфора в
крови, а также активности щелочной
фосфатазы (при ХПН - еженедельный кон-
троль). Возможна аллергическая реакция, а
при передозировке - гиперкальциемия, ко-
торая обычно проходит через 2-3 дня после
отмены препарата. Повторно препарат на-
значают в меньших дозах. Противопоказан
при гиперкальциурии (уролитиаз).

ОКСИКОБАЛАМИН (Oxycobalaminum). Метаболит цианокобаламина (витамина B12), участвует в обмене углеводов, белков и липидов, в синтезе лабильных метильных групп, в образовании холина, метионина, креатина, нуклеиновых кислот, восстановлении сульфгидрильных соединений в эритроцитах. Стимулирует функцию костного мозга и нормализует кроветворение. Применяют при

хронических анемиях, протекающих с дефицитом витамина В12 (независимо от причин), неврологических заболеваниях (полиневриты, радикулиты, боковой амиотрофический склероз и рассеянный склероз), при комплексной терапии больных сахарным диабетом с диабетической периферической нефропатией, при некоторых кожных заболеваниях (псориаз и др.). В/м или подкожно. При неврологических заболеваниях вводят в суточной дозе 0,0002 г (200 мкг) - 0,0005 г (500 мкг) ежедневно 10-20 дней; в комплексной терапии кожных заболеваний в суточной дозе 0,0002 г (200 мкг) ежедневно 15-20 дней, в тяжелых случаях - 0,0005 г (500 мкг) через день 10 дней. При В12-дефицитных анемиях по 0,0001 г (100 мкг) ежедневно или через день 20-25 дней. Длительность лечения и назначение повторных курсов зависят от характера заболевания и эффективности лечения. Возможны аллергические реакции. Противопоказан при эритремии и эритроцитозе, доброкачественных и злокачественных новообразованиях, за исключением случаев, сопровождающихся мегалобластической анемией и дефицитом витамина В 12.

ОКСИЛИДИН (Oxylidinum). Синоним: Benzoclidini hydrochloridum. Дает седативный и гипотензивный эффект, усиливает действие снотворных, наркотиче-

ских, аналгезирующих и местноанестезирующих средств. Применяют при нерезко выраженных депрессиях различного генеза, психопатиях и психоподобных состояниях, невротических и неврозоподобных расстройствах с повышенной возбудимостью, психической напряженностью, нарушением сна, при психических расстройствах на фоне органической недостаточности ЦНС различной этиологии; гипертонической болезни с церебральными нарушениями. Внутрь по 0,02-0,06 г на прием до 0,2-0,3 г/сут, в/м - по 1 мл 2% раствора 2 раза в день, при необходимости - до 4-6 мл 5% раствора в сутки. При повышенной чувствительности к препарату возможны сухость во рту, тошнота, жажда, полиурия, кожные высыпания. Противопоказан при выраженной гипотонии, заболеваниях почек с нарушением функции.

ОКСИПРОГЕСТЕРОНА КАПРОНАТ (Oxyprogesteroni caproas). Синонимы: Primolut - Depot, Progestero - retard. Синтетический аналог прогестерона. Применяют при привычном и угрожающем выкидыше; для предупреждения выкидыша при оперативном вмешательстве во время беременности; при аменорее и полименорее. В/м 0,5-2 мл 12,5% масляного раствора 1 раз в неделю. При длительном применении больших доз возможна тахикардия.

ОКСИТОЦИН (Oxytocin). Полипептидный гормон задней доли гипофиза. Вызывает сильные сокращения мускулатуры матки (особенно беременной). Применяют для стимулирования родовой деятельности, при гипотонических маточных кровотечениях в послеродовом периоде. В/в капельно по 1 мл в 500 мл 5% раствора глюкозы; при слабой родовой деятельности и затяжных родах в/м или в шейку матки 0,5–1 мл. Возможны резкие схватки с развитием внутриматочной гипоксии. Противопоказан при угрожающем разрыве матки; поперечном и косом положении плода, несоответствии величины головки плода размерам таза.

ОКСИФЕРРИСКОРБОН НАТРИЯ (Oxyferriscorbone sodique). Оказывает противовоспалительное и аналгезирующее действие. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, пептической язве тонких кишок и пищевода. В/м по 30-60 мг в течение 15-20 дней.

"ОКСИЦИКЛОЗОЛЬ" (Oxycyclosolum). Состав: окситетрациклина гидрохлорида 0,3 г, преднизона 0,1 г, пентола 3 г, пропеллента 70 г. Оказывает противовоспалительное, антиаллергическое и антимикробное действие. Применяют при ожогах и инфицированных ранах, размер которых не превышает 15-20 см^2.

Наносят на пораженные кожные покровы ежедневно или 2-3 раза в неделю. Противопоказан при обширных гранулирующих ранах, повышенной чувствительности к тетрациклинам, грибковых поражениях кожи.

ОКСОДОЛИН (Oxodolinum). Синонимы: Hygroton, Chlortalidon. Диуретическое (салуретическое) средство пролонгированного действия с умеренным натрийуретическим гипотензивным действием. Назначают внутрь в качестве диуретического (салуретического) средства при застойных явлениях в малом и большом круге кровообращения; циррозе печени с портальной гипертензией, нефрозах и нефритах (за исключением тяжелых прогрессирующих форм с уменьшением скорости клубочковой фильтрации); токсикозе беременных (нефропатия, отеки, эклампсия); предменструальном синдроме, несахарном диабете, диспротеинемических отеках, ожирении. Используется при гипертонической болезни и симптоматических гипертониях. Возможна комбинация с другими салуретиками (фуросемид, триамтерен, верошпирон и др.). Внутрь обычно утром до еды. Дозы подбирают индивидуально в зависимости от тяжести заболевания и оказываемого эффекта. В качестве диуретического средства разовая доза от 0,025 до 0,1 г. Возможна комбинация с быстродействующим диуретиком - фуросеми-

дом; при гипертонической болезни и симптоматических гипертониях по 0,025-0,1 г один раз в день (утром), чаще с резерпином. Параллельно целесообразно назначать препараты калия внутрь. Высокие дозы могут привести к развитию гипокалиемии, сопровождающейся изменениями на ЭКГ, слабости, головокружения, головной боли, тошноты. Возможны диспептические явления, у больных диабетом повышение уровня сахара в крови, гиперурикемия с клиническими признаками подагры. В процессе лечения оксодолином необходим контроль за уровнем мочеотделения, электролитным составом крови, АД. Противопоказан при гипокалиемии, тяжелых формах нефрозов и нефритов, острой почечной недостаточности с анурией, печеночной коме, остром гепатите, тяжелых формах сахарного диабета и подагры.

ОКСОЛИНОВАЯ МАЗЬ (Unguentum Oxolini). Обладает антивирусной активностью в отношении вируса гриппа и вируса герпеса простого. Применяют при вирусных заболеваниях глаз, кожи, вирусных ринитах; пузырьковом и опоясывающем лишае, бородавках, контагиозном моллюске, герпетиформном дерматите Дюринга, чешуйчастом лишае. С профилактической целью применяется при гриппе. При лечении аденовирусного кератоконъюнктивита, вирусных керати-

тов (за веко 0,25% мазь 1-3 раза в день). Для лечения вирусного ринита смазывают слизистую оболочку носа 0,25% мазью 2-3 раза в день в течение 3-4 дней, а для профилактики гриппа - 2 раза в день в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом. При [illegible], пузырьковом и опоясывающем [illegible], контагиозном моллюске и других [illegible] заболеваниях наносят на поврежденную кожу 3% мазь 2-3 раза в день в течение [illegible] 2 мес. Возможно скоропроходящее [illegible].

ОКТИЦИЛ ([illegible]). Оказывает фунгистатическое и [illegible] действие. Применяют при [illegible] формах эпидермофитии и руброфитии, для лечения отрубевидного лишая, эритразмы. Мазь наносят на пораженный участок кожи 2 раза в день. Курс 4-8 нед. При дисгидротической форме эпидермофитии вначале устраняют острые воспалительные явления, затем смазывают 1% спиртовым раствором пораженные участки кожи 2 раза в день. На ночь смазывают мазью и накладывают марлевую повязку.

ОЛЕАНДОМИЦИНА ФОСФАТ (Oleandomycini phosphas). Получен из культуральной жидкости штамма Streptomyces antibioticus. Синонимы: Amimycin, Oleandocyn. Активен в отноше-

нии грамположительных микроорганизмов,особенно стафилококков, стрептококков и пневмококков. Применяют при пневмонии, скарлатине, дифтерии, ангине, сепсисе, тонзиллите, ларингите, флегмонах, гнойном холецистите,остеомиелите, стафилококковом, стрептококковом и пневмококковом сепсисе и других заболеваниях, вызванных чувствительными к нему микроорганизмами. Внутрь после еды по 0,25-0,5 г/сут в 4-6 приемов. Высшая суточная доза для взрослых 2 г. Для детей до 3 лет 0,02 г/кг, от 3 до 6 лет 0,25-0,5 г, от 6 до 14 лет 0,5-1 г, старше 14 лет 1-1,5 г/сут. Курс 5-7 дней. Возможны аллергические реакции (кожный зуд, крапивница, ангионевротический отек). Противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к препарату, поражении паренхимы печени.

ОЛЕТЕТРИН (Oletetrinum). Состав: тетрациклина 2 части, олеандомицина 1 часть. Синонимы: Sigmamycin, Tetraolean. Действует на грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы, риккетсии, крупные вирусы и некоторые простейшие. Применяют при очаговой и крупозной пневмонии, бронхитах, синуитах, бронхоэктатической болезни. отите, различных септических процессах, рожистом воспалении, ангине, гнойном менингите, инфекциях моче-

полового тракта., гонорее, туляремии, бруцеллезе и др. Внутрь в течение 5-14 дней по 250 мг 4-6 раз в сутки; детям с массой тела до 10 кг - 25 мг/(кг.сут), от 10 до 15 кг - 250 мг/сут, от 15 до 20 кг - 375 мг, от 20 до 30 кг - 500 мг, от 30 до 40 кг - 725 мг, от 40-50 кг - 1 г/сут. В/м по 100 мг 2-3 раза в сутки; детям вводят 10-20 мг/кг в 2 приема. В/в по 500 мг 2 раза в сутки, детям 15-25 мг/кг в 2 приема. Возможны тошнота, рвота, стоматит, аллергические сыпи. Противопоказан при нарушениях функции печени; с осторожностью применять больным с повышенной индивидуальной чувствительностью к тетрациклину и олеандомицину.

ОЛИВОМИЦИН (Olivomycinum). Антибиотик, продуцируемый лучистым грибом Actinomyces olivoreticuli. Применяют при опухолях яичка (семинома, эмбриональный рак, тератобластомы) в стадии генерализации, тонзиллярных опухолях (лимфоэпителиомы, ретикулосаркомы, рак из клеток переходного эпителия, цитобластомы), ретикулосаркомах с поражением периферических узлов, меланомах в стадии диссеминации. Ежедневно или через день, в/в медленно (в течение 2-3 мин) или капельно. Лечение начинают с 0,002 г, при хорошей переносимости дозу постепенно доводят до 0,01 г. На курс (10-20 введений) 0,1-0,2 г оливомицина. Детям вводят по 0,05-0,2

мг/кг. При благоприятных результатах через 3-4 нед курс повторяют. Возможны понижение или потеря аппетита, тошнота, рвота, повышение температуры, грибковые поражения слизистой оболочки полости рта. Противопоказан при терминальной стадии болезни, резком истощении, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, тромбоцитопении.

ОЛИМЕТИН (Olimetinum). Состав одной капсулы: масла мяты перечной 0,0085 г, масла терпентинного очищенного 0,01705 г, масла эфирного аирного 0,0125 г, масла оливкового 0,46025 г, серы очищенной 0,0017 г. Оказывает спазмолитическое, желчегонное, а также мочегонное и противовоспалительное действие. Применяют при почечно- и желчнокаменной болезни. Внутрь после еды по 2 капсулы 3-5 раз в день. С целью профилактики (после отхождения конкрементов) по 1 капсуле в день в течение длительного времени. Противопоказан при нарушениях мочеотделения, острых и хронических гломерулонефритах, гепатитах, язвенной болезни желудка.

ОЛЬХИ СОПЛОДИЯ (ольховые шишки) (Fructus Alni). Содержат дубильные вещества, составной частью которых являются танин (около 2%) и галловая кислота (до 4%). Применяют в качестве вяжущего средства при острых и хрони-

ческих энтеритах и колитах в виде отвара (2 ч. л. на стакан кипятка) по 1 ст.л. 3-4 раза в день.

ОМНАДРЕН-250 (Omnadren-250). Синоним: Sustanon-250. Комбинированный гормональный препарат - смесь разных эфиров тестостерона. Назначают мужчинам при недостаточной функции половых желез, женщинам при раке молочной железы. В/м по [illegible] раз в месяц. Побочное действие и противопоказания те же, что и для других препаратов тестостерона.

ОМНОПОН (Omnoponum). Смесь гидрохлоридов алкалоидов опия. Синонимы: Pantopon, D[illegible] и др. Фармакологическое действие, показания к применению, побочное действие и противопоказания такие же, как для морфина. Назначают внутрь по 0,01-0,02 г, подкожно по 1 мл 1% или 2% раствора. Детям (старше 2 лет) в зависимости от возраста.

ОПТИМОЛ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ (Optymol). Состав глазных капель: 1 мл содержит 2,5 мг (0,25%) или 5 мг (0,5%) тимолол-малеата. Синонимы: Timoptic, Timololmaleat. Снижает внутриглазное давление, не влияя на размер зрачка или остроту зрения благодаря усилению аккомодации; у больных катарактой устраняет явления, связанные с неспособностью видеть вблизи области помутнения хру-

сталика, когда сужается зрачок. По сравнению с пилокарпином более эффективен с меньшими побочными реакциями. Применяют для снижения повышенного внутриглазного давления при гипертензии, хронической открытоугольной глаукоме, глаукоме афакического глаза. Вводят в пораженный глаз по 1 капле 0,25% раствора в день. При неадекватной клинической картине - по 1 капле 0,5% раствора 2 раза в день. Возможны слабое раздражение глаза, незначительное урежение частоты сердечных сокращений в покое; местные реакции гиперчувствительности.

ОРАЗА (ГРАНУЛЫ) (Orazum). Фармакологическое действие. Кислотоустойчивый комплекс амилолитических и протеолитических ферментов, способствующих перевариванию основных пищевых веществ. Применяют при гастритах с пониженной кислотностью, хроническом гепатохолецистите, язвенной болезни желудка с пониженной секрецией, подостром и хроническом панкреатите, хроническом спастическом колите с наклонностью к запорам. Внутрь по 1/2-1 ч.л. во время или сразу после еды 3 раза в день. Курс лечения 2-4 нед. У больных, страдающих диареей, возможно усиление поноса.

ОРАП (Orap). Синонимы: Opigan, Pimozid. Нейролептик, не вызывающий вегетативных реакций (гипотонии); ока-

зывает широкое действие, подавляет галлюцинации и бредовые идеи, нормализует процессы мышления. Применяют при параноидных состояниях, психотических и невротических состояниях с параноидной симптоматикой; для амбулаторной терапии больных шизофренией и симптоматического лечения агрессивности и возбуждения при острых психозах. Внутрь по 1 табл. (1 мг) 1 раз в сутки (утром или вечером). Начальная доза - 1 табл. в сутки - может быть повышена до 8 табл. (8 мг). Оптимальная суточная поддерживающая доза в среднем 5 табл. (5 мг). При назначении больших доз препарата иногда наблюдаются экстрапирамидные расстройства (дрожь или ригидность). Эти явления исчезают при снижении дозы или назначении противопаркинсонических препаратов. В редких случаях отмечаются слюнотечение и потливость.

ОРНИД (Ornidum). Аналог - Bretylan. Препарат симпатолитического действия. Задерживает выделение норадреналина из нервных окончаний, не оказывая блокирующего действия на адренорецепторы. Оказывает гипотензивное действие. Применяют при гипертонической болезни, желудочковых тахиаритмиях, экстрасистолиях (особенно при рефрактерности другим препаратам). Вводят под кожу и в/м по 0,5-1 мл 5% раствора 2-3 раза в день в течение

нескольких недель. Можно комбинировать с другими гипотензивными средствами. Возможны тостатический коллапс, слабость, головокружение, тошнота, рвота, набухание слизистой оболочки носа, чувство жара, боль в области сердца, болезненность в икроножных мышцах, кратковременное ухудшение зрения. Противопоказан при выраженном атеросклерозе, инфаркте миокарда, острых нарушениях мозгового кровообращения, феохромоцитоме. Необходима осторожность при недостаточности функции почек.

ОРОНАЗОЛ (Oronazol). Противогрибковый препарат широкого спектра действия. Синоним: кетоконазол. Активен при приеме внутрь в отношении дерматофитов (Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton), дрожжеподобных грибов (Candida, Cryptococcus, Pityriosporum), диморфных грибов (Histoplazma capsulatum, Coccidioides, Paracoccidiodes) и многих других видов грибов. Применяют при поверхностных и глубоких микозах кожи, волосистой части головы и ногтей, вызванных дерматофитами или дрожжеподобными грибами (дерматомикозы, онихомикозы, хронический кандидоз кожи и слизистых, пестрая перхоть и др.); кандидамикозе полости рта и пищеварительного тракта, системных микозах (системный кандидоз, кандидоурия, паракоцидиомикоз, гистоплазмоз, кокци-

домикоз и др.); для профилактики грибковых инфекций у лиц с пониженным иммунитетом (например, онкологические больные). Назначают взрослым и детям весом более 40 кг один раз в день по 1 табл. 200 мг утром во время завтрака. При устойчивой инфекции дозу можно увеличить до 2 табл. (400 мг) в один прием в день. Детям с массой тела меньше 40 кг назначают от 50 до 100 мг в день один раз в зависимости от массы тела (приблизительно от 3 до 5 мг/кг/сут). После исчезновения симптомов заболевания препарат следует применять еще 1 нед. Терапия дерматомикозов в среднем продолжается от 2 до 6 нед, инфекции волосистой части головы - 2-3 мес, онихомикозов - от 6 до 12 мес, а системных микозов - до 1 года и дольше. Не назначают кормящим матерям. В случае появления клинических симптомов, повышения уровня печеночных ферментов и возможной реакции печени терапию следует прекратить и обратиться к лечащему врачу. Больным с пониженной функцией коры надпочечников назначают с осторожностью. Прием Н2-антагонистов, антацидов или антихолинэргических препаратов возможен только спустя не менее 2 ч после приема ороназола. Нельзя назначать одновременно с рифампицином. Совмещение с циклоспорином А увеличивает уровень последнего в крови (требуется

контроль). Возможны тошнота и рвота, еще реже сыпь или боли в желудке, временное увеличение ферментов печени, редко - гинекомастия. Противопоказан при беременности, острых заболеваниях печени, повышенной чувствительности к препарату.

ОРТОФЕН (Ortophenum). Синонимы: Voltaren, Diclofenac-Natrium. Нестероидный препарат, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Применяют при ревматоидном артрите, остром ревматизме, остеоартрозе, анкилозирующем спондилоартрите (болезнь Бехтерева), артрозах, спондилоартрозе и других воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов. Внутрь во время или после еды (не разжевывая) по 1-2 табл. 1-3 раза в день в зависимости от тяжести заболевания и переносимости препарата. По достижении лечебного эффекта дозу уменьшают до минимальной поддерживающей. Курс может продолжаться длительно при обязательном контроле за свертываемостью крови. В/м взрослым, как правило, назначают по 1 ампуле ортофена (вольтарена) в день (вводят в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы). В тяжелых случаях препарат вводят 2 раза в день. Затем больному дают ортофен (вольтарен) в таблетках. Возможны боль в эпигастральной области, отрыжка, тошнота, рвота, понос, голово-

кружение, головная боль, кожные аллергические реакции, повышение АД. Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в первые 3 мес беременности. С осторожностью назначают больным, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.

"ОСАРБОН" ("Osarbonum"). Состав: осарсола 0,25 г, глюкозы 0,3 г, кислоты борной 0,3 г, жировой основы 2 г. Оказывает антипротозойное действие в отношении трихомонад. Применяют при трихомонозе мочеполового тракта. Вводят во влагалище по 1 суппозиторию 1 раз в день в течение 10 дней.

ОСАРСОЛ (Osarsolum). Синоним: Acetarsolum. Оказывает антипротозойное действие в отношении трихомонад, дизентерийной амебы, эффективен при спирохетозах. Применяют при трихомонадном кольпите. Вводят во влагалище смесь осарсола и борной кислоты по 0,25 г 1 раз в 2-3 дня в течение 2-3 нед. Возможны полиневрит, дерматит, раздражение почек, повышение температуры тела, рвота, понос, желтуха. Противопоказан при наличии белка в моче, заболеваниях печени, сердца, желудочно-кишечного тракта, туберкулезе, беременности, сахарном диабете.

"ОСАРЦИД" ("Osarcidum"). Состав: осарсола 0,3 г, кислоты борной 0,3 г, глю-

козы 0,3 г, стрептоцида белого 0,3 г, жировой основы 2,9 г. Противовоспалительное средство. Оказывает антипротозойное действие в отношении трихомонад. Применяют при трихомонадном кольпите. Местно во влагалище в виде вагинальных суппозиториев по 1 суппозиторию в день в течение 10 дней.

ОФТАН-IDU (ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ) (Ophtan-idu). Содержит идоксуридин. Синонимы: Kerecid, Idoxuridinum. Блокирует репродукцию Herpes simplex путем изменения нормального синтеза ДНК. Применяют при кератите, вызванном вирусом Herpes simplex. В начале курса лечения по одной капле в оба инфицированных глаза, каждый час днем и через каждые 2 ч ночью. После окончания курса (2-4 дня) для профилактики рецидивов следует продолжать лечение еще в течение 3-5 дней, закапывая каждые 2 ч днем и 1 раз ночью. Иногда отмечается небольшое раздражение, зуд, краснота в области век или глаза. Не назначать вместе с кортикостероидами (местно) Противопоказан при повышенной чувствительности к идоксуридину, беременности.

ПАВЕСТЕЗИН (Pavesthesinum). *Состав:* анестезина 0,3 г, папаверина гидрохлорида 0,05 г. Применяют при гастралгиях, спазмах кишечника. Внутрь по 1 табл. 2-3 раза в день.

ПАЛИН (Palin). Капсула содержит 200 мг пипемидиновой кислоты. Применяют при острых и хронических инфекциях мочевыводящих путей, вызванных бактериями, чувствительными к пипемидиновой кислоте. Средняя доза для взрослых по 2 капсулы 2 раза в сутки утром и вечером. Курс обычно продолжается 10 дней, при необходимости и более. Возможны аллергические реакции в виде кожной сыпи.

ПАМБА (Pamba). Антифибринолитическое средство. Применяют при кровотечениях, связанных с местным или общим фибринолизом. В хирургии: при операциях на предстательной железе, легких, щитовидной железе, селезенке; в гинекологии и акушерстве; стоматологии и оториноларингологии. Применяют по 1 табл. 4 раза в день. Противопоказан при тромбозах.

"ПАНГЕКСАВИТ" ("Panhexavitum"). Состав: ретинола ацетата 0,00568 г (16 500 МЕ), тиамина бромида 0,00645 г, рибофлавина 0,005 г, пиридоксина гидрохлорида 0,005 г, никотинамида 0,05 г, кальция пантотената 0,01 г. Применяют при гиповитаминозах и авитаминозах, понижении остроты зрения, некоторых дерматологических заболеваниях (ихтиоз, псориаз, трихофития). Взрослым по 1 табл. 3 раза в день. Детям до 1 года по 1/2

табл. 1 раз в день; от 1 года до 3 лет по 1/2 табл. 2 раза в день; от 3 до 7 лет по 1 табл. 2 раза в день; старше 7 лет по 1 табл. 3 раза в день.

ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ (*Panzynorm forte*). Состав 1 таблетки: экстракта слизистой оболочки желудка 200 мг (соответствует 200 мг пепсина), сухого экстракта желчи рогатого скота 30 мг, панкреатина 200 мг. Заменяет ферменты желудка и поджелудочной железы и стимулирует их выделение. Применяют при нарушении пищеварения различного генеза, гипофункции поджелудочной железы, атрофическом гастрите, гастродуодените, гепатите, холецистите, после операций на желудочно-кишечном тракте, поджелудочной железе и печени. По 1 табл. во время еды 3 раза в день.

ПАНКРЕАТИН (*Pancreatinum*). Препарат поджелудочной железы убойного скота, содержащий преимущественно трипсин и амилазу. Применяют при ахилии, панкреатитах и расстройствах пищеварения, связанных с заболеваниями печени и поджелудочной железы, анацидном и гипацидном гастрите, хронических энтероколитах по 0,5-1 г (детям в зависимости от возраста от 0,1 до 0,5 г).

ПАНТЕНОЛ АЭРОЗОЛЬ (*Panthenol-Spray*). Содержит вещество, близкое по

структуре и действию к пантотеновой кислоте. Синонимы: Dexpanthenol, Pantevit. Оказывает выраженное противовоспалительное действие, способствуя грануляции и эпителизации различных ран. Применяют при всех видах ран и ссадинах, ожогах, асептических послеоперационных ранах, плохо приживающихся кожных трансплантатах, язвах, трещинах, солнечных ожогах, герпесах. Перед употреблением хорошо [illegible]вают аэрозоль и орошают [illegible] участки на расстоянии 10–20 см несколько раз в день.

ПАНТОГАМ (Pantogamum). [illegible]ним: Hopatenic acid. Сочетает [illegible]ющую активность в отношении различных проявлений церебральной недостаточности экзогенно-органического генеза с противосудорожными свойствами, уменьшает моторную возбудимость, активирует умственную деятельность и физическую работоспособность. Назначают детям при умственной недостаточности (задержка психического развития) и олигофрении, при задержке развития речи; в качестве корректора при побочном действии нейролептических средств, при нейролептическом экстрапирамидном синдроме; при подкорковых гиперкинезах различной этиологии, при расстройстве мочеиспускания у детей и взрослых; в комплексной терапии для лечения эпи-

[illegible] нейроинфекции и [illegible] Самостоятельно или в комплексной терапии. Внутрь через 15-30 мин после еды. Разовая доза для взрослых 0,5-1 г, для детей 0,25-0,5 г, суточная доза для взрослых 1,5-3 г, для детей 0,75-3 г. Курс 1-4 мес, в отдельных случаях до 6 мес. Через 3-6 мес можно провести повторный курс. Возможны аллергические реакции (ринит, конъюнктивит, кожные высыпания).

ПАНТОКРИН (*Pantocrinum*). Жидкий спиртовой экстракт из неокостенелых рогов (панты) марала, изюбра и пятнистого оленя. Применяют как стимулятор ЦНС при астенических состояниях, гипотонии, неврастении, неврозах, слабости сердечной мышцы внутрь по 30-40 капель или по 1-2 табл. за 1/2 ч до еды 2-3 раза в день, подкожно по 1-2 мл в день. Курс (2-3 нед) после 10-дневного перерыва может быть повторен. Противопоказан при выраженном атеросклерозе, органических заболеваниях сердца, стенокардии, повышенной свертываемости крови, тяжелых формах нефрита, диарее.

ПАНТОЦИД (*Pantocidum*). Таблетки сложного состава: пантоцида 0,0082 г, безводного карбоната натрия 0,0036 г, натрия хлорида 0,1082 г. Применяют в качестве дезинфицирующего средства для обеззараживания воды (1 табл. на 0,5-

0,75 л воды), дезинфекции рук (1-1,5% растворы), спринцеваний и обработки ран (0,1-0,5% растворы).

ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД (Papaverini hidrochloridum). Миотропный спазмолитический препарат. В больших дозах понижает возбудимость сердечной мышцы, замедляет внутрисердечную проводимость. Применяют при спазмах сосудов головного мозга, стенокардии, эндартериите, холецистите, пилороспазме, спастических колитах, спазме мочевыводящих путей, бронхоспазме. Внутрь по 0,04-0,06 г 3-5 раз в сутки, подкожно по 1-2 мл 2% раствора 2-4 раза; при остром спазме коронарных сосудов и гладкой мускулатуры органов брюшной полости в/в (медленно) 1 мл 2% раствора. Внутрь назначают per se, а также в комбинации с фенобарбиталом и др. Входит в состав суппозиториев. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,4 г, суточная 0,6 г; парентерально разовая доза 0,1 г, суточная 0,3 г. Возможны атриовентрикулярная блокада, желудочковая экстрасистолия; при в/в введении снижение АД, запор.

ПАПАЗОЛ (Papazolum). Состав: дибазола 0,03 г, папаверина гидрохлорида 0,03 г. Применяют при гипертонической болезни и стенокардии по 1 табл. 2-3 раза в день.

ПАПОРОТНИКА МУЖСКОГО ЭКСТРАКТ ГУСТОЙ (Extractum Filicis maris spissum). Антигельминтное средство (действует преимущественно на ленточных глистов). Применяют при тениидозах, дифиллоботриозе, гименолепидозе. Внутрь (после специальной [illegible] подготовки). При тениидозах и дифиллоботриозе назначают в течение [illegible] [illegible]-7 г; при гименолепидозе [illegible] [illegible] в течение 20-30 мин 1,5-2 г. Детям дозу [illegible] вычисляют в соответствии с возрастом. [illegible] разовая доза для взрослых внутрь [illegible] (однократно). Возможны тошнота, рвота, понос, головокружение, головная боль, ослабление сердечной деятельности, дегенеративные изменения печени. Противопоказан при декомпенсации сердечной деятельности, болезни печени и почек, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых желудочно-кишечных и лихорадочных заболеваниях, резком истощении, анемии, активном туберкулезе, беременности. Препарат не назначают детям до 2 лет.

ПАРАТИРЕОИДИН (Parathyreoidinum). Гормональный препарат, получаемый из околощитовидных желез убойного скота. Синоним: Parathyreocrinum. Повышает содержание кальция в крови и устраняет синдром тетании, вызванный недостаточной функцией околощитовид-

ных желез. Применяют при: гипопаратиреозе, различных форм[illegible] [illegible], спазмофилии, аллергических заболеваниях (бронхиальная [illegible] [illegible] др.). Подкожно и в/м [illegible] [illegible] и или через день. При [illegible] [illegible] тетании взрослым 2-4 мл [illegible] [illegible] по 0,25-0,5 мл, от 2 до [illegible] [illegible] 2 лет мл, от 6 до 12 лет по 1,[illegible] [illegible] 0,5-1,5 2-3 ч до прекращения [illegible] [illegible] каждые менно назначают кальци[illegible] [illegible] Одновре-10 мл 10% раствора) или [illegible] в/в (5-1 д.л. 5% раствора 5-6 раз в день). Высшая разовая доза для взрослых 5 мл, суточная 15 мл. Противопоказан при повышенном содержании кальция в крови.

ПАРАЦЕТАМОЛ (Paracetamolum). Синонимы: Alvedon, Dolamin. Обладает жаропонижающим, болеутоляющим и противовоспалительным свойствами. Применяют при невралгии, головной боли, воспалительных процессах по 0,2-0,4 г 2-3 раза в день. Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении фенацетина.

ПАРКОПАН (Parkopan). Синонимы: Cyclodol, Artane, Parkinsan, Romparkin. Препарат аналогичен циклодолу. Назначают по 0,002-0,004 г 2-3 раза в день при паркинсоническом синдроме различной этиологии.

ПАРЛОДЕЛ (Parlodelum). Производное алкалоида спорыньи - эргокриптина. Синонимы: Bromocriptinum, Pravidel. Активизирует дофаминовые рецепторы, подавляет секрецию гормона передней доли гипофиза пролактина, не влияя на другие гормоны гипофиза; уменьшает содержание гормона роста в крови, снижает секрецию АКТГ, подавляет физиологическую лактацию. Применяют при аменорее и бесплодии, связанных с повышенным содержанием пролактина, для подавления лактации, при болезни Иценко-Кушинга и Паркинсона. Принимают во время еды. При галакторее, пролактинозависимой аменорее, бесплодии по 1/2 табл. 2-3 раза в день, постепенно повышают дозы до 1 табл. 2-3 раза в день. Лечение продолжают до полного прекращения секреции молока, нормализации менструального цикла. Для угнетения лактации по 1 табл. 2 раза в день в течение 14 дней. При предменструальном синдроме 1/2 табл. в день с 14-го цикла, повышая постепенно дозу до 1 табл. 2 раза в день до появления менструации. При акромегалии начинают с 1 табл. в день, постепенно повышая дозу в течение 1-2 нед до 4-8 табл. в сутки равными дозами через каждые 6 ч. При болезни Паркинсона эффект наступает при дозах 10-15 мг в день. В комбинации с леводопой

используют более низкие дозы. Начальная доза может быть 2,5 мг 2 раза в день при постепенном увеличении дозы на 5 мг с одновременным снижением дозы леводопы или отменой ее. При болезни Иценко-Кушинга 3 табл. в день, затем дозу уменьшают до 2-1 табл. Через 2-3 нед назначают поддерживающую терапию по 1 табл. 1 раз в день. Курс 6-8 нед. В первые дни лечения возможны тошнота, рвота, головокружение, в редких случаях оказывает гипотензивное действие. Противопоказан при гипе[illegible] заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При лечении парлоделом противопоказано использование оральных контрацептивов; не следует назначать парлодел больным, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы.

ПАРМИДИН (Parmidinum). Синонимы: Anginin, Sospitan, Prodectin. Уменьшает атеросклеротический процесс, способствует улучшению кровообращения, оказывает антибрадикининовое действие. Применяют при атеросклерозе сосудов мозга, сердца, конечностей, диабетической ретинопатии, тромбозе вен сетчатки, облитурирующем эндартериите, трофических язвах голени. Внутрь по 0,25 г 3-4 раза в день, при необходимости до 3 г/сут. Курс 2-6 мес. Возможны диспептические и аллергические реакции, головная боль.

ПАСОМИЦИН (Pasomycinum). Синоним: Streptopas. Спектр антибактериального действия подобен дегидрострептомицину. Малотоксичен, не кумулирует, из организма выводится почками. Применяют при различных формах туберкулеза, [illegible] неспецифических пневмониях, [illegible] процессах, вызванных чувствительными к [illegible] дигидрострептомицину возбудителями. В/м по 1 г/сут в 2-3 мл 0,25-0,5 [illegible] раствора новокаина или дистиллированной воды для инъекций. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом. Возможны расстройства вестибулярного аппарата и понижение остроты слуха, кожный зуд, головокружение, тошнота. Необходима осторожность при назначении больным с острым и хроническим нефритом, при неврите слухового нерва. Нельзя назначать одновременно с канамицином, флоримицином, мономицином и другими антибиотиками, обладающими ото- и нефротоксичностью.

ПАССИФЛОРЫ ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ (Extractum Passiflorae fluidum). Применяют как успокаивающее средство при неврастении, бессоннице, вегетативных нарушениях в период климакса и преклимакса по 30-40 капель 3 раза в день в течение 20-30 дней. Противопоказан при стенокардии, инфаркте миокарда, выраженном атеросклерозе.

ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ТРАВА (Herba Bursae pastoris). Содержит витамин K, ацетилхолин, холин, соли калия, органические кислоты, дубильные вещества. Применяют как кровоостанавливающее средство при атонии матки и маточных кровотечениях внутрь в виде настоя (10,0:200,0) по 1 ст. л. 3 раза в день или в виде экстракта (Extractum Bursae pastoris fluidum) по 20-25 капель 2-3 раза в день.

ПАФЕНЦИЛ (Paphencilum). Оказывает противолейкозное действие. Применяют при хроническом лимфолейкозе, лимфосаркоме, лимфогранулематозе (в комплексе с другими препаратами и для поддерживающего лечения). Внутрь в суточной дозе от 50 до 100 мг в 2-4 приема с интервалом 4-6 ч ежедневно. В случае быстрого уменьшения числа лейкоцитов 2-3 раза в неделю. Курсовая доза 600-3000 мг (в среднем 1500 мг на курс), в отдельных случаях - до 4000 мг. При хроническом лимфолейкозе суточные дозы не должны превышать 75 мг, курсовые - 1000-1200 мг. До начала и во время лечения проводят полный анализ крови, к концу курса лечения число лейкоцитов исследуют через день. После основного курса лечения назначают поддерживающую терапию (50-75 мг 1-2 раза в неделю) под контролем состояния кроветворения. Возможно угнетение костномозгового кроветворения с развитием лейкопе-

нии, тромбоцитопении, реже анемии. В редких случаях наблюдаются понижение аппетита, тошнота, рвота. Противопоказан в терминальной стадии заболевания при глубоком угнетении гемопоэза (число тромбоцитов ниже $100 \cdot 10^9$/л и гранулоцитов менее $1,5 \cdot 10^9$/л), при заболеваниях почек и [illegible] значительном снижении их функции.

ПАХИКАРПИНА ГИДРОЙОДИД (Pa[illegible]) [illegible] Ганглиобло[illegible] [illegible] вызывает со[illegible] [illegible] Применя[illegible] [illegible] ских сосу[illegible] [illegible] для стиму[illegible] [illegible] периоде для уменьшения [illegible] Внутрь по 0,05-0,1 г 2-3 раза в день, подкожно и в/м 3-5 мл 3% раствора. Высшая разовая доза 0,2 г, суточная 0,6 г. Противопоказан при гипотонии, выраженном атеросклерозе, стенокардии, заболеваниях печени и почек, беременности.

"ПЕКТУСИН" ("Pectusinum"). Состав: ментола 0,004 г, масла эвкалиптового 0,0005 г, сахарной пудры 0,75 г, натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы 0,012 г, кальция стеарата 0,0035 г. Противокашлевое средство, применяемое при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей по 1 табл. сублингвально до полного рассасывания.

ПЕЛОИДИН (*Peloidinum*). Экстракт иловой лечебной грязи. Биогенный стимулятор, применяемый при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, колитах, гнойных ранах. Внутрь по 40-50 мл 2 раза в день (утром и вечером) в подогретом виде за 1-2 ч до еды или через 1-2 ч после еды (небольшими глотками в течение нескольких минут), при колитах назначают в виде клизм 2 раза в день по 100 мл катетером на глубину 14-16 см. Курс при язвенной болезни 4-6 нед, при колитах 10-15 дней. При гнойных ранах - для промывания и смачивания повязок.

ПЕЛОИДОДИСТИЛЛЯТ (Peloidodistillatum). Биогенный стимулятор, получаемый из лиманной грязи. Применяют при блефаритах, конъюнктивитах, кератитах, помутнении стекловидного тела, миопическом хориоретините и др.; артритах, радикулитах, миалгии. Подкожно по 1 мл 1 раз в день; всего на курс 30-35 инъекций. Противопоказан при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, беременности после 7 мес, острых желудочно-кишечных расстройствах, далеко зашедшем нефрозонефрите.

ПЕНИЦИЛЛИНАЗА (Penicillinasum). Фермент, расщепляющий лактамное кольцо пенициллина. Продуцируется Bac.licheniformis 749/с. Синоним:

Neutropen. Инактиватор пенициллина. Применяют при аллергических реакциях и анафилактическом шоке, вызванных препаратами группы пенициллина. В/м 1670 МЕ сразу после развития аллергической реакции, при необходимости вводят повторно через 2 дня в той же дозе (не более 3 инъекций с интервалами 2 дня). При повторном введении возможны сенсибилизация организма и аллергические осложнения. Противопоказан при профессиональных аллергических заболеваниях у лиц, занятых производством или длительно работающих с препаратами пенициллина; не вводить повторно при непереносимости и повышенной чувствительности к препарату.

"ПЕНТАЛГИН" ("Pentalginum"). Состав: амидопирина 0,3 г, анальгина 0,3 г, кофеин-бензоата натрия 0,05 г, фенобарбитала 0,01 г, кодеина 0,015 г. Применяют как аналгезирующее и жаропонижающее средство по 1 табл. на прием.

ПЕНТАМИН (Pentaminum). Активный ганглиоблокатор, применямый при гипертонической болезни (I-II стадии) и кризах, спазмах периферических сосудов, кишечника и желчевыводящих путей, почечной колике, приступах бронхиальной астмы. В/м 0,5-3 мл 5% раствора 2-3 раза в день. Высшая разовая доза 3 мл 5% раствора, суточная 9 мл 5% раствора.

ер пенициллина.
ических реакциях
шоке, вызванных
енициллина. В/м
звития аллергиче-
ходимости вводят
ой же дозе (не бо-
рвалами 2 дня).
и возможны сен-
и аллергические
оказан при про-
ческих заболева-
оизводством или
с препаратами
ть повторно при
шенной чувстви-

entalginum"). Со-
анальгина 0,3 г,
05 г, фенобар-
15 г. Примен-
е и жаропони-
бл. на прием.

minum). Актив-
рименяемый при
(I-II стадии) и
ерических сосу-
евыводящих пу-
иступах бронхи-
мл 5% раствора
азовая доза 3 мл
мл 5% раствора.

[illegible] бен-
зоат[illegible].

ПЕНТАЦИН [illegible]. Комплексообразующее [illegible]. [illegible] мое при отравлениях [illegible], радиоактивным иттрием, цезием, цинком, свинцом и смесью продуктов деления урана, а также для выведения из [illegible] ства этих радионуклидов [illegible] го 5 мл 5% раствора [illegible] 30 мл 5% раствора [illegible] случаях (10-20 инъекций) при необ[illegible]. Курс вторяют через 3-4 мес. Возм[illegible] кружение, головная боль, боли [illegible] стях и в области грудной клетки, иногда тошнота, рвота, нарушения коронарного кровообращения, функции почек (из-за выведения радионуклидов), изменения электролитного баланса. Противопоказан при лихорадочных состояниях, нарушении функции почек, коронароспазмах.

"ПЕНТОВИТ" ("Pentovitum"). Состав: тиамина бромида 0,0125 г, пиридоксина гидрохлорида 0,005 г, никотинамида 0,02 г, кислоты фолиевой 0,003 г, цианокобаламина 0,00005 г (50 мкг). Применяют в комплексной терапии заболеваний нервной системы (радикулиты, невриты, невралгии, астенические состояния и др.) по 1-2 табл. 3 раза в день после еды. Курс 3-4 нед.

ПЕНТОКСИЛ (Pentoxylum). Стимулирует лейкопоэз, повышает фагоцитарную активность лейкоцитов и ретикулоэндотелиальной системы. Применяют при лейкопении различной этиологии, алиментарной токсической алейкии, агранулоцитарной ангине, некоторых лекарственных агранулоцитозах, хронических отравлениях бензолом. Внутрь взрослым по 0,2-0,4 г 3-4 раза в день после еды, детям в соответствии с возрастом. В среднем на курс (15-20 дней) 6-10 г препарата. Возможны диспептические явления. Противопоказан при лимфогранулематозе, злокачественных новообразованиях костного мозга.

ПЕПСИДИЛ (Pepsidilum). Раствор в хлористоводородной кислоте продуктов ферментного гидролиза ткани слизистой оболочки желудка свиней, содержащий все составные части секрета желудочных желез. Обусловливает пищеварение белков в желудке. Применяют при гипацидных и анацидных гастритах. Внутрь во время еды по 1-2 ст.л. (лучше через трубочку) 3 раза в день.

ПЕПСИН (Pepsinum). Препарат, содержащий протеолитический фермент. Получают из слизистой оболочки желудка свиней. Применяют при расстройствах пищеварения (ахилия, гипо- и анацидные гастриты, диспепсия и т.д.) внутрь

перед или во время еды по 0,2-0,5 г (детям от 0,05 до 0,3 г) 2-3 раза в день в порошке или в 1-3% растворе разведенной хлористоводородной кислоты.

ПЕРИТОЛ (Periтol. Синонимы: Adekin, Apetigen, Cyprodin и др. Антигистаминное средство, применяемое при аллергических состояниях (крапивница, сывороточная болезнь, сенная лихорадка, вазомоторный ринит, лекарственная [illegible] экзантема, кожный зуд, аллергические [illegible] реакции на укусы насекомых). Детям до 6 мес не назначают. В возрасте от [illegible] до 2 лет препарат назначают с осторожностью в суточной дозе до 0,4 мг/кг ([illegible] ный срок лечения 3-4 нед), от 2 [illegible] 6 лет по 6 мг в день (по 1/2 табл. 3 раза в день) или по 1 ч.л. сиропа 3 раза в день; от 6 до 14 лет по 10 мл сиропа 3 раза или по 1 табл. 3 раза в день. Взрослым назначают по 12 мг (по 1 табл. 3 раза в день) или по 10 мл сиропа 3 раза в день. Противопоказан при глаукоме, предрасположенности к отекам, задержке мочи, беременности.

ПЕРТУССИН (Pertussinum). Состав: экстракта чабреца или экстракта тимиана 12 г, калия бромида 1 г, сиропа сахарного 82 г, спирта этилового 80% 5 мл. Отхаркивающее и смягчающее кашель средство. Применяют при бронхитах и других заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем,

коклюше. По 1 ст.л. 3 раза в день взрослым, детям от 1/2 ч.л. до 1 д.л. 3 раза в день.

ПЕРЦА ВОДЯНОГО ТРАВА (ГОРЦА ПЕРЕЧНОГО ТРАВА) (Herba Polygoni hydropiperis). Содержит флавоновые гликозиды (рутин, кверцитрин, гиперозид), флавоноиды (кверцетин, изорамнетин), витамин К, гликозид полигопеперин, дубильные вещества (3,8%), органические кислоты. Применяют как кровоостанавливающее средство, преимущественно при маточных кровотечениях в виде настоя (20,0:200,0) по 1 ст.л. 3-4 раза в день.

ПЕРЦА ВОДЯНОГО ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Polygoni hydropiperis fluidum). Спиртовое извлечение 1:1 на 70% спирте из травы водяного перца. Применяют как кровоостанавливающее средство при маточных кровотечениях по 30-40 капель 3-4 раза в день.

ПЕРЦА СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА (Tinctura Capsici). Состав: стручкового перца мелконарезанного с семенами 100 г, спирта 90% до 1 л. Применяют наружно как раздражающее и отвлекающее средство при невралгиях, радикулитах, миозитах и др.

ПЕРЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ (Emplastrum Capsici). Изготовлен на основе экстракта

стручкового перца. Применяют наружно как обезболивающее средство при радикулитах, невралгиях, миозитах, люмбаго и т.д.

ПЕТИЛИЛ (Petylyl). Входит в группу трициклических антидепрессантов. Применяют при эндогенных депрессиях, психогенных депрессиях, психоневрозах. Вначале 2-3 драже в день, возможно повышение до 6-8 драже в день. Для поддерживающей терапии 3-4 драже в день. Иногда отмечают нарушение сна.

ПИЖМЫ ЦВЕТКИ (Flores Tanaceti). Содержит эфирное масло (0,3-2%), основной составной частью которого является туйон, горькое вещество танацетин, флавоноиды, дубильные вещества, органические кислоты. Применяют в качестве противоглистного (аскариды, острицы) и желчегонного средства в виде настоя (1 ст. л. на стакан кипящей воды) по 1 ст.л. 3 раза в день. Противопоказан при беременности.

ПИКАМИЛОН (Picamilonum). Фармакологическое действие: улучшает кровоснабжение и функциональное состояние мозга, восстанавливает физическую и умственную работоспособность. Взрослым назначают ноотропного и вазоактивного средства при острых нарушениях мозгового кровообращения; хронической недостаточности мозгового кровообраще-

ния, вегетососудистой дистонии; как транквилизатор при состояниях, сопровождающихся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, эмоциональной лабильностью; при астенических состояниях различной этиологии, депрессивных расстройствах у лиц старшей возрастной группы, сенильных психозах. Препарат назначают per se или в комплексной терапии лицам, находящимся в напряженных и экстремальных условиях деятельности, в том числе спортсменам, для восстановления работоспособности и повышения устойчивости к физическим и умственным нагрузкам. При цереброваскулярных заболеваниях назначают внутрь в разовой дозе от 0,02 до 0,05 г 2-3 раза в день. Суточная доза 0,06-0,15 г. Курс 1-2 мес. Повторный курс рекомендуется через 5-6 мес. При депрессивных состояниях принимают 0,04-0,2 г/сут (в 2-3 приема), оптимальный вариант - 0,06-0,12 г/сут в течение 1 1/2 - 3 мес. В качестве антиастенического средства и как транквилизатор назначают по 0,04-0,08 г/сут, в отдельных случаях до 0,2-0,3 г/сут в течение 1-1 1/2 мес. При алкоголизме в период абстиненции по 0,1-0,15 г/сут коротким курсом - 6-7 дней; при более стойких нарушениях вне абстиненции - в суточной дозе 0,04-0,06 г в течение 4-5 нед. Для восстановления работоспособности и при повышенных

нагрузках - в суточной дозе 0,06-0,08 г в течение 1-1 1/2 мес, для спортсменов в той же дозе в течение 2 нед тренировочного периода. Возможны: усиление раздражительности, возбуждение, ощущение тревоги, головокружение, головная боль, легкая тошнота, аллергическая сыпь, зуд кожных покровов. В этом случае следует уменьшить дозу или отменить препарат. Противопоказан при индивидуальной непереносимости препарата, острых и хронических заболеваниях почек.

ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИД (Pilocarpini hydrochloridum). Алкалоид, полученный из растения Pilocarpus Pinnatifolius Jaborandi. Назначают в виде глазных капель (1-6% раствор) или мазей в офтальмологической практике как миотическое средство для понижения внутриглазного давления, а также при тромбозе центральной вены сетчатки, острой непроходимости артерий, атрофии зрительного нерва.

ПИНАБИН (Pinabinum)- 50% раствор тяжелой фракции эфирных масел (из хвои сосны или ели) в персиковом масле. Оказывает спазмолитическое действие на мускулатуру мочевыводящих путей, бактериостатическое действие. Применяют при почечнокаменной болезни, почечной колике. Внутрь по 5 капель 3 раза в день на сахаре за 15-20 мин до

сды. Курс лечения 4-5 нед; при почечной колике однократно до 20 капель на сахаре. Большие дозы препарата могут вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, гипотензию и общее угнетение. Противопоказан при нефритах, нефрозах.

ПИОНЫ НАСТОЙКА (Tinctura Paeoniae). Настойка 10% травы и корней пиона уклоняющегося на 40% спирте. Оказывает успокаивающее влияние на ЦНС. Применяют при неврастении, бессоннице, церебральных ангиопатиях, вегетативно-сосудистых нарушениях различной этиологии. Способ применения и дозы: внутрь от 30-40 капель до 1 ч.л. 3 раза в день в течение 30 дней.

ПИОЦИД (Pyocidum). Состав: кислоты серной обезвоженной 0,25 мл, эфира для наркоза 0,25мл. Применяют наружно в качестве обезвоживающего и бактерицидного средства, для прижиганий в стоматологической практикепри язвах инфекционно-воспалительного происхождения, гипертрофии сосочков, отслойке десенного края, амфодонтозе I и II степени.

ПИПЕРАЗИНА АДИПИНАТ (Piperazini adipinas). Синонимы: Adipalit, Nematocin. Антигельминтное средство, применяемое при инвазиях различными видами нематод. Наиболее эффективен

при аскаридозе и энтеробиозе. При аскаридозе назначают внутрь за 1 ч до еды или спустя 1 ч после еды по 1,5-2 раза в день (3-4 г/сут) в течение 2 дней. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом. Детям можно назначать препарат в виде 5% раствора: в возрасте от 1 года до 4 лет по 1 ч.л. (0,25 г) 2 раза в день, от 4 до 10 лет по 1 д.л. (0,5 г), от 10 до 14 лет по 2 ст.л. (2 г), 15 лет и старше по 3-5 ст.л. 2-3 раза в день. При энтеробиозе принимают в тех же дозах в течение 5 дней подряд. Возможны тошнота, боль в животе, скоропроходящая головная боль, при передозировке - мышечная слабость, тремор. Противопоказан при органических заболеваниях ЦНС.

ПИПОРТИЛ L4 (Piportil L4). Пальмитат пипотиазина в 2,5% растворе в масле. Нейролептик, оказывает пролонгированное действие на психотические процессы, ослабляет седативный эффект. Применяют при шизофрении при любой клинической картине, хроническом психозе с галлюцинациями; в детской психиатрии при детских психозах, дисгармонии развития, психозах скрытого периода. Вводят глубоко в/м (только в стационаре); средняя доза для инъекции 100 мг (3 мл раствора). Интервалы между инъекциями в среднем 4 нед. При хронических психозах - перорально в среднем 20-30 мг (20-30 капель) в день за один

прием. При стабилизации лечебного эффекта ежедневная доза может быть снижена до 10 мг (10 капель) в день. Противопоказан при закрытоугольной глаукоме, опасности задержки мочи.

ПИРАЗИДОЛ (Pyrazidolum). Синоним: Pirlindol. Антидепрессант с широким спектром терапевтического действия. Применяют при маниакально-депрессивных психозах, шизофрении с аффективными расстройствами, депрессивных состояниях, вызванных психическими расстройствами, протекающими с психомоторной заторможенностью, тревожно-депрессивным и тревожно-бредовым компонентом, анестетической, ипохондрической и неврозоподобной симптоматикой. Внутрь, начиная с 50-75 мг в день (в 2 приема), с постепенным увеличением дозы на 25-50 мг. Максимальный терапевтический эффект наблюдается при дозах 150-300 мг, при необходимости дозу увеличивают до 400 мг. При повышенной чувствительности возможны сухость во рту, потливость, головокружение, тахикардия, колебания АД, нарушение сна, мышечная гипотония, дизурические явления, которые быстро исчезают при уменьшении дозы. Противопоказан при острых воспалительных заболеваниях печени, заболеваниях крови, отравлениях наркотиками, снотворными и анальгетиками. Не следует применять одновременно с антидеп-

рессантами - ингибиторами моноаминоксидазы, а также в течение 2 нед после их отмены.

"ПИРАМЕИН" ("Pyrameinum"). Состав: амидопирина 0,3 г, кофеина 0,03 г. Применяют в качестве аналгезирующего и жаропонижающего средства при головной боли, невралгии, лихорадочных состояниях по 1 табл. 2-3 раза в день.

ПИРАНТЕЛЬ (Pyrantel). Синонимы: Combantrin, Pyrantel pamoat. Антигельминтное средство. Поражает мышцы кишечных паразитов, блокируя в них двигательные нервные окончания. Применяют при аскаридозе, энтеробиозе, анкилостомидозе. Назначают внутрь в таблетках или в виде суспензии однократно из расчета 10 мг/кг. При аскаридозе однократно по 5 мг/кг. При тяжелых формах некатороза дозу удваивают. В отдельных случаях возможны тошнота, рвота, понос. Противопоказан при беременности.

ПИРАЦЕТАМ (Pyracetamum). Оказывает положительное влияние на обменные процессы мозга. Применяют при хронических и острых нарушениях мозгового кровообращения, коматозных и субкоматозных состояниях после травм и интоксикаций головного мозга, заболеваниях ЦНС, сопровождающихся снижением интеллектуально-мнестических

функций; депрессиях различной этиологии, особенно резистентных к антидепрессантам; психоорганическом синдроме с преобладанием признаков астении и адинамии; в качестве вспомогательного средства при плохой переносимости нейролептиков с целью устранения или предотвращения вызываемых ими сомато-вегетативных, неврологических и психических осложнений; для купирования абстинентных, пре- и делириозных состояний при алкоголизме и наркоманиях, а также в случаях острого отравления алкоголем, морфином, барбитуратами и т.д. При тяжелых состояниях в/м или в/в 2-6 г/сут. При хронических состояниях 1,2-2,4 г/сут (иногда до 3,2 г/сут и более) в 3-4 приема. Возможны гиперстимуляция (повышенная раздражительность, возбудимость, нарушение сна), диспептические явления; у больных пожилого возраста изредка отмечается обострение стенокардии. Противопоказан при беременности, острой почечной недостаточности.

ПИРИДИТОЛ (Pyriditolum). Синонимы: Encephabol, Pyritinol. Положительно влияет на процессы метаболизма в ЦНС. Повышает устойчивость тканей мозга к гипрксии. Применяют при астенических, адинамических и неврозоподобных состояниях органического генеза, психоорганическом синдроме, травматической и сосудистой энцефалопатии; для

лечения остаточных явлений после нейроинфекций, травм и нарушений мозгового кровообращения; в комплексной терапии депрессивных состояний, резистентных к антидепрессантам, особенно в случаях, сочетающихся с сосудистой и другой органической недостаточностью ЦНС; при задержке психического развития, олигофрении; для лечения алкогольных абстиненций и курсового противорецидивного лечения больных алкоголизмом, особенно в случаях [illegible] ния астенических состояний. [illegible] качестве корректора при терапии [illegible] лептиками. Назначают внутрь [illegible] 30 мин после еды 2-3 раза в день [illegible] ний прием не позднее 17 ч). [illegible] для взрослых составляет 0,1-0,3 [illegible] тей - 0,05-0,1 г; суточная доза [illegible] лых 0,2-0,6 г (обычно 0,3-0,[illegible] г), для детей - 0,05-0,3 г. Курс при алкогольных абстиненциях до 1-3 мес, при остальных заболеваниях до 6-8 мес. При необходимости проводят повторные курсы через 1-6 мес. Возможны головная боль, тошнота, бессонница, раздражительность и нарушение сна. Противопоказан при выраженном психомоторном возбуждении, эпилепсии и состояниях повышенной судорожной готовности.

ПИРИДОКСАЛЬФОСФАТ (Pyridoxalphosphatum). Коферментная форма витамина B6 (пиридоксина)..Применяют

при тех же заболеваниях, при которых применяют пиридоксин (витамин B6), включая состояния, резистентные к действию последнего. Внутрь через 10-15 мин после еды, взрослым 3-5 раз в день по 0,02-0,04 г, детям по 0,01-0,02 г (до 0,06 г/сут). Парентерально взрослым вводят 1-3 раза в день в разовой дозе 0,005-0,01 г, в сутки 0,005-0,03 г, детям в зависимости от возраста до 0,005-0,001 г/сут. Доза и длительность курса лечения зависят от характера заболевания.

ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИД (*Piridocsini hydrochloridum*). Синонимы: витамин B6, пиривитол. Играет большую роль в обмене веществ. Применяют при алиментарной и вторичной недостаточности пиридоксина; токсикозах беременных; постэнцефалитном паркинсонизме и других его видах; хорее, судорожном синдроме у новорожденных; пеллагре (вместе с никотиновой кислотой); язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; гипохромной микроцитарной анемии; заболеваниях периферической нервной системы; лучевой болезни; остром и хроническом гепатите; себорейном и эксфолиативном дерматите, особенно у детей раннего возраста; опоясывающем лишае, нефродермитах; экссудативном диатезе; интоксикации при применении тубазида, фтивазида и других противотуберкулезных препаратов. Внутрь по 0,02-

0,05 г 1-3 раза в день; в/м и подкожно по 1-2 мл 1%, 2,5% и 5% раствора. Курс 1-3 мес. Возможна аллергическая реакция (крапивница и др.). Необходима осторожность при язвенной болезни и тяжелых заболеваниях печени (не более 0,025 г в день).

ПИРИЛЕН (Pirilenum. Синоним: Pempidini tosylas. Ганглиоб[illegible] применяемый при гипертонической [illegible] гипертонической энцефалопат[illegible] [illegible] периферических сосуд[illegible] [illegible] болезни желудка и двена[illegible] [illegible] кишки, токсикозе беремен[illegible] [illegible] 0,0025-0,005 г 3-4 раза [illegible] [illegible] разовая доза 0,01 г, су[illegible] [illegible] [illegible] взду[illegible] [illegible] Противопоказан при [illegible] [illegible] функции печени и по[illegible] [illegible] атеросклерозе, атонии [illegible] [illegible] шечника.

ПИРКОФЕН (Pyrcophenum). Состав: амидопирина 0,25 г, фенацетина 0,25 г, кофеина 0,05 г. Применяют при головной боли, невралгии, лихорадочных состояниях по 1 табл. 2-3 раза в день.

ПИРОГЕНАЛ (Pyrogenalum). Липополисахарид, образующийся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa и др. Применяют в качестве средства, оказывающего пиро-

генное действие, при сифилитических поражениях ЦНС; рубцах после ожогов; для стимуляции восстановительных процессов после заболеваний ЦНС и ПНС. В/м 1 раз в день или через 2-3 дня, начиная с 25 минимальных пирогенных доз (МПД), с постепенным повышением дозы до 50 МПД. Максимальная разовая доза 1000 МПД. Курс (25-30 инъекций) при необходимости повторяют, но не ранее чем через 2 мес. Максимальная доза для детей 500 МПД. Курс 10-15 инъекций. При передозировке возможны озноб, повышение температуры тела, головная боль, рвота, боль в пояснице. Противопоказан при лихорадочных заболеваниях; беременности. Необходима осторожность при гипертонической болезни и сахарном диабете.

ПИРОМЕКАИН (Pyromecainum). Средство, применяемое для поверхностной анестезии. В офтальмологической, оториноларингологической и хирургической практике в виде растворов. Разовая максимальная доза 1 г. Мазь пиромекаиновую 5% наносят тонким слоем (не более 1 г) на болезненный участок слизистой оболочки полости рта на 2-5 мин при воспалительных заболеваниях.

ПИРРОКСАН (Pyrroxanum). α-Адреноблокатор, оказывающий выраженное седативное действие. Применяют при

диэнцефальных кризах симпатикотонического характера, гипертонических кризах с гиперандреналинемией; для купирования морфинной и алкогольной абстиненции; при психических заболеваниях с тревожно-депрессивным синдромом. Внутрь по 0,015-0,03 г 1-4 раза в день, подкожно и в/м 1-2 мл 1% ра[illegible] можны выраженная гипотония, [illegible] кардия, усиление боли в серд[illegible] вопоказан при тяжелых формах [illegible] лероза с выраженной стенокард[illegible] рушении мозгового кровообра[illegible] сердечной недостаточности.

ПИТУИТРИН (Pituitrinum). [illegible] нальный препарат гипофиза. Оказ[illegible] окситоцическое, вазопрессорное и [illegible] диуретическое действие. Применяют [illegible] возбуждения и усиления сокращен[illegible] матки при слабой родовой деятельности, переношенной беременности, гипотонических кровотечениях и для нормализации инволюции матки. Назначают подкожно и в/м по 0,2-1 мл; при необходимости в/в капельно 1 мл в 500 мл 5% раствора глюкозы или очень медленно 1 мл в 40 мл 40% раствора глюкозы. Высшие дозы: разовая 2 мл, суточная 4 мл. Большие дозы могут вызвать спазм сосудов головного мозга, коллапс, нарушение гемодинамики. Противопоказан при выраженном атеросклерозе, миокардите, гипертонической болезни, тромбофлебите,

сепсисе, нефропатии беременных; наличии рубцов и угрозе разрыва матки, неправильном положении плода.

ПЛАЗМОЛ (Plasmolum). Препарат, получаемый из крови человека. Применяют как неспецифическое десенсибилизирующее и обезболивающее средство при невралгиях, невритах, радикулитах и других заболеваниях нервной системы, сопровождающихся болевым синдромом, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астме, хронических воспалительных процессах, артритах подкожно по 1 мл ежедневно или через день. Курс лечения 10 инъекций. Противопоказан при декомпенсации сердечной деятельности, нефрите, эндокардите.

ПЛАКВЕНИЛ (Plaquenil). Синонимы: Ereoquin, Renmoide. По составу и действию на организм аналогичен делагилу и применяются в тех же случаях. Назначают внутрь при малярии: в 1-й день 0,8 г и через 6-8 ч 0,4 г; во 2-й и 3-й дни по 0,4 г в один прием. При коллагенозах 0,4-0,8 г/сут. При длительном применении возможны такие же побочные явления, как и при лечении делагилом.

ПЛАНТАГЛЮЦИД (Plantaglucidum). Препарат, получаемый из водного экстракта листьев подорожника большого

(Plantago major L). Оказывает спазмолитическое и противовоспалительное действие. Применяют при гипацидном гастрите; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с нормальной и пониженной кислотностью (в период обострения и для профилактики рецидивов). Внутрь в виде [illegible] 2-3 раза в день за 20-30 мин до еды по 1/2-1 ч.л. в 1/4 стакана теплой воды. К[illegible] лечения в период обострения 3-4 [illegible] профилактики рецидивов по 1 [illegible] -2 раза в день в течение 1-2 ме[illegible]. П[illegible]оказан при гиперацидных гастрита[illegible] [illegible]ой болезни желудка с повышенной [illegible].

ПЛАТИФИЛЛИНА ГИДРОТАРТРАТ (Platyphyllini hydrotartras; [illegible]каменная соль алкалоида, содержащегося в крестовнике широколистном (Senecio platyphyllus D.C.). Оказывает преимущественно м-холинолитическое, а также сосудорасширяющее и успокаивающее действие. Применяют при спазмах гладкой мускулатуры органов брюшной полости, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астме, гипертонической болезни, коликах (кишечные, почечные) и др.; в офтальмологии для расширения зрачка. Внутрь по 0,0025-0,005 г 2-3 раза в день, подкожно 1-2 мл 0,2% раствора. Возможны сухость во рту, нарушение аккомодации, сердцебиение, затруднение мочеиспуска-

ния. Противопоказан при глаукоме, органических заболеваниях печени и почек.

ПЛАЦЕНТЫ ВЗВЕСЬ (Suspensio Placentae). Биогенный стимулятор, применяемый при заболеваниях глаз (кератиты, помутнение роговицы, ириты, помутнение стекловидного тела) и в других случаях, когда показано назначение биогенных стимуляторов. Подкожно по 2 мл (предварительно вводят 0,5% раствора новокаина) 1 раз в 7-10 дней. Детям дозу уменьшают в соответствии с возрастом. Курс (3-4 инъекции) можно повторить через 2-3 мес. Противопоказан при туберкулезных заболеваниях глаз, скрофулезе, некомпенсированной глаукоме, тяжелых заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы, беременности.

ПЛАЦЕНТЫ ЭКСТРАКТ (Extractum Placentae). Водный экстракт из консервированной на холоде плаценты человека. Биогенный стимулятор, применяемый при офтальмологических заболеваниях (блефарит, кератит и др.), миалгии, артритах, радикулитах, воспалительных заболеваниях. Подкожно по 1 мл ежедневно или через день

ПЛЕНКА КОЛЛАГЕНОВАЯ (Membrana collagenica). Готовят из раствора коллагена с добавлением хонсурида и стабилизаторов (фурацилина, борной

кислоты). Оказывает асептическое действие и ускоряет процессы регенерации. Применяют при неглубоких кожных ранах различного происхождения и локализации, трофических язв[illegible] вне стадии обострения, подготовке ран к операции - трансплантации кожи, [illegible] не донорских участков для пре[illegible] ран [illegible] аутотрансплантата от высыхания; [illegible] пролежнях различного происхожде[illegible]. С соблюдением правил асептики и [illegible] извлекают из упаковки, погружают в [illegible]нический раствор хлорида натрия или 0,25% раствор новокаина, затем накладывают на дефект кожи так, чтобы края пленки на 0,5 см выходили за пределы раны. Раневую поверхность предварительно обрабатывают перекисью водорода. Поверх пленки накладывают слой влажной, затем сухой марли и фиксируют повязку. Повязку смачивают раствором натрия хлорида 2 раза в сутки. Меняют ее по мере рассасывания пленки (через 2-3 дня). Противопоказана при обострении хронического тромбофлебита.

ПЛЕНКА ФИБРИННАЯ ИЗОГЕННАЯ (Membrana fibrinosa isogena). Белковый препарат из фибриногена плазмы донорской крови. Биологически активный пластический материал создающий при наложении на раневую поверхность благоприятные условия для регенерации тканей и тем самым способствующий бы-

строму заживлению ран, оказывает обезболивающее и кровоостанавливающее действие, предохраняет рану от механических повреждений и проникновения инфекции. В нейрохирургической практике применяют для замещения дефектов твердой мозговой оболочки; в практике общей хирургии - для предотвращения спаечного процесса при различных полостных операциях; для закрытия обширных скальпированных ран или дефектов кожных покровов, возникших в результате травматических повреждений, ожогов, а также для лечения трофических язв. После обработки пленку накладывают на рану, затем удаляют покрывающий пленку целлофан. При замещении твердой мозговой оболочки пленку выкраивают по форме дефекта и укладывают целлофаном вверх прямо на мозг, затем целлофан снимают. При операциях на кишечнике пленку укладывают в виде муфты и фиксируют кетгутом. Нецелесообразно использовать при обильном гнойном отделяемом из раны, а также при глубоких ожогах до отделения некротических тканей.

ПОДОРОЖНИКА ЛИСТ (Folium Plantaginis). Содержит слизь, пектиновые вещества, гликозид аукубин, витамины К и С, дубильные вещества, флавоноиды, органические кислоты. Настой листьев подорожника (10,0:200,0) применяют как отхаркивающее средство по 1 ст.л. 3-

4 раза в день; сок подорожника при хронических анацидных гастритах и колитах по 1 ст.л. 3-4 раза в день за 15-30 мин до еды.

ПОДОФИЛЛИН (Podophyllinum). Смесь природных соединений, получаемая из корневищ с корнями подофилла щитовидного (Podophyllum peltatum). Содержит подофиллотоксин (не менее 40%), α- и β-пелтатины. Обладает цитотоксической активностью и блокирует митозы на стадии метафазы. Подавляет пролиферативные процессы в тканях и тормозит развитие папиллом. Применяют при папилломатозе гортани у детей и взрослых, папилломах мочевого пузыря, небольших, типичных папиллярных фиброэпителиомах, локализирующиеся в любых отделах мочевого пузыря; для профилактики рецидивов в сочетании с эндовезикальной и чреспузырной электрокоагуляцией папиллом. При папилломатозе у детей вначале удаляют папилломы хирургическим путем, а затем 1 раз в 2 дня смазывают участки слизистой оболочки на месте удаления 15% спиртовым раствором подофиллина. Курс 14-16 смазываний (детям до 1 года применять препарат с осторожностью). У взрослых смазывают 30% спиртовым раствором 10 раз, затем удаляют папилломы и вновь смазывают 20 раз. При отсутствии воспалительной реакции смазывают ежеднев-

но, при наличии воспалительной реакции - 1 раз в 2-3 дня. В мочевой пузырь вводят через катетер 1%, 4%, 8% или 12% суспензию подофиллина в вазелиновом масле в количестве 100 мл на 30-40 мин или на 1-2 ч с недельным перерывом. При введении в мочевой пузырь возможны боль внизу живота, жжение в области мочевого пузыря, расстройство мочеиспускания (учащение и боль). При лечении папилломатоза гортани могут наблюдаться тошнота, рвота и расстройство функций желудочно-кишечного тракта (понос и т.д.). Приготовление растворов и взвесей рекомендуется проводить в очках.

ПОЛИАМИН (Polyaminum). Водный раствор, содержащий 13 L-аминокислот (аланин, аргинин, валин, гистидин, глицин, изолейцин, лизин, триптофан и др.) и D-сорбит. Способствует положительному азотистому балансу, устранению или уменьшению белковой недостаточности. Применяют как средство для парентерального белкового питания при гипопротеинемиях различного происхождения, при невозможности или резком ограничении приема пищи обычным путем в до- и послеоперационном периоде, при обширных ожогах, особенно при ожоговом истощении, травмах, переломах, нагноительных процессах, функциональной недостаточности печени и др. Вводят в/в капельно. Начальная скорость инфузии

(в течение первых 30 мин) 10-20 капель в минуту, затем темп вливания увеличивается до 25-35 капель в минуту. Для введения каждых 100 мл препарата требуется не менее 1 ч. Суточная доза от 400 до 1200 мл ежедневно в течение 5 дней и более. Одновременно с полиамином следует вводить растворы глюкозы [illegible] 0,5 г/кг массы тела в 1 ч) и витамины [illegible]. При превышении скорости введения [illegible] возможны гиперемия лица [illegible] жара, головная боль, тошнота [illegible].

ПОЛИГЛЮКИН ([illegible]num). Стерильный раствор средне[illegible] ной фракции частично гидро[illegible] декстрана в 0,9% изотоническом [illegible] ре хлорида натрия. Плазмоза[illegible] противошоковый препарат, применяемый при шоке (операционный, травматический, постгеморрагический), ожогах, значительных потерях крови. В/в до 1 л/сут. Противопоказан при повышении внутричерепного давления при травмах черепа; кровоизлиянии в мозг; сердечной недостаточности; заболеваниях почек.

ПОЛИМИКСИНА "В" СУЛЬФАТ (Polymyxini "B" silfas). Антибиотик, продуцируемый Bac. polymyxa. Высокоактивен в отношении грамотрицательных микроорганизмов (большинство штаммов синегнойной палочки и эшерихий, клебсиеллы, иерсинии, энтеробактер, сальмо-

целлы, шигеллы, гемофильная палочка, бруцеллы); не действует на микроорганизмы, расположенные внутриклеточно. Применяют при инфекциях, вызванных Ps. aeruginosa (сепсис, менингит, пневмония, абсцесс легкого, инфекции мочевыводящих путей, инфицированные ожоги и др.), а также при инфекциях желудочно-кишечного тракта. В/м, в/в (капельно) и внутрь. В/м вводят в дозе 0,5-0,7 мг/кг 3-4 раза в день (не более 200 мг/сут). Детям по 0,3-0,6 мг/кг 3-4 раза в день. Для в/в введения 25-50 мг препарата растворяют в 200-300 мл 5% раствора глюкозы и вводят капельно со скоростью 60-80 капель в минуту. Максимальная суточная доза для взрослых не выше 150 мг. Для детей - в/в по 0,3-0,6 мг/кг после разведения в 30-100 мл 5-10% раствора глюкозы. При нарушении функции почек дозу уменьшают. Внутрь препарат применяют в виде водного раствора. Проявляет нефротоксическое и нейротоксическое побочное действие; иногда наблюдается блокада нервно-мышечной проводимости (в тяжелых случаях остановка дыхания). Опасность токсических реакций возрастает при нарушении выделительной функции почек. Возможны аллергические реакции, при приеме внутрь - тошнота и снижение аппетита. Противопоказан при нарушении функции почек, миастении, повышенной чувствитель-

сти к препарату. Недопустимо применение совместно с курареподобными и курарепотенцирующими средствами, а также с антибиотиками группы аминогликозидов (стрептомицин, мономицин, канамицин и др.).

ПОЛИМИКСИНА "М" СУЛЬФАТ (Polymyxini "M" sulfas). Антибиотик, продуцируемый одним из штаммов Bac. polymyxa. Активен в отношении грамотрицательных бактерий (эшерихии, шигеллы, сальмонеллы, синегнойная палочка). При введении внутрь слабо всасывается из желудочно-кишечного тракта, в связи с чем эффективен только при лечении кишечных инфекций и местно. При местном применении малотоксичен. Применяют при инфекционных энтероколитах, дизентериях, а также местно при инфицированных ожогах, вяло заживающих ранах, пролежнях, некротических язвах, гнойных отитах и др. Внутрь в течение 5-10 дней по 500 000- 1 000 000 ЕД 4-6 раз в сутки. Суточная доза 2 000 000-3 000 000 ЕД. Для детей суточная доза 100 000 ЕД/кг массы тела в 3-4 приема. Местно применяют мазь, содержащую 2 мг антибиотика в 1 г мазевой основы, или раствор (10 000-20 000 ЕД/мл изотонического раствора хлорида натрия или 0,5-1% раствора новокаина). Суточная доза 15 000-20 000 ЕД/кг. Длительное применение может вызвать изме-

нения в почках. Противопоказан при функциональных и органических поражениях почек.

ПОЛИМИНЕРОЛ (Polymineroll). Стандартизованный в коллоидном и солевом соотношении раствор маточника Поморийского озера, содержащий соли магния (преобладают), кальция, хлора, фтора, брома, железа и др. Применяют в стоматологической практике (при гингивите, пиорее, сопровождающихся кровоточивостью) в виде полосканий или повязок в смеси с флетчером.

ПОЛИСПОНИН (Polysponinum). Сухой экстракт из корневищ с корнями диоскореи японской (Dioscorea nipponica Marino). Содержит водорастворимые стероидные гликозиды (сапонины). Оказывает умеренное гипохолестеринемическое действие. Применяют при атеросклерозе сосудов головного мозга, сосудов сердца и при сочетании атеросклероза с гипертонической болезнью. Внутрь после еды по 0,1 г 2-3 раза в день в течение 20-30 дней, через 7-10 дней цикл повторяют. Курс не менее 3 мес. После 4-6- месячного перерыва курс можно повторить. При длительном приеме больших доз возможны кожный зуд, потливость, потеря аппетита.

"ПОЛИФЕР" ("Polypherum"). Наряду с гемодинамической функцией обла-

дает способностью стимулировать гемопоэз. При в/в введении полифера в дозе 400-1200 мл увеличивается объем циркулирующей плазмы без нарушения кислотно-основного состояния, электролитного равновесия, белкового состава и свертывающей системы крови. Противопоказан при шоке, развивающемся в результате травмы, острой кровопотере, операционном шоке, сопровождающемся выраженной кровопотерей, в послеоперационном периоде с целью профилактики шока и стимуляции гемопоэза. Вводят с гемотрансфузиями для восполнения кровопотери при плановых и экстренных операциях. В/в капельно или струйно. Дозы и скорость введения выбирают в соответствии с показаниями к применению и состоянием больного (артериальное и венозное давление, частота пульса и дыхания). Разовая доза 400-1200 мл. При необходимости количество вводимого препарата можно увеличить до 2000 мл. Препарат применяют только в стационарных условиях или в реанимационных отделениях поликлиник. После первых 10 и последующих 30 капель необходимо сделать перерыв на 3 мин для биологической пробы. В случае развития аллергических реакций (уртикарные высыпания, кожный зуд, отек типа Квинке, учащение пульса, снижение АД и повышение температуры тела) введение

полифера прекращают. Противопоказан при травме черепа, протекающей с повышенным внутричерепным давлением, а также во всех случаях, когда противопоказано в/в введение больших доз жидкости (отек легких, отечно-асцитический синдром другой этиологии).

ПОЛУДАН (Poludanum). Биосинтетический полирибонуклеотидный комплекс полиадениловой и полиуридиловой кислот (в эквимолярных соотношениях). Обладает интерфероногенной и противовирусной активностью. Применяют при вирусных заболеваниях глаз у взрослых: аденовирусных и герпетических конъюнктивитах, кератоконъюнктивитах, кератитах и кератоиридоциклитах (кератоувеитах), иридоциклитах, хориоретинитах, невритах зрительного нерва. Применяют в виде глазных капель. Раствор полудана, предназначенный для инстилляций в глаз, готовят путем растворения содержимого ампулы (200 мкг порошка) в 2 мл дистиллированной воды. Готовый раствор может быть использован в течение 7 дней. Для лечения конъюнктивитов и поверхностных кератитов раствор закапывают в конъюнкитивальный мешок больного глаза 6-8 раз в день. По мере стихания воспалительных явлений число инстилляций сокращают до 3-4 раз в день. Для субконъюнктивальных введений содержимое ампулы ex tempore рас-

...дают. Противопоказан...
...протекающей с повы...
...сным давлением, ...
...аях, когда противопо...
...е больших доз жидк...
...отечно-асцитическ...
...ологии).

...danum). Биосинт...
...уклеотидный ком...
... и полиуридилов...
...ных соотношени...
...оногенной и проти...
...стью. Применяют п...
...аниях глаз у взросл...
...ерпетических конъю...
...конъюнктивитах, к...
...идоциклитах (кера...
...иклитах, хориорет...
...тельного нерва. При...
...зных капель. Ра...
...значенный для инъ...
...овят путем раствор...
...улы (200 мкг пор...
...ованной воды. Гот...
...ть использован и ...
...ечения конъюнкти...
...кератитов раств...
...онкитивальный ...
...8 раз в день. ...
...тельных явлений ...
...ращают до 3-4 ...
...ъюнктивальны...
...ампулы ex tem...

творяют в 1 мл воды для инъекций и вводят по 0,5 мл (100 мкг) под конъюнктиву глаза ежедневно или через день. На курс по 15-20 инъекций. Препарат в виде субконъюнктивальных инъекций используют также для лечения глубоких кератитов, кератоиридоциклитов и поражений внутренних оболочек глаза вирусного генеза.

ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ТРАВА (Herba Absinthii). Содержит гор[illegible] щества (абсинтин и анабсинтин), эфир[illegible]ное масло (0,5-2%), дубильные [illegible]ва, флавоноид артемизетин и др. При[illegible]няют в качестве средства, повышающего аппетит и улучшающего пищеварение, при понижении функции желу[illegible]шечного тракта: за 30 мин до еды 3 раза в день настой (10,0:200,0) по 1 ст.л. или настойку по 15-20 капель.

ПОСТИНОР (Postinor). Одна таблетка содержит 0,75 мг D-норгестрела. Принятый непосредственно после полового акта D-норгестрел в дозе 0,75 мг способен предупредить нежелательную беременность. Рекомендуется для предупреждения беременности женщинам, не живущим регулярной половой жизнью (при частоте половых актов не более 1 раза в неделю и соответственно 4 раза в месяц). Внутрь 1 табл. обязательно в течение часа после полового акта. Новую дозу (1 табл.) необходимо принять в том слу-

час, если половой акт повторится по истечении 3 ч (если в течение 3 ч, то прием второй таблетки не нужен). При многократных половых актах препарат следует принимать по схеме: 1 табл. после первого акта, 1 табл. спустя 3 ч и 1 табл. через 24 ч после первого акта. В некоторых случаях возможны тошнота и кровотечение. Противопоказан при заболевании печени и желчевыводящих путей, желтухе во время беременности в анамнезе.

ПОЧЕЧНОГО ЧАЯ ЛИСТЬЯ (Folium Orthosiphonis). Содержат: тритерпеновые сапонины, гликозид ортосифонин, 5-6% дубильных веществ. Применяют как диуретическое средство до еды при заболеваниях почек, отеках на почве недостаточности кровообращения, при холециститах (как умеренное спазмолитическое средство) после еды в виде настоя (3,5:200,0) в теплом виде по полстакана 1-2 раза в день.

ПРАЗОЗИН (Prazosinum). *Синонимы:* Adversuten, Furazosinhydrochlorid, Hypovase, Minipress, Pratsiol, Sinetens и др. α-Адреноблокирующий препарат, угнетает фермент фосфодиэстеразу, что способствует расслаблению гладкой мускулатуры сосудов и приводит к понижению АД и уменьшению периферического сопротивления сосудов. Применяют при артериальной гипертензии любого проис-

хождения, застойной сердечной недостаточности. В первые дни принимают по 0,5 мг перед сном. Далее назначают по 1 мг 3-4 раза в день. Постепенно [illegible] увеличивают, добиваясь гипотензивного эффекта. Стойкое понижение АД может развиться через 4-8 нед. Поддерживающая доза подбирается индивидуально [illegible] от 3 до 20 мг/сут, чаще 6-15 мг [illegible]. Суточную дозу принимают в 3-4 приема. При назначении монотерапии [illegible] следует учитывать возможность [illegible] ранней (на 3-5-й день) или поздней (через несколько месяцев) толерантности (привыкания) к препарату. Это требует увеличения разовой дозы празозина на 1 мг или больше либо назначения диуретиков. При недостаточном или медленно развивающемся гипотензивном эффекте комбинируют с диуретиками или другими антигипертензивными средствами (дозу уменьшают до 1-2 мг 3 раза в день при одновременном добавлении препарата, который вводят в схему лечения, а затем вновь постепенно повышают, подбирая необходимый режим лечения). Длительность лечения не ограничивается. При застойной сердечной недостаточности празозин назначают в дозе 3-20 мг в день в 3-4 приема. В течение 1-2 ч после приема первой дозы празозина возможна коллаптоидная реакция с потерей сознания (обморок). Во избежание этого ос-

ложнения первую дозу принимают перед сном. Коллаптоидное состояние может развиться при быстром повышении дозы празозина или при введении в лечебную схему других антигипертензивных средств, в том числе диуретиков. Возможны также головная боль, головокружение, сонливость, раздражительность, депрессия, сердцебиение, слабость, тошнота, сухость во рту и др. Обычно побочные явления исчезают самостоятельно без понижения дозы, если этого не происходит, то следует уменьшить дозу или отменить препарат. Противопоказан при индивидуальной непереносимости препарата. Не назначают беременным и детям.

ПРЕГНИН (Praegninum). Синонимы: Pregnoral, Progestoral. Синтетический аналог прогестерона; сходен с ним по биологическому действию, но несколько менее активен. Применяют при нарушениях функции яичников, связанных с недостаточностью желтого тела (дисфункциональные маточные кровотечения, аменорея, гипо- и олигоменорея, альгоменорея, бесплодие и др.). Сублингвально по 0,01-0,02 г 2-3 раза в день. При необходимости до 0,05-0,06 г в день и комбинации с андрогенами. Высшие дозы (для взрослых): разовая 0,02 г, суточная 0,06 г.

ПРЕГЭСТЕРОЛ (Praegoestrolum). Гормональный препарат, содержащий и

одной таблетке прегнина 0,01 г, этинилэстрадиола 0,00001 г. Применяют при климактерическом синдроме по 1-2 табл в день в течение 15-20 дней. Лечение повторяют после 2-3 недельного перерыва. Возможны диспепсические [illegible]. Не рекомендуется применение [illegible] с опухолями, а также [illegible] перенесшим операцию на [illegible] при частично сохраненных [illegible] ганах.

ПРЕДИАН (Predian). [illegible] Gliclazid, Diamicron. [illegible] ность и агрегацию тромбоцитов [illegible] шает фибринолитическую [illegible]. Применяют для лечения сахарного диабета в пожилом возрасте, [illegible] емого только диетой. Доза устанавливается в зависимости от индивидуальной реакции. Назначают внутрь, начиная с 0,04-0,08 (1/2 табл. - 1 табл.), [illegible] щают до достижения адекватного контроля. Взрослым обычно назначают от 0,04 до 0,32 г. Одновременное применение сульфаниламидов, фенилбутазона, салицилатов, производных пиразолона и β-блокаторов потенцирует гипогликемизирующее действие предиана. Возможны тошнота, головная боль, сыпь, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, гипогликемия. С осторожностью назначают больным с нарушениями функции печени и почек.

[illegible]ДНИЗОЛОН (Prednisolonum). [illegible] Dacortin, Metacortalon, [illegible], Prenolone. Дегидрированный [illegible] гидрокортизона; по активности и [illegible] близок к преднизона ацетату. [illegible] в тех же случаях, что и кор[illegible] [illegible], внутрь по 0,025-0,05 г/сут [illegible], затем дозу уменьшают до [illegible] 0,0025 г. Высшая разовая доза [illegible] 0,015 г, суточная 0,1 г. При [illegible] недостаточности надпочечников, шоке и в других неотложных случаях, требующих немедленного повышения уровня кортикостероидов в крови, вводят в/в по 0,03 г в 1 мл. Наружно в виде 0,5% мази при кожных заболеваниях (экзема, эритродермия и др.). В офтальмологии (аллергические заболевания глаз и др.) в виде капель (0,3% раствор). Побочное действие и противопоказания те же, что и для кортизона ацетата.

ПРЕДНИЗОЛОН ГЕМИСУКЦИНАТ (Prednisolonhemisuccinas). Синоним: Di-Adresson. Глюкокортикоидный гормональный препарат. Влияет на углеводный, белковый и жировой обмен, способствует накоплению гликогена в печени, тормозит выведение натрия и воды из организма и способствует удалению калия. Применяют при острых аллергических реакциях, бронхиальной астме и астматическом статусе, для профилактики и лечения тиреотоксической реакции и ти-

реотоксического криза, для лечения шока (посттравматического, послеоперационного, токсического, ожогового, кардиогенного и др.), при инфаркте миокарда, при острой недостаточности надпочечников, при острой печеночно-почечной недостаточности, при инфекционно-аллергическом миокарде, ревматоидном и деформирующем артрозе, при системной красной волчанке, при циррозе печени и остром гепатите. В/в (струйно или капельно) или в/м. Содержимое ампулы (25 мг) растворяют в 5 мл воды для инъекций. При капельном введении полученный раствор добавляют к 0,25–0,5 л изотонического раствора хлорида натрия, 5% раствора глюкозы или полиглюкина. Число капель в минуту (25–70) зависит от исходного АД и скорости его восстановления. Обычно вводят вначале в/в струйно, затем капельно. В зависимости от заболевания и его тяжести лечение преднизолонгемисукцинатом проводят по специальным схемам в условиях скорой помощи и в стационарах (см. инструкцию по применению). Растворы препарата несовместимы с тетрациклинами, окситетрациклином, левомицетином. Может вызвать нарушение электролитного обмена, гипергликемию, гликозурию, психические расстройства, повышение АД, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и др.

...тельное применение может привести к угнетению функции коры надпочечников и стероидной зависимости. Противопоказан при активной форме туберкулеза, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых психозах и хронических психических заболеваниях в стадии обострения, декомпенсированной сердечной недостаточности, гипертонической болезни II-III стадии, декомпенсированном сахарном диабете, тромбофлебите, недостаточности выделительной и реабсорбционной функции почек, беременности.

ПРЕДНИЗОНА АЦЕТАТ (*Prednisoni acetas*). *Синонимы:* Decortin, Dehydrocortison, Metacorten. Глюкокортикостероид; по действию аналогичен кортизона ацетату, но активнее в 3-5 раз. Назначают внутрь. Начальная доза для взрослых 0,025-0,05 г в день (в 2-3 приема), затем дозу уменьшают до 0,01-0,0056-0,0028 г. Высшая разовая доза для взрослых 0,015 г, суточная 0,1 г. Показания к применению, побочные действия и противопоказания те же, что и при применении гидрокортизона ацетата.

ПРЕПАРАТ АСД (*Preparatum ASD*). Антисептическое средство, получаемое из ткани животных. Стимулирует регенерацию эпидермиса. Наружно для компрессов при экземах.

ПРЕСОЦИЛ (Presocyl). Состав: преднизолона 0,75 мг, хлорохина фосфата 40 мг, кислоты ацетилсалициловой 200 мг. Применяют при хронических ревматических процессах (полиартрит, мышечный ревматизм) и воспалительных процессах опорно-двигательного аппарата по 1-2 табл. 2-3 раза в день.

ПРЕФИЗОН (Prefyson). Стандартизированный комплексный экстракт передней доли гипофиза. Применяют при болезни Дауна, кахексии Симмондса, гипофизарном ожирении, адипозогенитальной дистрофии, гипогенитализме и др. Подкожно и в/м (при необходимости внутривенно с водой для инъекций или 5% раствором глюкозы) по 1-2 мл в день.

ПРЕФУЗИН (Prefusinum). Гель, содержащий фузидиевую кислоту и преднизолон. Оказывает антибактериальное, противовоспалительное и десенсибилизующее действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков (стафилококки, в том числе множественноустойчивые, менингококки, гонококки) и некоторых грамположительных бактерий (коринебактерии, клостридии). Менее активен в отношении стрептококков, пневмококков. Назначают взрослым при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, вызываемых чувст-

чительными к фузидиевой кислоте микроорганизмами (поверхностные стрептостафилодермии, фолликулиты, фурункулез, инфицированные ссадины, микробная экзема), а также при идиопатической экземе, нейродермите, почесухе, пузырчатых дерматозах, осложненных вторичной инфекцией. Наносят на пораженную поверхность кожи тонким слоем 1-2 раза в день после удаления гноя и некротических масс. Курс 7-14 дней. Возможны гиперемия, зуд кожи и аллергические реакции (сыпь). Противопоказан при повышенной индивиадуальной чувствительности фузидиевой кислоте и преднизолону; грибковых и сифилитических заболеваниях кожи, кожных реакциях после вакцинации, беременности не назначают детям.

ПРИМАХИН (*Primachinum*). Синонимы: Avlon, Neo-Quipenyl. Оказывает антипротозойное действие на половые формы, шизонты и параэритроцитарные формы всех видов малярийных плазмодиев. Применяют при трехдневной четырехдневной и тропической малярии; для профилактики отдаленных рецидивов. Внутрь, суточная доза для взрослых 0,027 г (27 мг). Курс 14 дней. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом. Возможны боль в животе, диспептические явления, общая слабость, боль в области сердца, цианоз, метгемог-

лобинемия, анемия, лейкопения, гемолиз эритроцитов. Противопоказан при заболеваниях крови и кроветворных органов, болезнях почек, стенокардии, ревматизме, системной красной волчанке. Нельзя назначать одновременно с препаратами, угнетающими кроветворение.

ПРОГЕСТЕРОН (Progesteronum). Синонимы: Progestin, Progelan. Синтетический гормон желтого тела. Применяют при аменорее, ановуляторных маточных кровотечениях, бесплодии, недоношенной беременности, альгоменорее на почве гипогенитализма. В/м или подкожно по 1 мл 1% или 2,5% раствора в течение 6-8 дней. При угрожающем выкидыше вводят по 1 мл 1% раствора ежедневно или через день до полного исчезновения симптомов указывающих на возможность выкидыша; при привычном аборте вводят до IV месяца беременности. Высшая доза для взрослых 2,5 мл 1% раствора или 1 мл 2,5% раствора.

ПРОДИГИОЗАН (Prodigiosanum). Высокополимерный липополисахаридный комплекс, выделенный из макроорганизмов. Оказывает неспецифическое стимулирующее действие. Применяют в комплексном лечении вяло заживающих трофических язв, для ускорения развития грануляций, устранения отечности тканей после операций. Вводят в/м. Дозу ус-

...анавливают индивидуально. Для взрослых 25-100 мкг (0,5-2 мл 0,005% раствора) на инъекцию. Для детей - начиная с 10-20 мкг, но не более 50-75 мкг. Возможны повышение температуры тела, головная боль, общее недомогание. Противопоказан при поражениях ЦНС, острой коронарной недостаточности, инфаркте миокарда.

ПРОЗЕРИН (*Prozerinum*). Синонимы: *Neostigmini methylsulfas*, *Prostigmin methilsulfate*. Обладает выраженной антихолинэстеразной активностью. Применяют при миастении, парезах и параличах; в восстановительный период после менингита; при атрофизе зрительного нерва, невритах; глаукоме; для профилактики и лечения атонии желудка, кишечника, мочевого пузыря, стимулирования родов; как антидот миорелаксантов. Внутрь по 0,015 г 2-3 раза в день; подкожно по 1 мл 0,05% раствора 1-2 раза в сутки; в офтальмологии по 1-2 капли 0,5% раствора 1-4 раза в сутки. Высшая разовая доза внутрь 0,015 г, суточная 0,05 г; под кожу разовая 0,002 г, суточная 0,006 г. Детям внутрь в гранулах из расчета до 10 лет по 0,001 г на 1 год жизни в сутки, старше 10 лет - не свыше общей суточной дозы 0,01 (10 мг). Под кожу 0,05 мг (0,1 мл 0,05% раствора) на 1 год жизни, но не больше 0,75 мл 0,05% раствора. Возможны брадикардия, понижение АД, сла-

бость, гиперсаливация, усиление бронхиальной секреции, тошнота, рвота, подергивание мышц языка и скелетной мускулатуры. Противопоказан при эпилепсии, гиперкинезах, бронхиальной астме, стенокардии, выраженном атеросклерозе.

ПРОКТО-ГЛИВЕНОЛ (Procto-Glyvenol). Эффективное средство для лечения геморроя, приводит к быстрому улучшению тягостных геморроидальных симптомов. Применяют при наружных и внутренних геморроидальных узлах по 1 дозе (1 г) крема или 1 свече утром и вечером до исчезновения острых симптомов; позднее суточную дозу сокращают до одноразового применения крема или 1 свечи. При внутренних геморроидальных узлах крем можно вводить с помощью прилагаемой к упаковке навинчивающейся насадки. Противопоказан при повышенной чувствительности к активным веществам препарата – трибенозиду и лидокаину.

ПРОКТОСЕДИЛ (Proctosedyl). Состав: фрамицетин сульфат, гидрокортизон ацетат, эскулосид, этил аминобензоат. Применяют при внутреннем и наружном геморрое, анальном зуде, перианальной экземе, проктите, трещинах. Отдельно мазь или вместе с ректальными капсулами, которые вставляют утром, вечером и после каждого стула. Противопоказан

при повышенной чувствительности к любому из компонентов.

ПРОЛОТЕСТОН (Prolotestonum). Смесь 2-α-метилдигидротестостерона и его эфиров: пропионового (т.е. медротестрона пропионата), капронатового и энантового (в соотношении 1:2:4:7). Обладает андрогенными и анаболическими свойствами. Оказывает пролонгированное действие. Применяют при распространенных формах первичного рака молочной железы (рецидивы и метастазы опухоли). Назначают женщинам с сохраненным менструальным циклом или при менопаузе до 5 лет. Более эффективен после двусторонней овариэктомии или подавления функции яичников в результате облучения. В/м по 0,35 г (350 мг) или 0,7 (700 мкг) (1-2 мл 35 % раствора) 1 раз в 2 нед в течение длительного времени. Лечение прекращают при прогрессировании заболевания на фоне проводимой терапии или резко выраженных побочных реакциях. Препарат можно применять в сочетании с противоопухолевыми лекарственными средствами. Возможны огрубение голоса, избыточный рост волос (чаще на коже лица), увеличение массы тела; при длительном лечении - токсический гепатит, гиперкальциемия и гиперкальциурия, при возникновении ко торых препарат отменяют и назначают соответствующее

лечение. Противопоказан при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, гипертонический криз и т.д.), печени, почек и других органов; гиперкальциемии и гиперкальциурии.

ПРОМЕДОЛ (Promedolum). Активный анальгетик. По влиянию на ЦНС близок к морфину. Применяют при травмах, заболеваниях, сопровождающихся сильными болевыми ощущениями; в предоперационный и послеоперационный период; при стенокардии, инфаркте миокарда, злокачественных новообразованиях и др.; для обезболивания родов. Внутрь по 0,025-0,05 г, под кожу 1-2 мл 1% раствора, в/в 1 мл 1% раствора; детям (старше 2 лет) по 0,003-0,01 г на прием в зависимости от возраста. Высшая разовая доза для взрослых 0,05 г, суточная 0,16 г. Побочные действия и противопоказания те же, что и при применении препаратов морфина.

ПРОПАЗИН (Propazinum). Синонимы: Promilene, Protactyl. По действию на организм аналогичен аминазину, но менее токсичен и уступает по силе седативного и антипсихотического эффекта. Применяют при тех же показаниях, что и аминазин, особенно при более легком течении заболевания, а также у ослабленных больных; в детском и пожилом возрасте. Внутрь после еды по 0,025-0,05 г

[illegible] в/м по 2-3 мл 2,5% раствора [illegible] 2-3 раза в день) в 5 мл 0,25-0,5% раствора новокаина или изотонического раствора натрия хлорида; в/в по 1-2 мл 2,5% раствора в 10 мл 40% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида. Дозы постепенно увеличивают до 0,4-0,6 г в день. Максимальная суточная доза 1-2 г. Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении аминазина.

ПРОПЕР-МИЛ (Proper-Myl). Лиофилизированный препарат, представляющий собой комплекс грибов-сахаромицетов (Cryptococcus albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae). Применяют при рассеянном склерозе. В/в ежедневно, начиная с 0,1 мл свежеприготовленной суспензии, с постепенным повышением дозы на 0,1 мл, а через неделю на 0,2 мл и доведением до 2,5-3 мл. Курс (30-40 дней) через 3-4 мес может быть повторен.

"ПРОПОСОЛ" АЭРОЗОЛЬ ("Proposolum" aerosolum). Состав: прополиса 6 г, глицерина 14 г, спирта этилового 95% 80 г и пропеллент. Противовоспалительное, дезинфицирующее и болеутоляющее средство. В стоматологической практике применяют при катаральных гингивитах и стоматитах, язвенных стоматитах и других воспалительных заболеваниях

полости рта. Орошают воспаленную область 2-3 раза в день.

"ПРОПОЦЕУМ" (Propoceum). Мазь экстракта прополиса (пчелиный клей). Оказывает противозудное действие, вызывает аналгезию слизистых оболочек и кожи, обладает противовоспалительным свойством. Применяют в качестве дополнительного средства лечения при хронической экземе, нейродермитах, зудящих дерматозах, длительно не заживающих ранах и трофических язвах. При заболеваниях кожи наносят 1-2 раза в сутки, при лечении ран или трофических язв - ежедневно или через день. Возможна индивидуальная непереносимость. Противопоказан при аллергии к продуктам пчеловодства, острой экземе.

ПРОСПИДИН (Prospidinum). Оказывает противоопухолевое, противовоспалительное и гипотензивное действие. Применяют при раке гортани, метастазах меланомы кожи, лимфосаркоме, саркоме Капоши, ретинобластоме (в сочетании с лучевой терапией). В/м, в/в или местно (в виде мази). Для в/м введения растворяют в 2 мл, а для в/в - из расчета 100 мг в 5 мл. Растворы готовят непосредственно перед инъекцией. Детям из расчета 3 мг препарата на 1 кг массы тела. Общая доза на курс - 1000-3000 мг в зависимости от массы тела ребенка, взрослым 2-3,5 г.

[illegible] оперативного удаления папиллом, локализующихся в глотке, рекомендуется смазывать раневую поверхность [illegible] в течение 7-10 дней. Возможны [illegible], головокружение, головная боль, [illegible] вертебробазилярная сосудистая недостаточность, появление [illegible] цилиндров в моче, повышение [illegible] мочевины и креатинина в [illegible] крови. Противопоказан при [illegible] нарушении функции почек, вертебробазилярной сосудистой недостаточности, глубоком угнетении кроветворения (лейкопения ниже $2 \cdot 10^9$/л, тромбоцитопения ниже $100 \cdot 10^9$/л).

ПРОТАРГОЛ (*Protargolum*). Синоним: *Argentum proteinicum*. Применяют в качестве вяжущего, антисептического и противовоспалительного средства наружно при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек верхних дыхательных путей (1-5% раствор), мочевыводящих путей, конъюнктивитах, бленорее (1-3% раствор).

ПРОТЕИН (*Proteinum*). Белковый препарат изогенной человеческой плазмы с содержанием 4,3-4,8% белка. Повышает АД, способствует удержанию тканевой жидкости в кровяном русле. Применяют при травматическом и операционном шоке, гипопротеинемии и гипоальбуминемии различного происхождения; как специфическое противоанемическое средст-

во. В/в капельно; при хронич[illegible]
протеинемии ежедневно [illegible]
Разовая доза 250-400 мл [illegible]
марная 1000-3000 мл. [illegible]
в/в или внутриартериально [illegible]
для быстрого поднятия АД [illegible]
за зависит от состояния больного [illegible]
достигнуть 1 1/2-2 л. При анемии пре-
рат применяют в виде курса [illegible]
по 250-500 мл. Возможны аллергические
реакции (озноб, тошнота, рвота). Противопоказан при кровоизлиянии в мозг, тромбоэмболии, сердечной недостаточности, гипертонической болезни II-III стадии.

ПРОТИОНАМИД (Protionamidum). Синоним: Treventix. Обладает противомикробной активностью в отношении микобактерий туберкулеза. По химическому составу и эффективности близок к этионамиду, но лучше переносится. Применяют при различных формах туберкулеза, а также устойчивости возбудителя к другим противотуберкулезным препаратам или их непереносимости больным. Внутрь по 0,25 г 2-4 раза в день. Детям дозу уменьшают в зависимости от возраста и массы тела. Лечение длительное. В отдельных случаях отмечаются желудочно-кишечные расстройства, головокружение, тахикардия, слабость.

ПСОБЕРАН (Psoberanum). Смесь фурокумаринов - псоралена и бергапте-

на. получают из листьев среднеазитских сортов плодового растения инжира (Ficus carica L.). Обладает фотосенсибилизирующей активностью, усиливает пигментообразование в коже при облучении ультрафиолетовыми лучами. Применяют при витилиго, гнездной плешивости. Внутрь по 0,01 г (1 табл.) ежедневно 2-3 раза в день за 30 мин до еды. Одновременно смазывают депигментированные или лишенные волос участки кожи 0,1% спиртовым раствором препарата ежедневно или через день (на ночь или за 2-3 ч до облучения кварцевой лампой). Курс 3-3 1/2 мес. Повторные курсы можно проводить с интервалами 1-1 1/2 мес. Общая продолжительность лечения - 10-12 мес. Для детей от 5 до 10 лет суточная доза 0,01 г (1 табл.), 11-13 лет - 0,015 г (1 1/2 табл.), 14-16 лет - 0,02 г (2 табл.), взрослым - 0,04-0,06 г (4-6 табл.). При длительном применении возможны тошнота, тяжесть в желудке, понос, головная боль, сердцебиение, повышенная нервная возбудимость (бессонница, раздражительность), сыпь аллергического характера. У особенно чувствительных больных при чрезмерно длительной инсоляции на участках кожи, смазанных раствором псоберана, может развиться острый дерматит (резкая эритема до образования ожога II степени). В этих случаях 0,1% раствор разбавляют 70% спиртом в 2-4 раза. Про-

тивопоказан при индивидуальной непереносимости, острых желудочно-кишечных заболеваниях, тяжелых поражениях почек (острый и хронический нефрит), сахарном диабете, кахексии, беременности, гипертонической болезни, туберкулезе, заболеваниях крови, ЦНС. Не рекомендуется применять детям до 5 лет и больным старше 60 лет.

ПСОРАЛЕН (Psoralenum). Препарат, содержащий смесь фурокумаринов из псоралеи костянковой (Psoralea drupacea Bge). Фотосенсибилизирующее средство, применяемое при витилиго, гнездной плешивости. Внутрь за 30 мин до еды по 0,005-0,02 г 2-3 раза в день; детям до 5 лет по 0,005 г в сутки, от 5 до 10 лет - 0,01 г, от 10 до 13 лет - 0,015 г, от 13 до 16 лет - 0,02 г. Одновременно назначают наружно 0,1% раствор (ежедневно или через день). Курс (3-3 1/2 мес) при необходимости повторяют через 1-1 1/2 мес. Лечение должно проводиться при тщательном наблюдении врача. Побочные действия и противопоказания те же, что и при применении аммифурина.

"ПСОРИАЗИН" МАЗЬ (Unguentum "Psoriasinum"). Состав: дихлордиэтилсульфид 1 часть, вазелин 20000 частей. Показания к применению, способ применения, противопоказания те же, что и для мази "Антипсориатикум".

ПУВАЛЕН (Puvalen). Состав: в 1 табл. 15 мг метоксалена (-8-метоксипсоралена). Оказывает фотосенсибилизирующее действие на кожу. Применяют при псориазе, красном плоском лишае, нейродермите, грибовидном микозе, витилиго. Внутрь по 0,6 мг/кг 1 раз в сутки; препарат запивают молоком или принимают во время еды. Через 2-2 1/2 после приема больной с плотно закрытыми глазами подвергается УФ-облучению в течение 5-30 мин. Возможны тошнота, гиперемия кожи. Противопоказан при тяжелых нарушениях функции печени, почек, катаракте, беременности. Детям назначают в случаях крайней необходимости.

ПУСТЫРНИКА ТРАВА (Herba Leonuri). Содержит стероидные и флавоноидные гликозиды, стахидрин, алкалоид леонурин, сапонины и дубильные вещества. Успокаивающее средство, применяемое при повышенной нервной возбудимости, сердечно-сосудистых неврозах и ранних стадиях гипертонической болезни. Внутрь: настой (15,0:200,0) по 1 ст. л. 3 раза в день, настойка по 30-50 капель 3-4 раза в день, жидкий экстракт по 15-20 капель 3-4 раза в день.

ПУФЕМИД (Puphemidum). Противосудорожное средство, применяемое при различных формах эпилепсии типа petit mal, а также при височной эпилепсии. Внутрь до еды взрослым, начиная с 0,25 г

3 раза в день, постепенно увеличивая дозу при необходимости до 1,5 г/сут; детям до 7 лет по 0,125 г, старше 7 лет - по 0,25 г 3 раза в день. Возможны тошнота, бессоница. При тошноте назначать препарат через 1-1 1/2 ч после еды, при бессоннице - за 3-4 ч до сна. Противопоказан при острых заболеваниях печени и почек, нарушениях функции кроветворения, резко выраженном атеросклерозе, гиперкинезах.

РАВЕРОН (Raveron). Стандартизированный экстракт из предстательной железы половозрелых животных. Стимулирует мышечную деятельность мочевого пузыря, способствует появлению трубчатых эпителиальных клеток в предстательной железе, предупреждает ферментную гиперактивность и пролиферацию периуретральной ткани. Применяют при аденоме предстательной железы, хроническом простатите, недержание мочи. В/м ежедневно по 1 мл или через день по 2 мл в течение 4-6 нед. При индивидуальной повышенной чувствительности возможны аллергические реакции.

РАМНИЛ (Rhamnilum). Сухой стандартизированный препарат коры крушины. Применяют как слабительное средство при хронических запорах по 0,2 на ночь.

РАНТАРИН (Rantarinum). Экстракт пантов (неокостеневших рогов) самцов

[illegible]рного олення. Повышает физическую [illegible] умственную работоспособность, по [illegible]макологическим свойствам сходен с [illegible]рином. Применяют как тонизирующее средство. Внутрь за 30 мин до еды по 1 табл. 2-3 раза в день. Курс 3-4 нед. При необходимости через 5-7 дней курс [illegible]. Возможна тошнота. Противопоказан при артериальной гипертонии, [illegible], нарушении сердечного ритма, [illegible] нефросклерозе, остром периоде [illegible] болезней, тромбоэмболических [illegible] заболеваниях, нефрите и других органических заболеваниях почек.

РАУНАТИН (Raunatinum). Препарат, содержащий сумму алкалоидов из корней раувольфии змеиной. Оказывает гипотензивное, антиаритмическое и умеренное седативное действие. Применяют при гипертонической болезни I и II стадии. Внутрь после еды 0,002-0,012 г в день. В отдельных случаях наблюдается набухание слизистых оболочек носа, потливость, слабость, боль в области сердца. Противопоказан при гипотонии.

РЕВЕНЯ КОРЕНЬ (Radix Rhei). Содержит антрагликозиды (глюкокоренин, глюкоалоэмодин, хризофанеин, реохризин), свободные антрахиноновые соединения (реин, реоэмодин, хризофанол, фицин), производные антрона (пальмидин А, В, С), дубильные вещества пиро-

катехиновой группы, таногликозиды, хризофановую кислоту, смолистые, красящие и другие вещества. Применяют как слабительное средство при хронических запорах по 0,5-1 г на ночь. Оказывает некоторое раздражающее влияние на кишечник. Пот, моча и молоко окрашиваются в желтый цвет.

РЕГИДРОН (Rehydron). Дозированный порошок. Состав: натрия хлорид 3,5 г, калия хлорид 2,5 г, натрия цитрат 2,9 г, глюкоза 10 г. Раствор солей и сахара предотвращает или уменьшает обезвоживание путем восстановления потерянных воды, натрия и калия и нормализации кислотно-основного баланса. Применяют при диарее у детей для регидратации. Регидратация проводится черед рот в течение 6-10 ч. Вводимое количество раствора рассчитывают по предполагаемой потере массы тела. Без вреда можно дать как минимум 30 мл/кг за указанный срок, при амбулаторных условиях в среднем 60 мл/кг. В регидрон нельзя добавлять сахар. Ребенку можно дать обычную пищу сразу после регидратации.

РЕГИТИН (Regitin). Вызывает быстрый и мощный сосудорасширяющий эффект. При тяжелой острой сердечной недостаточности и свежем инфаркте миокарда парентеральное введение регитина приводит к быстрому улучшению клини-

ческой картины заболевания. Лечение препаратами наперстянки не влияет на эффективность регитина. Применяют при острой сердечной недостаточности с выраженным застоем в легких или отеком легкого, особенно при свежем инфаркте миокарда; нарушениях периферического кровообращения; для купирования гипертонических кризисов при феохромоцитоме, а также их профилактики до и во время хирургических вмешательств (в сочетании с β-адреноблокатором). В/в капельно в стерильном 5% растворе глюкозы (5-60 мг за 10-30 мин). Скорость вливания должна составлять 0,1-2 мг/мин. При необходимости, особенно при повышенном артериальном давлении в большом круге кровообращения, скорость вливания в первую минуту может быть повышена до 5 мг/мин. Как правило, оказывается достаточным начальное введение 10 мг регитина в течение 30 мин. (0,3 мг/мин). В зависимости от реакции больного лечение можно продолжать беспрерывно много часов или повторять его с определенными интервалами. При нарушениях периферического кровообращения доза — по 1-2 табл. 3 раза в день, желательно после еды; в тяжелых случаях — по 10 мг в/м или в/в 1-2 раза в день. При феохромоцитоме для лечения и для профилактики гипертонического кризиса — за 2 часа до хирурги-

[illegible]

[illegible] рают [illegible] давление [illegible] няя граница [illegible] нению препарата. Возм[illegible] случаях [illegible] кружение [illegible] ном введении [illegible] мия слизистой [illegible] ся лишь при [illegible] препарата. Проти[illegible] степени гипотензии.

РЕЗЕРПИН (R[illegible]. Синони-мы: Rausedil, S[illegible]) [illegible] ный и седативный эффект, [illegible] потермию и несколько замедляет обмен-ные процессы, потенцирует действие снотворных и анальгетиков. В отличие от аминазина не обладает адрено[illegible]ми свойствами. Применяют при гиперто-нической болезни, психических заболе-ваниях сосудистой этиологии, психозах, протекающих на фоне повышенного АД. Внутрь по 0,1-0,25 мг на прием до 1 мг/сут. Высшая разовая доза 1 мг (0,001 г), суточная 2 мг (0,002 г). Рекомендуется периодически чередовать резерпин с дру-гими гипотензивными средствами. Воз-можны гиперемия слизистых оболочек глаз, кожные высыпания, диспепсиче-ские явления, брадикардия, слабость, го-ловокружение, одышка. Иногда чувство

...ноги, депрессия, бессонница, явления паркинсонизма. Противопоказан при тяжелых органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях почек с нарушением функции.

РЕЗОРЦИН (Resorcinum). Применяют при кожных заболеваниях (экзема, себорея, грибковые заболевания) наружно в виде 2-5% водных и спиртовых растворов, 5%, 10% и 20% мазей.

РЕЛАДОРМ (Reladorm). Комплексный препарат, содержащий кальциевую соль циклобарбитала (фанодорм) 0,1 г и диазепама (валиум) 0,01 г. Быстро вызывает сон физиологического типа, продолжающийся 6-8 ч без посленаркотических симптомов. Применяют при бессоннице, трудностях с засыпанием, коротком сне. По 1 табл. за 20-30 мин перед сном. Противопоказан при сверхчувствительности к отдельным компонентам препарата, беременности в период лактации; нельзя назначать препарат до и во время работы лицам, профессия которых требует быстрой физической и психической реакции (водителям транспорта и др.).

РЕМАНТАДИН (Remantadinum). Синоним: Meradone. Обладает противовирусной активностью в отношении всех

штаммов вируса гриппа ти[illegible] в мень-
шей степени типа В. Прим[illegible]
чения (в начальной стадии [illegible]
профилактики гриппа [illegible]
ных респираторных заб[illegible]
од эпидемии гриппа. Внутрь [illegible]
1-й день - по 2 табл. (100 мг[illegible]
ки, на 2-й и 3-й день - [illegible]
в сутки одновременно с [illegible]
скими средствами. С целью профилакти-
ки гриппа ежедневно по 1 табл. [illegible]
5-7 дней при постоянном контакте с боль-
ными (очаговая профилактика) и в те-
чение 20 дней при эпизодических кон-
тактах (плановая профилактика). Проти-
вопоказан при острых заболеваниях пе-
чени, почек, тиреотоксикозе.

РЕТАБОЛИЛ (Retabolin). Синоним: Eubolin. Активное анаболическое средство пролонгированного действия. Применяют по 1 мл 5% раствора 1 раз в 1-3 нед; детям по 0,5-1 мл/кг 1 раз в 3-4 нед. Противопоказан при беременности, раке предстательной железы, нарушениях функции печени и почек.

РЕТИНОЛА АЦЕТАТ (Retinoli acetas). Синонимы: витамин А, Axerophtholum). Способствует нормальному обмену веществ, росту и развитию организма. Обеспечивает нормальную деятельность органа зрения, слизистых оболочек, сальных и потовых желез, по-

вышает устойчивость к заболеваниям слизистых оболочек дыхательных путей и кишечника, повышает устойчивость организма к инфекциям. Применяют при авитаминозе и гиповитаминозе А; инфекционных заболеваниях (корь, дизентерия, грипп, бронхит, пневмония); заболеваниях кожи (ранения, ожоги, обморожения, туберкулез кожи, гиперкератозы, ихтиоз, псориаз, пиодермия, некоторые формы экзем); ряде заболеваний глаз (пигментный ретинит, гемералопия, ксерофтальмия, кератомаляция, конъюнктивиты, другие поражения роговицы); хронических энтероколитах, гепатитах, панкреатитах. Внутрь и в/м. Лечебные дозы для взрослых при различных степенях недостаточности витамина А от 33000 МЕ (0,01 г) до 50000-100000 МЕ/сут, для детей от 1000 МЕ до 20000 МЕ/сут в зависимости от возраста. Местно применяют масляный раствор ретинола ацетата и одновременно назначают внутрь или в/м. Возможны гипервитаминоз А (головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела, сонливость, шелушение кожи). Противопоказан при желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите.

РИБОКСИН (Riboxinum). Стимулирует окислительно-восстановительные процессы на клеточном уровне, повышает энергетический потенциал миокарда, улучшает коронарное кровообращение.

Применяют при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, хронической коронарной недостаточности, кардиомиопатиях различного генеза; нарушениях ритма, связанных с применением сердечных гликозидов, дистрофических изменениях миокарда после тяжелых физических нагрузок или вследствие эндокринных нарушений после перенесенных инфекционных заболеваний; заболеваниях печени (гепатит). Внутрь по 0,6–2,4 г в день; вначале по 0,6–0,8 г/сут. Далее в течение 2-3 дней дозу увеличивают до 1,2 г (по 0,4 г 3 раза в день), 1,6 г/сут, 2,4 г/сут. Курс 4-12 нед. При урокопорфирии применяют по 0,8 г ежедневно в течение 1-3 мес. Возможна индивидуальная непереносимость (зуд, гиперемия кожи), обострение подагры.

РИБОНУКЛЕАЗА (Ribonucleasa). Ферментный препарат, получаемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота. Способствует разжижению гноя, слизи, вязкой мокроты, а также оказывает противовоспалительное действие. Применяют при воспалительных заболеваниях дыхательных путей (трахеит, бронхит, превмония, бронхоэктатическая болезнь и др.) с целью облегчения удаления вязких экссудатов и мокроты; как противовоспалительное средство при пародонтозе, остеомиелите, тромбофлебите и др. Местно в виде аэрозоля и ингаляций

[illegible]онническом растворе натрия хлори[illegible] (0,025 г на 3-4 мл), эндобронхиально и [illegible]плеврально (0,025-0,05 г на 5-10 [illegible] (0,01 г на 1 мл). Высшая разовая [illegible] при в/м введении 0,01 г, суточная [illegible] местном и внутриполостном [illegible] - 0,05 г. Возможны аллергические реакции, раздражение слизистых [illegible] дыхательных путей при ингаляции. Противопоказан при декомпенсации сердечной деятельности, легочной недостаточности, заболеваниях печени с нарушением функции, открытой форме туберкулеза, кровоточащих полостях.

РИБОФЛАВИН (Riboflavinum). Синонимы: витамин B2, Lactoflavin. Активно участвует в процессах белкового, углеводного и жирового обмена; в зрительной функции глаз (наряду с ретинолом) и в синтезе гемоглобина. Применяют при гипо- и арибофлавинозе; гемералопии (назначают с ретинолом); конъюнктивитах, иритах, кератитах; длительно не заживающих ранах и язвах; лучевой болезни; экземах; вирусном гепатите А и других заболеваниях печени; нарушениях функции желудочно-кишечного тракта; железодефицитной анемии. Внутрь взрослым 0,005-0,01 г в день. При более выраженной недостаточности рибофлавина по 0,01 г 3 раза в день в течение 1-1 1/2 мес; детям от 0,002-0,005 г до 0,01 г в день в

зависимости от возраста; 0,01 % раствор в виде глазных капель.

РИБОФЛАВИНА МОНОНУКЛЕОТИД (Riboflavini mononucleotidum). Синонимы: Ribofosfina. Кофермент, образуемый из рибофлавина. В соединении с белком входит в состав ферментов, регулирующих окислительно-восстановительные процессы белкового и жирового обмена. Применяют при гипо- и арибофлавинозе; зудящих дерматозах; хронических экземах; нейродермитах, фотодерматозах и других кожных заболеваниях; кератитах, помутнении роговицы, конъюнктивитах. В/м взрослым по 1 мл 1 % раствора (0,01 г)) раз в день в течение 10-15 дней. Детям в той же дозе 3-5 дней, затем 2-3 раза в неделю. Всего 15-20 инъекций. При заболеваниях глаз по 0,2-0,5 мл 1 % раствора в течение 10-15 дней.

РИГЕВИДОН (Rigevidon). Одна таблетка содержит 0,15 мг D-норгестрела и 0,03 мг этинилэстрадиола. Противозачаточное пероральное средство, применяемое для предупреждения беременности. Принимают, начиная с 5-го дня менструации в течение 21 дня по 1 табл. в день в одно и то же время суток (предпочтительно вечером). Затем 7-дневный перерыв, во время которого появляется кровотечение типа менструации. Следующий 21-дневный курс начинают сразу после

...менного перерыва. Возможны увеличение массы тела, нагрубание молочных желез. Противопоказан при нарушении функции печени, холецистите, склонности к тромбозам, хроническом колите, заболеваниях эндокринных желез, злокачественных опухолях.

РИНГЕРА-ЛОККА ТАБЛЕТКИ (Tabulettae Ringer-Locke). Состав: натрия хлорида 0,6 г, натрия бикарбоната 0,01 г, кальция хлорида 0,02 г, калия хлорида 0,02 г, глюкозы 0,1 г. Применяют при обезвоживании организма и как дезинтоксикационное средство в виде раствора (1 табл. на 100 мл воды).

РИОДОКСОЛ (Riodoxolum). Обладает противовирусной активностью в отношении вируса герпеса простого, оказывает противогрибковое действие при микроспории, трихофитии и кандидозе, а также бактериостатическое действие на некоторые кислотоупорные бактерии. Применяют при вирусных заболеваниях кожи (герпес простой, контагиозный моллюск, плоские вульгарные, подошвенные бородавки) и слизистых оболочек полости рта (острый афтозный стоматит, хронический рецидивирующий афтозный стоматит, многоформная экссудативная эритема, эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая, язвенно-некротический гингивостоматит; грибко-

вых поражениях гладкой кожи (микроспория, эпидермофития, рубромикоз, эритразма) и волосистой части головы (микроспория, трихофития); угревой сыпи кожи. Концентрацию мази (0,25 и 0,5%) подбирают в зависимости от заболевания и локализации процесса. Наносят на очаги поражения 0,25% или 0,5% мазь тонким слоем 1-3 раза в день ежедневно в течение 1-4 нед. При угревой сыпи через 30 мин после нанесения снимают остатки мази бумажной салфеткой. Возможны легкая гиперемия кожи и ощущение жжения. В этих случаях следует снять препарат с кожи. Противопоказан при беременности, гирсутизме и телеангиэктазии.

РИСТОМИЦИНА СУЛЬФАТ (Ristomycini sulfas). Антибиотик, образуемый при биосинтезе Proactinomyces fructiferi, var. ristomycini. Синонимы: Ristocetin, Spontin. Активен в отношении грамположительных кокков (стафилококк, стрептококк, пневмококк, энтерококк), коринебактерий дифтерии, спороносных грамположительных бактерий, многих анаэробов и кислотоустойчивых бактерий. Применяют при тяжелых инфекциях, вызванных устойчивыми к другим антибиотикам стафилококками и энтерококками (сепсис, эндокардит, пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры, остеомиелит, энтероколит, менингит и др.). В/в капельно 1000000-1500000 ЕД в 3 приема с

интервалом 12 ч; детям - из расчета 20000-30000 ЕД/(кг.сут). Растворяют в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия из расчета 250000 ЕД в 125 мл. Возможны аллергические реакции с эозинофилией. При длительном применении возможны флебиты. Противопоказан при тромбоцитопении.

РИТМИЛЕН (Rytmilen). Дизопирамида фосфат. Противоаритмическое средство, применяемое при желудочных и предсердных экстрасистолах, мерцании и трепетании предсердий, а также пароксизмальной наджелудочной тахикардии, тахикардиях, связанных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта, аритмиях после инфаркта миокарда и аритмиях, вызванных препаратами наперстянки, хирургическими вмешательствами. Начальная суточная доза внутрь составляет 0,2-0,3 г, далее в зависимости от состояния больного назначают 0,3-0,8 г препарата, разделив это количество на 3-4 равные разовые дозы. Такая схема обеспечивает равномерную концентрацию препарата в крови и поддерживает антиаритмический эффект. При в/в введении (медленно!) назначают по 0,001-0,002 г/кг массы тела. Возможны затруднение мочеиспускания, иногда задержка мочи, сухость во рту, диспепсия, головная боль, аллергические реакции. Эти явления быстро исчезают при отмене

препарата или уменьшении доз. Противопоказан при полной атриовентрикулярной блокаде, кардиогенном шоке, повышенной чувствительности к препарату. Не рекомендуется назначать детям и беременным.

РИФАМПИЦИН (Rifampicinum). Синонимы: Benemycin, Rifadin, Rimactan и др. Полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, аналогичный бенемицину. Применяют при всех формах туберкулеза, гнойной инфекции различной локализации, инфекционных заболеваниях дыхательных путей, отитах, холециститах, гонорее, лепре. При туберкулезе внутрь по 0,45 г ежедневно или по 0,3 г 2 раза в сутки. Принимают за 30 мин - 1 ч до еды. В/в вводят при остропрогрессирующих и распространенных формах деструктивного туберкулеза легких, тяжелых гнойно-септических процессах при необходимости быстрого создания высоких концентраций препарата в крови, а также в случаях, когда прием препарата внутрь затруднен или плохо переносится больными. При в/в введении суточная доза для взрослых составляет 0,45 г, при тяжелых быстро прогрессирующих формах - 0,6 г, вводят ее в один прием. Длительность в/в введения зависит от переносимости препарата и может составлять 1 мес и более с последующим переходом на прием внутрь. Общая про-

должительность курса при туберкулезе определяется эффективностью лечения и может достигать 1 года. У больных с сахарным диабетом при лечении туберкулеза рифампицином (в/в) рекомендуется на каждые 4-5 г глюкозы (растворителя) вводить 2 ЕД инсулина. Монотерапия туберкулеза рифампицином часто сопровождается развитием устойчивости возбудителя к антибиотику, поэтому его следует назначать в сочетании с другими противотуберкулезными средствами (стрептомицином, изониазидом, этамбутолом и др.), к которым сохранена чувствительность микобактерий туберкулеза. При лечении больных лепрой рифампицин назначают по соответствующим схемам в комплексе с иммуностимулирующими средствами. При инфекциях нетуберкулезной этиологии в зависимости от локализации процесса суточная доза внутрь для взрослых составляет 0,45-0,9 г, для детей- 8-10 мг/кг (распределяют на 2-3 приема). При в/в введении суточная доза составляет 0,3-0,9 г (максимальная 1,2 г). Продолжительность курса составляет 7-10 дней. В/в введение следует прекратить, как только появится возможность для приема рифампицина внутрь. При острой гонорее рифампицин взрослым назначают внутрь в суточной дозе 0,9 г. Возможны снижение аппетита, тошнота, рвота, понос. Лечение рифам-

пицином следует начинать после исследования функции печени (определение уровня билирубина и аминотрансфераз в крови, тимоловая проба), а в процессе лечения проводить это исследование ежемесячно. Наблюдаются лейкопения, тромбоцитопения, аллергические реакции (кожные высыпания, эозинофилия, бронхоспазм, отек Квинке). Если на предшествующем этапе лечения отмечались признаки сенсибилизации к рифампицину, его применяют под контролем измерения температуры после приема препарата (в течение 3 ч первые 2-3 дня). Ослабляет действие антикоагулянтов, кортикостероидов, оральных гипогликемических средств, оральных контрацептивов и препаратов наперстянки. У больных, принимающих препарат, моча, слезная жидкость, мокрота имеют оранжево-красный цвет. При быстром в/в введении у больных возможно снижение АД. При длительном в/в введении могут развиться флебиты. Противопоказан при повышенной чувствительности к препарату, желтухе (в том числе механическая), заболеваниях печени и почек, сопровождающихся выраженным нарушением их функции, беременности. Препарат не назначают детям грудного возраста. В/в введение противопоказано также при легочно-сердечной недостаточности II-III степени, флебитах.

РОДИОЛЫ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Rhodiole fluidum). Спиртовой (на 40% этиловом спирте) экстракт (1:1) из корневищ и корней родиолы розовой. Обладает стимулирующим свойством. Применяют при астенических состояниях повышенной утомляемости, неврастении, вегетососудистой дистонии. Внутрь по 5-10 капель 2-3 раза в день за 1/4-1/2 ч до еды. Курс 10-20 дней. В психиатрической практике (при астении, акинетогипотоническом синдроме и др.) начинают с 10 капель 2-3 раза в день, затем дозу увеличивают до 30-40 капель на прием. Длительность лечения 1-2 мес. Побочное действие. Препарат не принимают во второй половине дня. В отдельных случаях возможны возбуждение, бессонница, головная боль, иногда повышение АД. Противопоказан при состоянии возбуждения, гипертоническом кризе, лихорадочном состоянии.

РОЗАНОЛ (Rosanol). Действующее вещество препарата - розовое масло. Уменьшает спазм желчевыводящих путей, оказывает бактериостатическое действие. Применяют при заболеваниях печени (желчнокаменная болезнь, дискинезии желчевыводящих путей после удаления желчного пузыря), почечнокаменной болезни. Внутрь за 30 мин до еды по 2-3 капсулы 3 раза в день в течение 2-4 нед. Противопоказан при тяжелых поражениях паренхиматозных

органов, острых воспалительных заболеваниях желчевыводящих путей.

РОЗЕВИН (*Rosevinum*). Алкалоид, полученный из растения барвинок розовый (*Vinca rosea*). Синоним: Vinblastin. Цитостатик, обладающий противоопухолевой активностью. Применяют при лимфогранулематозе, гематосаркомах, миеломной болезни, некоторых [illegible] опухолях (хорионэпителиома). [illegible] в/в 1 раз в неделю. Первоначальная [illegible] 0,025 мг/кг, затем до 0,3 мг/кг. [illegible] проводят при постоянном [illegible] лейкоцитов и тромбоцитов. [illegible] чебная доза составляет 100–120 мг. [illegible] парат может применяться [illegible] химиотерапии. Возможно [illegible] монозa, в первую очередь [illegible] При резкой лейкопении или [illegible] пении переливают кровь или ее форменные элементы, при необходимости назначают антибиотики и другие препараты. Возможны диспептические явления (тошнота, рвота, диарея), развитие алопеции, парестезии пальцев рук и ног. При резкой выраженности побочных явлений лечение следует прекратить. Противопоказан при гипоплазии кроветворения, острых желудочно-кишечных заболеваниях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Не следует назначать препарат больным в терминальной стадии болезни.

РОМАЗУЛАН (Romasulan). Состав: экстракт ромашки 96 мл, эфирное масло ромашки (содержит 6% азулена) 0,3 мл, твин-80-4 г. Антисептическое и дезодорирующее средство. Применяют внутрь при гастритах, дуоденитах, колитах, расстройствах пищеварительного тракта, сопровождающихся метеоризмом; наружно при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек и кожи, в стоматологической практике при стоматите, гингивитах слизистых оболочек и кожи. Внутрь: 1/2 ч. л. на стакан горячей воды. Наружно: для промываний, клизм, компрессов, (1 1/2 ч. л. на 1 л воды).

РОМАШКИ ЦВЕТКИ (Flores Chamomillae). Содержит сесквитерпеновые лактоны (матрицин, матрикорин), эфирное масло (0,1-0,5%), азулен, флавоновый гликозид, кумарины (умбеллиферон, диоксикумарин), органические кислоты. Применяют в качестве спазмолитического, противовоспалительного, антисептического средства при спазмах кишечника, метеоризме, поносе в виде настоя (10,0:200,0) или отвара (1 ст. л. цветков на стакан кипящей воды) внутрь по 1-5 ст. л. 2-3 раза в день. Внутрь применяют как потогонное средство. Наружно используют для полоскания, примочек и клизм.

РОНИДАЗА (Ronidasa). Препарат гиалуронидазы, получаемый из семенников крупного рогатого скота (по свойст-

нам аналогичен лидазе). Применяют при рубцах (ожоговых, послеоперационных, [illegible] лоидных и др.), контрактуре Дюпюитрена (начальные стадии), контрактурах и тугоподвижности суставов после [illegible] тельных процессов и травм, [illegible] тах, длительно не заживающих [illegible]. Наружно: 0,5 г препарата нано[illegible] ную стерильную салфетку, [illegible] изотоническим раствором [illegible] накладывают на пораженные [illegible] крывают вощаной бумагой и [illegible] мягкой повязкой. Длительность [illegible] 15-60 дней. Иногда отмечают [illegible] кожи. Противопоказан при [illegible] ных новообразованиях, туберкулезе [illegible] гих инфекционных заболеваниях и [illegible] лительных процессах.

РОТОКАН (Rotocanum). Смесь жидких экстрактов ромашки, календулы и тысячелистника (в соотношении 2:1:1). Оказывает противовоспалительное действие, усиливает процессы репаративной регенерации в слизистых оболочках, обладает гемостатическими свойствами. Применяют при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта различной этиологии и пародонта (афтозный стоматит, пародонтоз, язвенно-некротический гингивостоматит). Перед применением 1 ч. л. ротокана разводят в стакане теплой воды. При пародонтозе после удаления зубных отложений и выскабливания патологических

десневых карманов в них вводят на 20 мин тонкие турунды, обильно смоченные раствором рогокана. Процедуру проводят ежедневно или через день (4-6 раз). При заболеваниях слизистой оболочки полости рта применяют аппликации (15-20 мин) или полоскания (1-2 мин) с раствором рогокана 2-3 раза в день в течение 2-5 дней. Противопоказан при повышенной чувствительности к растениям, содержащимся в препарате.

РОЦЕФИН (Rocefin). Применяют при инфекциях, вызываемых чувствительными к цефтриаксону микроорганизмами: менингит, брюшные инфекции, повреждения и инфекции костей, суставов, соединительно-тканных органов, инфекции у больных с иммунным дефектом, инфекции почек и мочегонных путей, инфекционные заболевания органов дыхания, особенно пневмония, а также оториноларингологические инфекционные заболевания, инфекции половых органов, включая гонорею. Взрослым и детям старше 12 лет: средняя суточная доза 1-2 г роцефина каждые 24 часа, доза может повышаться до 4 г. Новорожденным от (2-недельного возраста): 20-50 мг в день, что не должно превышать 50 мг на 1 кг массы тела. Детям (от 3-недельного возраста до 12 лет): суточная доза 20-80 мг на 1 кг массы тела; детям с массой тела 50 кг и более и пожилым больным назначается доза для взрослых.

РТУТИ АМИДОХЛОРИД (Hydrargyri amidochloridum). Синонимы: ртуть амидохлоридная, ртуть осадочная белая. Применяют в качестве антисептического и противовоспалительного средства при заболеваниях кожи в виде 10% мази.

РТУТИ ДИХЛОРИД (Hydrargyri dichloridum). Синоним: сулема. Применяют как антисептические средства в растворах (1:1000-2:1000) для дезинфекции кожи, белья, одежды, предметов ухода за больными, для обмывания стен, для лечения дерматологических заболеваний в виде мазей.

РТУТИ МОНОХЛОРИД (Hydrargyri monochloridum). Синонимы: ртуть однохлористая, каломель. Применяют наружно в качестве антисептического средства при заболеваниях роговицы, бленнорее (в виде мази), для предохранения от заражения венерическими заболеваниями (местно).

РТУТИ ОКИСЬ ЖЕЛТАЯ (Hydrargyri oxydum flavum). Синонимы: Hydrargyrum praecipitatum flavum). Применяют в качестве антисептического средства при блефаритах, кератитах, конъюнктивитах, сикозе, себорее в виде 1-2% мази. В офтальмологии не применять: одновременно с дионином, внутрь одновременно с солями йода или брома.

РТУТНАЯ СЕРНАЯ МАЗЬ (Unguentum Hydrargyri cinereum). Состав: мази ртутной концентрированной 35,7 г, ланолина безводного 4,3 г, жира свиного очищенного 40 г, жира бычьего очищенного 20 г. Оказывает антипаразитарное действие. Применяют при кожных паразитарных заболеваниях (втирают в кожу). Возможны раздражение кожи, поражение почек, желудочно-кишечного тракта, нарушение нервной деятельности. Противопоказан при заболеваниях кожи (экзема, почесуха), почек, желудочно-кишечного тракта.

РУБОМИЦИНА ГИДРОХЛОРИД (Rubomycini hydrochloridum). Антибиотик, продуцируемый Actinomyces coeruleorubidus). Синоним: рубидомицин. Обладает антибактериальной активностью и оказывает сильное цитостатическое действие на пролиферирующие ткани, включая опухолевую. Угнетает кроветворение, вызывая гранулоцитопению и тромбоцитопению. Применяют при хорионэпителиоме матки, остром лейкозе, ретикулосаркоме. Дозы и интервалы между в/в введением устанавливают индивидуально. Взрослым назначают 0,5-1 мг/кг, детям - 1-1,5 мг/кг. Лечение проводят, как правило, циклами. Возможна комбинация препарата с другими цитостатическими средствами (циклофосфан, 6-меркаптопурин, метотрексат, винкри-

сти и т.д.) и лучевой терапией. Возможны угнетение кроветворения (лейкопения, реже тромбоцитопения), потеря аппетита, тошнота, иногда рвота, головная боль, грибковые поражения полости рта. Большие дозы (более 30 мг/кг) могут вызвать нарушение сердечной деятельности. Противопоказан в терминальных стадиях болезни, при резком истощении, органических поражениях сердца, лейкопении и тромбоцитопении (исключение составляют больные лейкозом).

РУЛИД (Rulid). В 1 табл. 150 мг рокситромицина. Антибактериальный препарат широкого спектра действия. Активен в отношении стрептококков, пневмококков, менингококков, гонококков, коринебактерий дифтерии, микоплазм, хламидий и др. Применяют при инфекциях верхних и нижних отделов дыхательных путей, уретритах негонококковой природы, инфекциях кожи и мягких тканей, инфекциях в гинекологии, для профилактики менингококкового менингита у лиц, находившихся в контакте с больным. Взрослым по 150 мг 2 раза в день (утром и вечером) перед приемом пищи. Больным с печеночной недостаточностью следует избегать назначения рулида. Его не рекомендуется применять беременным женщинам и в период лактации. Возможны тошнота, рвота, гастралгия, понос; аллергические кожные

высыпания; транзиторное увеличение аспартаминотрансферазы/аланинаминотрансферазы и щелочных фосфатаз. Противопоказан при аллергических реакциях к макролидам. Не назначать препарат одновременно с производными алкалоидов спорыньи.

РУМАЛОН (Rumalon). Содержит экстракт хрящей и мозговой ткани молодых животных. Способствует нормализации питания суставного хряща. Применяют при заболеваниях суставов, сопровождающихся перерождением хрящевой ткани. В/м, начиная с 0,3 мл до 1 мл 3 раза в неделю в течение 5-6 нед.

РЯБИНЫ ПЛОДЫ (Fructus Sorbi). Содержит аскорбиновую кислоту (2-4 г/л), каротиноиды, витамин Р, органические кислоты, сахар, гликозид амигдалин (семена). Применяют при заболеваниях, сопровождающихся витаминной недостаточностью, в виде настоя или чая (1 ч. л. на стакан кипящей воды) по 1/2 стакана 1-3 раза в день.

САЛАЗОДИМЕТОКСИН (Salazodimethoxinum). Сульфаниламид пролонгированного действия. Применяют при неспецифическом язвенном колите в активной стадии при легких и среднетяжелых формах заболевания, плохой переносимости или неэффективности салазопиридазина или салазопирина. Внутрь по 1 г 2 раза в день; иногда дозу повышают до

4 г/сут. Возможны аллергические реакции, лейкопения, диспептические явления. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам.

САЛАЗОПИРИДАЗИН (Salazopyridazinum). Сульфаниламидный препарат. Оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие. Применяют при неспецифическом язвенном колите. Внутрь (после еды) по 2 г/сут (в 2-4 приема). Лечение длительное. Детям дозы - в соответствии с возрастом. Возможны аллергические реакции, лейкопения, диспептические явления, снижение уровня гемоглобина. Противопоказан при токсико-аллергических реакциях на сульфаниламиды или салицилаты.

"САЛИНИМЕНТ" (Salinimentum). Состав: метилсалицилата 10 г, масла беленного 30 г, хлороформа 10 г. Применяют как обезболивающее и противовоспалительное средство для растираний при ревматизме, артритах, радикулитах, невралгиях и др.

САЛИЦИЛАМИД (Salicylamidum). Амид салициловой кислоты. Синонимы: Algamon, Salamide. Болеутоляющее, жаропонижающее и противовоспалительное средство. Применяют при невралгиях, мигрени, лихорадочных заболеваниях по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день, при ревматиз-

ме 0,5-1 г 6-10 раз в сутки. Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении других препаратов салициловой кислоты. Реже вызывает диспептические явления.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (Acidum salicylicum). Применяют наружно в качестве антисептического, отвлекающего, раздражающего и кератолитического средства при кожных заболеваниях в составе 2-5% присыпок, 1-10% мазей, паст, спиртовых растворов.

САЛЬБУТАМОЛ (Salbutamolum). Синоним: Ventolin. Влияет на β2-адренорецепторы бронхов и оказывает сильное и длительное (до 5-8 ч) бронхорасширяющее действие. Применяют для предупреждения и купирования приступов бронхиальной астмы. По 1-2 ингаляции 4-6 раз в сутки. При передозировке возможны расширение периферических сосудов, умеренная тахикардия, тремор мышц. Необходима осторожность при тиреотоксикозе, артериальной гипертонии, пароксизмальной тахикардии, беременности.

САЛЬВИН (Salvinum). Комплексный препарат, полученный из травы шалфея лекарственного. Оказывает антимикробное действие на грамположительную микрофлору, в том числе устойчивую к антибиотикам, обладает противовоспали-

раз в сутки. Побочное дей-
...вопоказания те же, что и
...ии других препаратов са-
...лоты. Реже вызывает дис-
...ления.

...ИОВАЯ КИСЛОТА
...cum). Применяют наруж-
...тисептического, отвлека-
...жающего и кератолитиче-
...ри кожных заболевания
... присыпок, 1-10% мазей
... растворов.

...МОЛ (Salbutamolum).
...in. Влияет на β_2-адрено-
...ков и оказывает сильное
... 5-8 ч) бронхорасширя-
... Применяют для предуп-
...упирования приступа
...мы. По 1-2 ингаляции 4
...и передозировке возмож-
...ериферических сосудов,
...рдия, тремор мышц. Не-
...ность при тиреотоксико-
... гипертонии, пароксиз-
...и, беременности.

...alvinum). Комплексный

тельными и дубящими свойствами. Применяют при хроническом воспалении слизистой оболочки полости рта, гингивитах, афтозных стоматитах, механических и термических язвах, абсцессах (после вскрытия); различных формах пародонтоза, хронических и обострившихся пародонтитах и т.д. Применяют местно в виде 0,1-0,25% спиртоводных растворов. Для приготовления указанных растворов 1% спиртовой раствор сальвина разводят ex tempore 4-10-кратным объемом дистиллированной воды или изотонического раствора хлорида натрия. Применяют в виде смазывания, орошений, промываний, аппликаций, а также в виде турунд, вводимых в каналы и в патологические зубодесневые карманы (на 10 мин). Курс лечения 2-10 сеансов с интервалом 1-2 дня. При использовании концентраций более высоких, чем указано в инструкции, или при повышенной индивидуальной чувствительности больного к сальвину возможны неприятные ощущения во рту - чувство горечи, сухости, жжения, а также явления раздражения, выражающиеся в виде легкой и скоропроходящей гиперемии.

САЛЮЗИД РАСТВОРИМЫЙ (Saluzidum solubile). Обладает высокой бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза. Применяют для лечения туберкулеза (различных форм и локализаций) в виде 5% раствора подкожно, в/м, в/в, в спин-

номозговой канал, в полости. Подкожно и в/м по 0,5-1 г (суточная доза может быть доведена до 2 г), в/в по 0,5 г, в спинномозговой канал по 0,09-0,12 г; 5% раствор вводят также в виде аэрозоля интратрахеально и интрабронхиально по 2-3 мл на ингаляцию. Побочное действие и противопоказания те же, что и для салюзида.

"САНАСОЛ" (*"Sanasolum"*). Состав: калия хлорида 60%, калия цитрата, кальция глюконата и аммония хлорида по 10%, магния аспарагината и кислоты глутаминовой по 5%. Применяется для улучшения вкуса пищи при противопоказаниях к приему натрия хлорида; для уменьшения гипокалиемии при лечении больных гипертонической болезнью и сердечной недостаточностью, при плохой переносимости сердечных гликозидов и салуретиков; при хронических и острых нефритах с синдромом почечной недостаточности (без явлений гиперкалиемии). Суточная доза 1,5-2,5 г; при лечении гипокалиемии до 5 г. Добавляют санасол к пище, обычно во вторые блюда, непосредственно перед употреблением. Противопоказан при тяжелой почечной недостаточности и гиперкалиемии. Осторожность нужна при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и гастритах.

САНГВИРИТРИН (*Sanguiritrinum*). Сумма бисульфатов алкалоидов сангви-

канал, в полости. Подко-
,5-1 г (суточная доза
на до 2 г), в/в по 0,5 г, в с
канал по 0,09-0,12 г; 5%
также в виде аэрозоля
и интрабронхиально по 2
яцию. Побочное действие
ния те же, что и для сал

ОЛ" ("Sanasolum"). Соста
да 60%, калия цитрата
оната и аммония хлорида
я аспарагината и кисло
по 5%. Применяется для
са пищи при противопо
ему натрия хлорида; для
окалиемии при лечени
онической болезнью и
таточностью, при плохой
ердечных гликозидов и
хронических и острых
омом почечной недост
ений гиперкалиемии
-2,5 г; при лечении санасол
г. Добавляют санасол к
вторые блюда, непо
потреблением. Проти
лой почечной недост
иемии. Осторожно
й болезни желудка
кишки и гастритах.

(Sanguiritrinum).
лоидов сангви-

ритрина и хелеритрина. Получают из травы маклейи сердцевидной (Macleaya cordata Will.) и маклейи мелкоплодной (Macleaya microcarpa Papaveraceae). Обладает широким спектром антимикробной активности, действуя на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжеподобные и мицелиальные грибы, а также антихолинэстеразной активностью. Применяют при поражениях кожи и слизистых оболочек, вызванных дрожжеподобными грибами, дерматофитами и смешанной флорой, в том числе антибиотико-резистентными штаммами (пиодермии, экземы, нейродермиты, кандидоз, дермофитии и др.), заболеваниях среднего уха и наружного слухового прохода, афтозном стоматите, пародонтозах, язвенно-некротических гингивостоматитах и других поражениях слизистой оболочки полости рта, длительно не заживающих ранах; инфицированных ожоговых ранах, язвах. В качестве антихолинэстеразного средства назначают при миопатии у детей и взрослых, при различных чувствительных и двигательных нарушениях (полиомиелит, детские церебральные параличи и др.). Наружно в виде 1% линимента, наносимого 1-2 раза в день на очаги поражения или через 1-2 дня (при перевязках). При отитах, пародонтозе и др. применяют 0,2% спиртовой раствор для промываний, смачивания тампонов.

При миопатии, последствиях полиомиелита и т.д. назначают внутрь таблетки (после еды) взрослым по 1-2 табл. 2 раза в день (до 3 табл. в день), детям в зависимости от возраста, но не более 0,001 г на 1 год жизни в сутки в 2 приема. При наружном применении предельная доза линимента 3 г, водно-спиртового раствора 15 мл, водных растворов 30 мл. При местном применении возможно жжение, при приеме внутрь - тошнота, рвота, боль в животе. Противопоказан при эпилепсии, гиперкинезах, бронхиальной астме, стенокардии и заболеваниях печени и почек.

САПАРАЛ (Saparalum). Сумма аммонийных солей тритерпеновых гликозидов аралозидов А, В и С, получаемых из корней аралии маньчжурской (*Aralia manshurica* Rupr. et maxim). Тонизирующее средство, оказывающее стимулирующее действие на центры блуждающего нерва. Применяют при неврастении, астенических, астенодепрессивных и астено-ипохондрических состояниях, гипотонии, импотенции, умственном и физическом перенапряжении. Внутрь после еды по 0,05 г 2-3 раза в день. Курс (15-30 дней) при необходимости через 1-2 нед. повторяют. Противопоказан при гипертонии, эпилепсии, гиперкинезах, повышенной возбудимости.

САРКОЛИЗИН (Sarcolysinum). Синонимы: Alkeran, Merphalan, Sarcoclorin.

Обладает значительной противоопухолевой активностью и, подобно другим производным β-хлорэтиламина, подавляет пролиферативные процессы в тканях, в частности кроветворение. Применяют при семиноме яичка (особенно при метастазах), ретикулосаркоме, злокачественной ангиоэндотелиоме, костной опухоли Юинга, миеломной болезни. В/в вводят, полости, назначают внутрь (после еды) 1 раз в неделю. Разовая доза для взрослых с массой тела более 50 кг от 0,03 до 0,05 г, для больных с массой тела 50 кг и менее и для детей из расчета 0,5-0,7 мг/кг. На курс (4-7 нед) применяют 0,15-0,25 г. Лечение прекращают при уменьшении числа лейкоцитов до 3,5•10^9/л - 3•10^9/л, нейтрофилов до 1% и выраженной тромбоцитопении (менее 100•10^9/л). Высшая доза для взрослых внутрь 0,05 г 1 раз в 7 дней. Возможны угнетение кроветворения (лейкопения, тромбоцитопения), диспептические явления (тошнота, рвота через несколько часов после приема); при передозировке - повышение температуры тела, стоматиты, петехии и нарушение кровообращения. Противопоказан в терминальных стадиях болезни, при кахексии, выраженной анемии, лейкопении, тромбоцитопении, тяжелых поражениях печени, почек и сердечно-сосудистой системы.

САХАРИН РАСТВОРИМЫЙ (Saccharinum solubile). Применяют в качестве заменителя сахара больным диабетом внутрь.

СБОР ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ АППЕТИТА (Species amarae). Состав: травы полыни горькой 8 частей, травы тысячелистника 2 части. Применяют как горечь для возбуждения аппетита, в виде настоя (1 ст. л. на стакан кипятка) по 1 ст.л. 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

СБОР ВЕТРОГОННЫЙ (Species carminativae). Состав: листьев мяты перечной 2 части, плодов укропа 1 часть, корневища с корнями валерианы 2 части. Применяют при метеоризме в виде настоя (1 ст. л. на стакан кипятка) по 1/4-1/2 стакана утром и вечером.

СБОРЫ ВИТАМИННЫЕ (Species vitaminosae). Состав сбора витаминного N 1: плодов шиповника 1 часть, плодов смородины черной 1 часть. Состав сбора витаминного N 2: плодов шиповника 1 часть, плодов рябины 1 часть. Применяют в тех же случаях, что и плоды шиповника в виде настоя (2 ч.л. сбора на 2 стакана кипятка) по 1/2 стакана 3-4 раза в день.

СБОРЫ ГРУДНЫЕ (Species pectorales). Состав сбора грудного N 1: корня алтея 4 части, листьев мать-и-мачехи 4 части, травы душицы 2 части. Состав сбора грудного N 2: листьев мать-и-

мачехи 4 части, листьев подорожника большого 3 части, корней солодки 3 части. Применяют как отхаркивающее средство при заболеваниях верхних дыхательных путей в виде настоя (1 ст.л. на стакан кипятка) по 2-3 ст.л. 2-3 раза в день.

СБОР ЖЕЛУДОЧНЫЙ (Species stomachicae). Состав: коры крушины, листьев крапивы по 3 части, листьев мяты перечной 2 части, корневищ аира 1 часть, корневищ с корнями валерианы 1 часть. Применяют как средство, регулирующее деятельность желудочно-кишечного тракта в виде настоя (1 ст.л. на стакан кипятка) по 1/2 стакана утром и вечером.

СБОР ЖЕЛЧЕГОННЫЙ (Species cholagogae). Состав сбора желчегонного N 1: цветков бессмертника песчаного 4 части, листьев трилистника водяного 3 части, листьев мяты перечной 2 части, плодов кориандра 2 части. Состав сбора желчегонного N 2: цветков бессмертника песчаного 4 части, травы или листьев тысячелистника 2 части, листьев мяты перечной 2 части, плодов кориандра 2 части. Применяют как желчегонное средство при холециститах, гепатитах, холангитах, гепатохолециститах в виде настоя (2ст.л. на 2 стакана воды) по 1/2 стакана 3 раза в день за 15-30 мин до еды.

СБОР МОЧЕГОННЫЙ N 2 (Species diureticae N 2). Состав: листьев толокнян-

ки и плодов можжевельника по 2 части, корней солодки 1 часть. Применяют как мочегонное средство при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей в виде настоя (1 ст.л. на стакан кипятка) по 1 ст.л. 3-5 раз в день.

СБОРЫ ПОТОГОННЫЕ (Species diaphoreticae). Состав сбора потогонного N 1: цветков липы 1 часть, плодов малины 1 часть. Состав сбора потогонного N 2: листьев мать-и-мачехи 4 части, травы душицы 2 части, плодов малины 4 части. Применяют при простудных заболеваниях в виде настоя (2 ст.л. на 2 стакана воды) как чай в горячем виде по 1/2 стакана 3-4 раза в день.

СБОР ПРОТИВОГЕМОРРОИДАЛЬНЫЙ (Species antihaemorrhoidas). Состав: листьев сенны 20 частей, травы тысячелистника 20 частей, коры крушины 20 частей, плодов кориандра 20 частей, корней солодки 20 частей. Улучшает перистальтику кишечника. Применяют при запорах, геморрое в виде настоя (1 ст.л. на стакан воды) на ночь по 1/2-1 стакану.

СБОРЫ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ (Species laxantes). Состав слабительного сбора N 1: коры крушины 3 части, листьев крапивы 2 части, травы тысячелистника 1 часть. Состав слабительного сбора N 2: листьев сенны 6 частей, коры крушины 5 частей,

плодов жостера 5 частей, плодов аниса 2 части, корней солодки 2 части. Применяют при хронических запорах, колитах, энтероколите в виде настоя (1 ст.л. на стакан воды) по 1/4-1/2 стакана на ночь.

СБОР УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ (Species sedativae). Состав: листьев мяты перечной 2 части, листьев трилистника по 2 части, корневищ с корнями валерианы 1 часть, соплодий хмеля 1 часть. Применяют при повышенной нервной возбудимости, бессоннице в виде настоя (2 ст.л. на стакан кипятка) 2 раза в день по 1/2 стакана.

СВИНЦА ОСНОВНОГО АЦЕТАТА РАСТВОР (0,5% водный раствор) (Plumbi subacetas solutio). Применяют как вяжущее средство при воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Наружно для примочек, компрессов и спринцевания.

СВИНЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ ПРОСТОЙ (Emplastrum plumbi simplex). Состав: окиси свинца 10 г, свиного жира 10 г, масла подсолнечного 10 г, воды достаточное количество. Применяют в качестве антисептического средства при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи.

СВИНЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ СЛОЖНЫЙ (Emplastrum plumbi compositum). Состав: пластыря свинцово-

го простого 85 частей, канифоли 10 частей, терпентина 5 частей. Применяют в качестве антисептического средства при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи.

"СЕДАЛЬГИН" ("Sedalgin"). Состав: кодеина фосфата 0,01 г, кофеина 0,05 г, фенацетина 0,2 г, ацетилсалициловой кислоты 0,2 г, фенобарбитала 0,025 г. Оказывает жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное действие. Применяют при мигрени, невралгиях, неврите, артрите, радикулите и др. Внутрь по 1 табл. 2-3 раза в день.

СЕКУРИНИНА НИТРАТ (Securinini nitras). Алкалоид, выделенный из травы Securinega Suffruticosa Pall. Возбуждает ЦНС, повышает возбудимость спинного мозга. Применяют при астенических состояниях, неврастении, быстрой утомляемости, ослаблении сердечной деятельности, вялых парезах и параличах, импотенции на почве функциональных нервных нарушений. Внутрь 2-3 раза в день по 0,002 г или по 10-20 капель 0,4% раствора, подкожно по 1 мл 0,2% раствора 1 раз в день. Противопоказан при гипертонии, бронхиальной астме, стенокардии, выраженном атеросклерозе, нефрите, склонности к судорожным реакциям, гипертиреозе.

СЕМАП (Semap). Синонимы: Penfluridolum, Longoperidol. Состав: 1

...й морфин 10 ...
...ностей. Применяют ...
...ческого средства при ...
...х заболеваниях ...

...ИН" ("Sedalgin"). Сост...
...а 0,01 г, кофеина 0,05 ...
...2 г, ацетилсалицилов...
... фенобарбитала 0,025 г ...
...онижающее, болеут...
...ивовоспалительное дейс...
... при мигрени, невралг...
...рите, радикулите и ...
... 2-3 раза в день.

...ИНА НИТРАТ (Secur...
...оид, выделенный из ...
...ffruticosa Pall. Возбужд...
...ет возбудимость спинн...
...няют при астеническ...
...астении, быстрой утом...
...ении сердечной деятель...
...езах и параличах, псих...
... функциональных нер...
... Внутрь 2-3 раза в де...
... 10-20 капель 0,4% р-ра...
...по 1 мл 0,2% раствора ...
...опоказан при гиперто...
...ме, стенокардии, выра...
...розе, нефрите, склонн...
...еакциям, гипертиреоз...

...Semap). Синонимы...
...ngoperidol. Состав...

табл. содержит 20 мг пенфлуридола. Оказывает пролонгированное нейролептическое действие. Наиболее показан как средство для поддерживающей терапии у больных малопрогредиентной и вялотекущей шизофренией. Внутрь по 20-60 мг (иногда до 100 мг) 1 раз в 5-7 дней (средняя доза 40-60 мг в неделю). Определение дозы строго индивидуально. Лечение проводят месяцами, иногда в течение 1-2 лет. Отменять его следует постепенно. Не следует назначать женщинам в первые 3 мес беременности.

СЕНАДЕКСИН (Senadexinum). Препарат содержит сумму действующих веществ александрийского листа, в состав которой входит 20% сеннозидов А и Б в форме солей кальция. Близок к препаратам сенаде и глаксена. Оказывает слабительное действие. Назначают взрослым при запорах различной этиологии. Внутрь, обычно на ночь по 1 табл. При отсутствии эффекта через несколько дней разовую дозу можно увеличить до 2-3 табл. При приеме препарата моча становится желто-коричневого или красновато-лилового цвета. Слабительное действие может сопровождаться коликообразной болью в животе. Большие дозы могут вызвать понос или метеоризм. Противопоказан при спастическом колите, аппендиците, кишечной непроходимости, беременности, а также в период лактации.

СЕНЗИТ (Sensit). Синонимы: Fedilin

hydrochlorid, Phenoxan. Состав: 1 драже содержит фендилина гидрохлорида. Увеличивает коронарный кровоток и снабжение сердца кислородом, повышает устойчивость миокарда к гипоксии. Применяют при коронарной недостаточности, стенокардии, [illegible]ном склерозе, профилактике повторного инфаркта миокарда, постинфарктных состояний. По 1 драже 3 раза в день. Возможны головная боль, беспокойство. Противопоказан в острой фазе инфаркта миокарда. При беременности применять только в исключительных случаях.

СЕНКАТАЛИН (Sencatalin). Средство, затормаживающее развитие катаракты. Применяют при старческой и диабетической катаракте. Растворяют таблетку в 15 мл растворителя. Полученный ярко-желтый глазной раствор закапывают в глаза по 1-2 капли 5 раз в день.

СЕННЫ ЛИСТ (Folium Sennae). Синонимы: лист кассии, александрийский лист. Содержит антрагликозиды, хризофановую кислоту, смолистые вещества. Применяют в качестве слабительного средства при хронических запорах в виде настоя (10,0:200,0-20,0:200,0) по 1 ст.л. или 1 ч.л. 1-3 раза в д/ень.

СЕРА ОСАЖДЕННАЯ (Sulfur praecipitatum). Применяют при кожных забо-

ваниях (себорея, сикоз, псориаз и др.) наружно в виде 5%, 10%, 20% мазей и присыпок.

СЕРА ОЧИЩЕННАЯ (Sulfur depuratum). Применяют в качестве противоглистного средства при энтеробиозе, а также в психиатрии для пирогенной терапии (шизофрения, прогрессивный паралич и др.), при кожных заболеваниях (псориаз, себорея, сикоз, чесотка). Назначают внутрь взрослым по 0,8-1 г на прием 3 раза в день в течение 5 дней. Наружно в дерматологии в виде 5%, 10% и 20% присыпок и мазей.

СЕРЕБРА НИТРАТ (Argenti nitras). Синоним: ляпис. Антисептическое и противовоспалительное средство. Применяют при эрозиях, язвах, избыточных грануляциях, трещинах, остром конъюнктивите, хроническом гиперпластическом ларингите, хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Наружно в виде 2%, 5% и 10% растворов, 1-2% мазей, ляписных карандашей; внутрь в виде 0,05-0,06% раствора или в пилюлях. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,03 г, суточная 0,1 г.

СЕРМИОН (Sermion). Синоним: ницерголин. Снижает тонус мозговых и периферических сосудов, уменьшает цереброваскулярное сопротивление и уве-

ичивает мозговой кровоток, активизиру-
т обмен веществ в головном мозге. При-
меняют при острых и хронических цереб-
ральных и периферических сосудисто-ме-
таболических нарушениях (церебральный
артериосклероз, инсульт; неустановивша-
яся церебральная ишемия, профилактика
мигрени и сосудистой головной боли; под-
держивающее лечение при повышении
АД). В/м 4 мг распределяют на 1-2 введе-
ния в день. В/в 4-8 мг в 100 мл изотониче-
ского раствора натрия хлорида. Способы
введения, дозы и время терапии устанав-
ливают индивидуально. Возможны голово-
кружение, сонливость и бессонница. Про-
тивопоказан при чрезмерной чувствитель-
ности к ницерголину.

СЕРОТОНИНА АДИПИНАТ (Sero-
tonini adipinas). Гемостатическое средст-
во, применяемое при патологических со-
стояниях, сопровождающихся геморрагиче-
ским синдромом (болезнь Верльгофа, ги-
по- и апластическая анемия,
тромбастения, геморрагический васкулит).
В/в капельно (в 100-150 мл изотониче-
ского раствора хлорида натрия) или в/м
(в 5 мл 0,5% раствора новокаина), начи-
ная с 0,005 г с постепенным повышением
дозы (при отсутствии побочных явлений)
до 0,01 г; в/м вводят 2 раза в сутки с ин-
тервалами не менее 4 ч. Суточная доза
для взрослых 0,015-0,02 г. Курс лечения
в среднем 10 дней. При быстром введе-

нии в вену возможны боль по ходу вены и в животе, неприятные ощущения в области сердца, повышение АД, тяжесть в голове, затруднение дыхания, тошнота, диарея, уменьшение диуреза, боль в месте инъекции при в/м введении. Противопоказан при гломерулонефрите, хронических нефрозах, заболеваниях почек, сопровождающихся олигурией, гипертонической болезни II-III стадии, острых тромбозах, отеке Квинке, бронхиальной астме, заболеваниях, сопровождающихся повышением свертываемости крови.

СИБАЗОН (Sibazonum). Синонимы: Seduxen, Relanium, Valium и др. Фармакологическое действие. Транквилизатор, оказывающий успокаивающее влияние на ЦНС, понижающий мышечный тонус, обладающий выраженными противосудорожными свойствами. Применяют при неврозах, психопатиях, неврозоподобных и психопатоподобных состояниях при шизофрении, органических заболеваниях головного мозга (в том числе при цереброваскулярных заболеваниях), соматических болезнях, сопровождающихся признаками эмоционального напряжения, тревоги, страха, повышенной раздражительностью, сенесто-ипохондрическими, навязчивыми и фобическими расстройствами, нарушениями сна; для купирования психомоторного возбуждения и тревожной агитации при указанных выше заболеваниях. В детской психоневрологической практике ре-

комендуются при невротических и неврозоподобных состояниях, сопровождающихся указанными выше симптомами, а также головной болью, энурезом, нарушениями настроения и поведения. При эпилепсии назначают для лечения судорожных пароксизмов, психических эквивалентов, для купирования эпилептического статуса. Применяют также для снятия спастических состояний, связанных с поражениями головного и спинного мозга, а также при других заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся напряжением мышц. В комплексе с другими препаратами используют для лечения синдрома абстиненции при алкоголизме, при предоперационной подготовке больных и в послеоперационном периоде, в дерматологической практике при экземе и других заболеваниях, сопровождающихся зудом, раздражительностью. Способ применения и дозы. Назначают внутрь, в/в или в/м. При назначении следует соблюдать принцип постепенного повышения дозы до получения лечебного эффекта и постепенного снижения дозы при отмене препарата. При введении внутрь средняя разовая доза для взрослых 0,005-0,015 г (5-15 мг). В отдельных случаях ее можно увеличить до 0,02 г (20 мг). Суточная доза обычно - 0,015-0,045 г (15-45 мг), максимальная суточная - 0,06 г (60 мг). Дозу для детей и

продолжитель-ность курса лечения подбирают индивидуально. Средняя разовая доза при приеме внутрь для детей от 1 года до 3 лет - 0,001 г (1 мг), от 3 до 7 лет - 0,002 г (2 мг), от 7 лет и старше - 0,003-0,005 г (3-5 мг). Средние суточные дозы сибазона соответственно возрастным группам составляют 0,002 г (2 мг), 0,006 г (6 мг) и 0,008-0,01 г (8-10 мг). У детей старшей возрастной группы при необходимости суточную дозу можно увеличить до 0,014-0,016 г (14-16 мг). Суточную дозу делят на 2-3 приема (можно комбинировать с антидепрессантами и нейролептиками). Длительность непрерывного курса лечения не должна превышать 2 мес. Перед повторным курсом лечения перерыв должен быть не менее 3 нед. В/в (капельно или струйно) и в/м сибазон применяют у взрослых в основном при заболеваниях, сопровождающихся психомоторным возбуждением, судорогами, при купировании эпилептического статуса, при лечении острых тревожно-фобических, тревожно-депрессивных состояний, в том числе при алкогольных психозах и абстиненции. Средняя разовая доза 10 мг (2 мл 0,5% раствора), средняя суточная доза 30 мг, максимальная разовая доза 30 мг. Максимальная суточная - 70 мг. Положительный седативный эффект наблюдается уже через несколько минут после в/в и через 30-40 мин после в/м введения, терапевтическое дей-

ствие – через 3-10 дней. После снятия острых проявлений болезни лечение сибазоном продолжают, назначая его внутрь. При эпилептическом статусе сибазон вводят медленно в/в в дозе 10-40 мг. При необходимости повторяют в/в или в/м введение каждые 3-4 ч (3-4 раза). Применяют препарат в/в также в хирургической практике в составе премедикации и в послеоперационном периоде (10-40 мг), а также для усиления нейролептаналгезии (30-40 мг). Сибазон не следует вводить в одном шприце с другими препаратами во избежание выпадения осадка. Возможны мышечная слабость, сонливость, вялость, атаксия, сухость во рту, головокружение. В редких случаях наблюдаются кожно-аллергические высыпания. При в/в введении возможны локальные воспалительные процессы. Противопоказан при тяжелых формах печеночной и почечной патологии, миастении, беременности. При лечении сибазоном категорически запрещается употребление алкоголя. Из-за седативного действия и возможного нарушения координации движений нельзя принимать препарат во время работы водителям транспорта и другим лицам, профессия которых требует быстрой психической и двигательной реакции.

СИГЕТИН (Sygethinum). Усиливает сокращение матки, тормозит гонадотропную функцию гипофиза, улучшает пла-

центарное кровообращение. Применяют как лечебное и профилактическое средство при внутриутробной асфиксии плода и климактерических расстройствах у женщин. В/в 2-4 мл 1% раствора в 20-40 мл 40% раствора глюкозы; при необходимости инъекции повторяют через 30 мин -1 ч; для профилактики угрожающей асфиксии плода вводят в/м или в/в по 1-2 мл 1% раствора ежедневно в течение 10 дней; при климактерических расстройствах у женщин назначают внутрь по 0,01-0,05 г 2 раза в день или в/м 1-2 мл 1% раствора 1 раз в день. Курс 30-40 дней.

СИГНОПАМ (Sygnopam). Производное бензодиазепина, обладающее сильным болеутоляющим и противофобийным свойством. Применяют при состояниях напряжения и страха, неврозах, протекающих с пониженным настроением, вегетососудистой дистонии, судорожных состояниях, бессоннице, до и после хирургических вмешательств; в ходе лечения сосудистых заболеваний мозга и нерезко выраженной мигрени. В легких случаях по 5 мг 2-3 раза в день, в тяжелых по 10 мг 2-3 раза в день. Во время применения препарата запрещается управлять автотранспортом. Иногда возможны сонливость, утомление, головокружение, тошнота. Противопоказан при беременности, глаукоме, в преклонном возрасте.

СИДНОКАРБ (Sydnocarbum). Оказывает выраженное стимулирующее влияние на ЦНС, не имеет отчетливой периферической симпатомиметической активности, не вызывает привыкания. Применяют при астенических состояниях в результате физического и психического переутомления, после тяжелых заболеваний и черепно-мозговых травм, при невротических расстройствах с заторможенностью, вялотекущей шизофрении с апатоабулическими расстройствами. Внутрь по 0,005 г 2 раза в день; при необходимости дозу повышают до 0,05 г/сут. Высшая разовая доза 0,075 г, суточная 0,15 г. При передозировке возможны головная боль, бессонница, потеря аппетита, повышение АД. Противопоказан при выраженном возбуждении, выраженном атеросклерозе, гипертонической болезни III стадии.

СИДНОФАРМ (Sydnopharm). Синонимы: Corvaton, Molsidomin. Фармакологическое действие. Длительно действующее средство для лечения больных с коронарной недостаточностью. Применяют при приступах стенокардии, возникающих на фоне хронической коронарной недостаточности, в том числе после перенесенного инфаркта миокарда. Внутрь по 1/2-1 табл. 2-3 раза в день после еды; для получения быстрого эффекта препарат можно назначать сублингвально. При

приеме внутрь действие наступает в тече-
ние первых 20 мин, сублингвально - в те-
чение 5-10 мин, продолжительность 6-8 ч.
В начале лечения ваозможны головная
боль, незначительное снижение АД, про-
ходящее после уменьшения дозы препа-
рата. Противопоказан при кардиогенном
шоке и тяжелой гипотонии, при остром
инфаркте миокарда назначают под стро-
гим контролем гемодинамики; в первые 3
мес беременности применяют только по
жизненно необходимым показаниям.

СИДНОФЕН (Sydnophenum). Ока-
зывает стимулирующее действие на ЦНС.
Применяют при астенических состояниях,
вызванных переутомлением и соматиче-
скими заболеваниями; невротических со-
стояниях, психопатиях, апатоабуличе-
ских расстройствах при вялотекущей ши-
зофрении, нерезко выраженных адина-
мических депрессиях в рамках
циклотимии и реактивных состояний.
Внутрь по 0,005 г 1-2 раза в день, при не-
обходимости дозу постепенно повышают
до 0,06-0,08 г. При передозировке и пло-
хой переносимости головная боль, голо-
вокружение, повышение АД, боль в обла-
сти сердца. Противопоказан при заболе-
ваниях печени и почек, стойкое повыше-
нии АД выраженном атеросклерозе.

СИЗОМИЦИНА СУЛЬФАТ (Si-
somycini sulfas). Синонимы: сизомин, па-

... и др. Антибиотик, продуцируемый Micromonospora fusca var. sisomycini ... Обладает широким спектром антимикробного действия, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе стафилококков, включая пенициллин- и метициллинустойчивые штаммы. Применяют при тяжелых гнойно-септических заболеваниях, тяжелых инфекционно-воспалительных заболеваниях органов дыхания, инфекциях почек и мочевыводящих путей, инфицированных ожогах.и других заболеваниях, вызванных преимущественно грамотрицательными микроорганизмами [Proteus, Klebsiella, Enterobacter, E.coli, Ps.aeruginosa и др.], устойчивыми к другим антибиотикам, или ассоциациями грамположительных и грамотрицательных возбудителей. Применяют для лечения взрослых и детей в/м или в/в (капельно). В зависимости от заболевания и его тяжести лечение проводят по схеме (см. инструкцию по применению сизомицина). Растворы готовят непосредственно перед введением. Для в/в капельного введения добавляют к разовой дозе для взрослых 50-100 мл 5% раствора глюкозы иди изотонического раствора натрия хлорида, для детей 30-50 мл 5% раствора глюкозы. Скорость введения у взрослых 60 капель в 1 мин, у детей - 8-10 капель в 1 мин. В/в вливание проводят обычно в те-

чение 2-3 дней, затем переходят на в/м инъекции. Может оказывать нефро- и ототоксическое действие, в редких случаях - нарушение нервно-мышечной проводимости и угнетение дыхания. При в/в введении возможно развитие перифлебитов и флебитов. В редких случаях наблюдаются аллергические реакции (кожные сыпи, зуд, отек). Противопоказан при аллергии к препарату, азотемии (остаточный азот в крови выше 70,4 ммоль/л, или 100 мг %), заболеваниях слухового и вестибулярного аппаратов, связанных с невритом VIII пары черепных нервов, миастении. Не следует применять (совместно или последовательно) с препаратами, обладающими ото- и нефротоксическими свойствами (стрептомицин, канамицин, гентамицин, флоримицин, мономицин, ристомицин, полимиксин B), а также одновременно с диуретиками и курареподобными средствами.

СИКОРТЕН (Sicorten). Высокоактивный кортикоид для местного применения с выраженным противовоспалительным, антиаллергическим, противозудным, антиэкссудативным и антипролиферативным действием. Крем и мазь назначают при заболеваниях кожи, хорошо реагирующих на действие кортикоидов для местного применения: острой контактной экземе (остром контактном дерматите), обострении эндогенной экзе-

...мы (конституциональной экземе, атопическом дерматите, нейродерматите), [illegible] экземе (нуммулярном дерматите), [illegible]. Наносят на пораженный участок кожи и слегка втирают 2 раза в день. Длительное использование препарата может вызвать атрофию кожи, образование на [illegible], телеангиэктазию, пурпуру, [illegible] пигментации, гипертрихоз и [illegible] инъекции. В этих случаях препарат следует отменить и провести [illegible] лечение. Противопоказан при туберкулезе кожи, сифилитических поражениях кожи, свежих вирусных инфекциях кожи, кожных реакциях на действие вакцин, пиодермиях и грибковых поражениях кожи.

СИЛАБОЛИН (Silabolinum). Оказывает пролонгированное анаболическое действие, усиливает синтез белка и приводит к положительному балансу азота, калия, натрия, кальция, фосфора, серы в организме. Применяют при состояниях, сопровождающихся усилением распада белка и отрицательным балансом азота; при астении, кахексии различного происхождения, травмах и ожогах, длительной терапии глюкокортикоидами, при остеопорозе, длительно не заживающих переломах, атеросклеротическом кардиосклерозе и ишемической болезни сердца, хронических заболеваниях почек (без склонности к отекам), печени и желчных

путей, для стимуляции [illegible]

[illegible]

раз в 7-14 дней. Лечение [illegible] ние 1-2 мес с последующим [illegible] мес. При наличии показаний [illegible] ряют. При передозировке у женщин возможно появление симптомов вирилизации. Противопоказан при раке предстательной железы, острых заболеваниях печени, беременности, в период лактации.

СИЛИБОР (Siliborum). Представляет собой сумму флаволигнанов, получаемых из плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum). Оказывает гепатозащитное действие. Применяют при различных формах гепатита и цирроза печени. Внутрь до еды по 0,04-0,08 г 3 раза в день ежедневно. Курс 1-2 мес, при необходимости можно продлить до 3-6 мес или повторить через 1-2 мес. Возможны аллергические реакции (кожные высыпания, зуд и т.д.).

СИНАКТЕН-ДЕПО (Synacten-Depo). Кортикотропный препарат пролонгированного действия, обладающий всеми фармакологическими свойствами

эндогенного АКТГ, имеет постоянный состав, не содержит чужеродных для организма белков. Стимулирует кору надпочечников. Применяют при коллагенозах (ревматоидный артрит и др.), аллергических заболеваниях (бронхиальная астма, ангионевротический отек), дерматозах различной этиологии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвенный колит). Назначают в/м вначале по 1 мг в день, а в острых случаях (астматический статус и в онкологической практике) - по 1 мг каждые 12 ч. После исчезновения острых явлений препарат вводят по 1 мг каждые 1-2 дня с последующим снижением дозы до 0,5 мг каждые 2-3 дня или 1 мг 1 раз в неделю. Детям - в/м через 1-7 дней; детям грудного возраста по 0,25 мг, младшего возраста 0,25-0,5 мг, школьного возраста по 0,25-1 мг. Возможны понижение сопротивляемости к инфекциям, психические нарушения, остеопороз, пептическая язва, пигментация кожи и др. При длительном назначении препарата необходимо дополнительное введение калия в организм. Противопоказан при повышении чувствительности к препарату, острых психозах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, беременности, сердечной недостаточности; при необходимости одновременного применения противодиабетических и гипотензивных средств дозировка этих препаратов пересматривается.

СИНАФЛАН (Synaflanum). Синонимы: Synandone, Flucort, Fluocinoloni acetonidum. Обладает противовоспалительными, антиаллергическими и противозудными свойствами. Назначают взрослым в комплексной терапии при воспалительных и аллергических заболеваниях кожи немикробной этиологии (экзема, нейродермиты, диффузный зуд, псориаз и другие хронические сухие формы воспалительных и аллергических заболеваний кожи), линимент синафлана применяют больным с островоспалительными экссудативными заболеваниями кожи (себорейная экзема, аллергические дерматиты, зуд заднего прохода и половых органов, экссудативная форма псориаза). Мазь или линимент наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза в день. Продолжительность лечения зависит от характера заболевания и эффективности терапии, составляет обычно 5-10 дней. Курс может быть продлен до 25 дней и более. При длительном применении возможны вторичные инфекционные поражения кожи и атрофические изменения в ней, в этих случаях рекомендуется назначать синафлан в сочетании с антимикробными средствами. Противопоказан при инфекционных заболеваниях кожи, наличии

...язвенных поражений и ран на участках аппликаций, беременности. Не рекомендуется длительное применение на обширных участках кожи.

СИНКУМАР (Syncumar). Синонимы: Acenocumarol, Trombostop. Антикоагулянт непрямого действия. Показания к применению, побочное действие и противопоказания те же, что для дикумарина и других аналогичных препаратов. Дозы устанавливают индивидуально. Обычно в 1-й день назначают 0,016-0,012 г, постепенно дозы уменьшают до 0,004-0,002-0,001 г.

СИНТОМИЦИНА ЛИНИМЕНТ (Linimentum synthomycini). Синоним: эмульсия синтомицина. Применяют при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, инфицированных ожогах, сикозе, трахоме. Только местно в виде 1%, 5% и 10% эмульсии и в суппозиториях по 0,25 г 1-2 раза в день.

СИНЭСТРОЛ (Synoestrolum). Синонимы: Dihydrostilbostrol, Novostrol. Эстрогенный гормон, применяемый при раке молочной железы у женщин в возрасте старше 60 лет, гипертрофии и раке предстательной железы и других заболеваниях, при которых показано применение эстрогенных препаратов. Внутрь по 0,002 г (2 мг) 1-2 раза в день, подкожно и в/м по 1-2 мл 0,1% или 2% раствора. Способ...

введения и дозы определяются врачом в зависимости от заболевания. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,002 г, суточная 0,004 г; в/м разовая 0,002 г, суточная 0,003 г; при злокачественных новообразованиях разовая 0,06 г, суточная 0,1 г (в/м). Возможны тошнота, рвота, головокружение; при применении больших доз токсическое повреждение печени, выраженная пролиферация эндометрия и кровотечения у женщин, феминизация у мужчин. Противопоказан при беременности, заболеваниях печени и почек.

СИНЮХИ ЛАЗУРНОЙ КОРНЕВИЩЕ С КОРНЯМИ (Rhizoma cum radicibus Polemonii coerulei). Содержит тритерпеновые сапонины (20-30%), основная часть которых кислые сапонины (96%) и нейтральные сапонины (4%), смолы (1,25%), органические кислоты; жирные и эфирные масла. Внутрь в виде настоев (6,0:200,0-8,0:200,0) или отваров (3,0:200,0-6,0:200,0) по 1 ст.л. 3-5 раз в день после еды как отхаркивающее при бронхитах, как успокаивающее и болеутоляющее при язвенной болезни желудка в виде отвара по 1 ст.л. 3 раза в день после еды совместно с настоем сушеницы болотной (10,0:200,0) по 3 ст.л. 3 раза в день до еды.

СИРЕПАР (Syrepar). Гидролизат печени крупного рогатого скота, содержа-

щий в 1 мл 10 мкг цианокобаламина. Применяют при хроническом и подостром гепатите, циррозе и ожирении печени, при токсических поражениях печени, токсикозе беременных в/м или в/в (медленно) 1-2 мл 1 раз в сутки в течение 50-60 дней.

СКИПИДАРНАЯ МАЗЬ (Unguentum terebinthinae). Состав: масла скипидарного очищенного 20 г, эмульсионной основы (вода/вазелин) 80 г. Применяют при артритах, миозитах, невралгиях для растираний.

СКОПОЛАМИНА ГИДРОБРОМИД (Scopolamini hydrobromidum). Бромистоводородная соль скополамина - алкалоида, содержащегося в красавке, белене, дурмане и скополии. Синоним: Hyoscini hydrobromidum. Активное периферическое м-холинолитическое средство; оказывает также центральное холинолитическое и седативное действиее. Применяют в психиатрии как успокаивающее средство; при паркинсонизме; для подготовки к наркозу; при морской болезни; в офтальмологии при иритах, иридоциклитах и для расширения зрачка. Внутрь по 0,00025-0,0005 г 2-3 раза в день до еды; в офтальмологии назначают по 1-2 капли 0,25% раствора 1-2 раза в день. Высшая разовая доза 0,0005 г, суточная 0,0015 г. Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении атропина сульфата.

СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ ПЛОДЫ (Fructus Ribis nigri). Содержат аскорбиновую кислоту, витамин B1, антоцианы, катехины, пектиновые и дубильные вещества, органические кислоты, сахар. Применяют как поливитаминное средство для профилактики и лечения авитаминозов и гиповитаминозов в виде настоя (3 ст.л.плодов на стакан кипящей воды) по 1/2 стакана 1-3 раза в день.

СОЛИДОЛОВАЯ МАЗЬ (ПО ПРОПИСИ РЫБАКОВА) (Unguentum Solidoli Ribacovi). Состав: эмульсионного солидола 75 г, вазелина 20 г, ментола 0,5 г, кислоты борной 5 г. При псориазе втирают в очаги поражения (по направлению роста волос) 1-2 раза в день.

СОЛИЗИМ (Solizymum). Липолитический ферментный препарат, получаемый из культуры Penicillium solitum. Гидролизует растительные и животные жиры, способствует их перевариванию и усвоению. Применяют при хроническом панкреатите с понижением липолитической активности, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, гепатиты, холециститы, энтериты, энтероколиты), после операций на поджелудочной железе, кишечнике, желчном пузыре. Внутрь во время или сразу после еды по 40 000 ЛЕ (липолитическая

единица) 3 раза в день. Суточная доза 120 000 ЛЕ. Курс 2-4 нед.

"СОЛИМОК" ("Solimokum"). Синонимы: Blemaren, Soluran, Uralit-U. Цитратная смесь, содержащая в 100 г калия цитрата 46,3 г, натрия цитрата 39 г, кислоты лимонной 14,5 г, вспомогательные и корригирующие вещества. Оказывает ощелачивающее мочу действие при уратном литиазе, способствуя растворению мочевых камней, уменьшению их размеров и самопроизвольную их отхождению. Применяют для лечения и профилактики мочекислого литиаза; при наличии уратных камней в почке, мочеточнике или мочевом пузыре, периодическом отхождении мочекислых камней с мочой; состоянии после оперативного удаления мочекислых камней; при мочекислом диатезе (уратурии). Применяют внутрь в точном соответствии с инструкцией по применению, приложенной к препарату. При передозировке наблюдается повышение pH мочи. Если моча остается инфицированной длительное время, мочекислые камни покрываются известковой оболочкой и дальнейший их литолиз становится затруднительным. При pH мочи выше 7,0 резко снижается растворимость фосфатов, которые могут выпадать в осадок. При применении солимока возможны боль в эпигастральной области и диспептические явления. Противопоказани

[illegible] и значите[illegible] [illegible] при [illegible] в климактерическом [illegible] при [illegible] намики, тяжелых форм [illegible] недостаточности и гипертонической [illegible]

СОЛОДКИ (ЛАКРИЦЫ) КОРЕНЬ (Radix Glycyrrhizae, Radix Liquiritiae). Содержит глицирризин [illegible] ликвиритин, ликвири[illegible] рин, пектины, сахар, крахмал. Применяют в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях легких, [illegible] щихся кашлем, как противо[illegible] и спазмолитическое средство при гипер[illegible]ацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в виде настоя (15,0:200,0) по 1 ст. л. 4-5 раз в день.

СОЛУТАН (Solutan). Состав: радобелина (алкалоид корня красавки) 0,1 мг, сапонина gipsophillae 1 мг, фенхелевого масла 0,4 мг, новокаина 4 мг, эфедрина гидрохлорида 17,5 мг, экстракта толутанского бальзама 25 мг, натрия йодида 100 мг, воды горькоминдальной 30 мг, спирта, воды до 1 мл. Оказывает бронхолитическое и отхаркивающее действие. Применяют при бронхиальной астме, бронхитах. Внутрь по 10-30 капель 3 раза в день после еды, при астматических приступах до 60 капель на прием; солутан можно применять и для ингаляций. Возможны расширение зрачков, сухость во рту. Противопоказан при глаукоме.

СОЛЮСУЛЬФОН (Solusulfonum). Синонимы: Novotrone, Solaspone, Sulphonazine. Обладает антибактериальной активностью в отношении микобактерий лепры. Применяют при лепре в/м в виде 50% водного раствора по специальной схеме. Возможны общая слабость, понижение аппетита, диспептические явления, головокружение, головная боль, сердцебиение, боль в области сердца; реже - цианоз, анемия, токсический гепатит. Для предупреждения и уменьшения побочного действия рекомендуется назначать витамины и препарат железа. Противопоказан при болезни печени, почек, анемии. Не назначать вместе с амидопирином и барбитуратами.

СОЛЮСУРЬМИН (Solusurminum). Натриевая соль комплексного соединения пятивалентной сурьмы и глюконовой кислоты. Синонимы: Solustibosan, Pentostam, Stibatin. Оказывает антипротозойное действие на лейшмании. Применяют при висцеральном и кожном лейшманиозе (в/в, в/м и подкожно). При висцеральном лейшманиозе ежедневно в течение 10-15 дней в виде 10-20% раствора на дважды дистиллированной воде. Дозы (взрослым и детям) устанавливают из расчета 0,04 г/кг (первая инъекция); затем по 0,07 г/кг (вторая инъекция); 0,1-0,12 г/кг.

СОЛЮТИЗОН (solutizonum). Синоним: Tibon. Обладает бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза, в том числе штаммов, устойчивых к основным противотуберкулезным препаратам. Применяют: при туберкулезе верхних дыхательных путей, бронхов и легких; хроническом фиброзно-кавернозном туберкулезе, для подготовки к хирургическому лечению больных с хроническим фиброзно-кавернозным туберкулезом. Ингаляции (в виде аэрозоля), интратрахеально, интрабронхиально, интракавернозно. На одно введение 2-3 мл 1-2% раствора 1-2 раза в день в течение 1-2 мес. Возможны раздражение дыхательных путей, кашель. Противопоказан при тяжелых и декомпенсированных формах фиброзно-кавернозного процесса, сердечно-легочной недостаточности, кандидозе слизистых оболочек верхних дыхательных путей и полости рта.

СОМАТОТРОПИН ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Somatotropinum humanum pro injectionibus). Гормон передней доли гипофиза человека. Оказывает анаболическое действие, положительно влияет на минеральный обмен, вызывает увеличение роста и массы тела при карликовости, связанной с недостаточностью гормона роста. Применяют при нарушениях развития организма, связанных с недостаточностью гормона роста (гипо-

физарный нанизм). В/м по 2-4 ЕД 3 раза в неделю. Непосредственно перед введением порошок соматотропина растворяют в 2 мл воды для инъекций или 0,25-0,5% раствора новокаина (раствор опалесцирует). Лечение продолжают от 3 мес до 1 1/2-2 лет и более. Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд и др.). Противопоказан при злокачественных новообразованиях.

СОМБРЕВИН (Sombrevin). Синонимы: Epontol, Propanidid. Анестетик с ультракоротким наркотическим эффектом, применяемый для кратковременного и вводного наркоза. Вводят в/в быстро 5% раствор (5-10 мг/кг); истощенным больным пожилого возраста и детям 2,5% раствор. Хирургическая стадия наркоза продолжается 5-7 мин с последующим быстрым пробуждением. Возможны гиперемия и болезненность по ходу вены в месте инъекции; иногда тошнота и рвота. Противопоказан при шоке, гемолитической желтухе, выраженных нарушениях функции почек; необходима осторожность при нарушении коронарного кровообращения, гипертонии и декомпенсации сердечной деятельности.

СОМИЛАЗА (Somilasum). Комбинированный препарат, в состав которого входят солизим (липолитический фермент, получаемый из культуральной

жидкости Penicillium solutum) и α-амилаза, получаемая из аминосубтилина. Одна таблетка содержит 0,0286 г солизима 20 000 ЛЕ) и 0,1363 г α-амилазы (5000 ЕД). Гидролизуеть растительные и животные жиры и расщепляет полисахариды; в результате происходит компенсация ферментативной недостаточности пищеварения. Применяют при недостаточности функции поджелудочной железы, приводящей к уменьшению липолитической и амилалитической активности дуоденального содержимого (при хронических панкреатитах); недостаточности пищеварения (гастриты, энтериты, энтероколиты, гепатиты, холециститы(; после операций на поджелудочной железе, кишечнике, печени, желудке; при функциональных нарушениях, связанных с режимом питания. Внутрь во время еды по 1-2 табл. 3 раза в день (таблетку проглатывают целиком, не разжевывая) ежедневно.

СОНАПАКС (Sonapax). Синоним: Melleril. Мягкодействующий нейролептик, применяемый при острой и подострой шизофрении, органических психозах, тревожно-депрессивных и астенических состояниях, неврозах, неврастении, повышенной раздражительности. Внутрь по 0,01-0,025 г 2-3 раза в день. Возможны сухость во рту, экстрапирамидные расстройства, при длительном лечении

лейкопения, агранулоцитоз. Противопоказан при коматозном состоянии, аллергических реакциях, глаукоме.

СОСНОВЫЕ ПОЧКИ (Turiones Pini). Содержат эфирное масло, основной компонент которого пинен, смолу, дубильные вещества, горькое вещество пиницикрин, аскорбиновую кислоту. Применяют в качестве отхаркивающего и дезинфицирующего средства при хронических бронхитах в виде отвара (10,0:200,0) внутрь по 1 ст.л. 3-4 раза в день, наружно для ингаляций.

СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ НАСТОЙКА (Tinctura Sophorae japonicae). Применяется при гнойных воспалительных процессах (раны, ожоги, трофические язвы) в виде орошения, промывания, для влажных повязок.

СОФРАДЕКС (Sofradex). Состав: сефамицин 5 мг, грамицидин 0,05 мг, дексаметазон 0,5 мг, фенилэтанол 5 мг, наполнитель до 1 мл. Комплексный препарат, обладающий противовоспалительным, антибактериальным и противоаллергическим свойством. Применяют при заболеваниях глаз, ушей, сопровождающихся зудом (раздражением), воспалением и инфекцией; блефарите и инфекционной экземе век; аллергическом конъюнктивите; остром и хроническом

наружном отите. При заболевании глаз по 1-2 капли через 1-2 ч в течение 2-3 дней, затем дозу уменьшают до 1-2 капель 3-4 раза в день. При заболевании уха по 2-3 капли 3-4 раза в день. Введение капель чередуют с применением марлевых турунд, пропитанных этими каплями. Длительное местное применение может вызвать повышение внутриглазного давления и развитие катаракты; при заболеваниях, сопровождающихся истончением роговицы, возможно ее прободение. Противопоказан при вирусных заболеваниях роговицы, конъюнктивитах, туберкулезе и грибковых заболеваниях глаз, трахоме.

СПАЗМОЛГОН (Spasmolgon). Синоним: Baralgin. Оказывает выраженное спазмолитическое и болеутоляющее действие. Применяют при спазмах гладкой мускулатуры, особенно почечной колике, спазмах мочеточников, тенезмах мочевого пузыря, печеночной колике, спазмах желудка и кишечника. Внутрь по 1-2 табл. 3 раза в день, в тяжелых случаях - в/в медленно 5 мл. Возможны аллергические реакции, при длительном применении гранулоцитопения (требует отмены препарата).

СПАЗМОЛИТИН (Spasmolytinum). Синонимы: дифацил, Vagospasmyl. Обладает м-холинолитической активностью, подавляет н-холинореактивные системы

организма и оказывает спазмолитическое действие. Применяют при эндартериите, пилороспазме, спастических коликах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Внутрь после еды по 0,05-0,1 г 2-4 раза в день, в/м 5-10 мл 1 % раствора. При передозировке возможны сухость во рту, головокружение, головная боль, чувство опьянения, боль в подложечной области, местная анестезия. Противопоказан при глаукоме, работе, требующей быстрой психической и физической реакции.

СПИРОБРОМИН (Spirobrominum). Обладает противоопухолевой активностью; способен тормозить развитие лейкоза. Применяют при острых лейкозах (преимущественно в комбинированной терапии), злокачественных лимфомах, раке гортани и кожных ретикулезах. Можно использовать также и в комбинированной терапии, включая лучевое воздействие и оперативное вмешательство. В/в или в/м при острых лейкорзах применяют в сочетании с циклофосфаном, винкристином, L-аспарагиназой и другими препаратами. Назначают 200-800 мг/сут (в зависимости от числа лейкоцитов в периферической крови). Средняя суточная доза 500 мг. Если суточная доза не превышает 500 мг, вводят однократно; при больших дозах вводят дважды равными

частями. Курс лечения в комбинации с другими препаратами 7-14 дней. Перерыв между курсами 10-14 дней. Рекомендуется проводить не менее 2 курсов. При других злокачественных опухолях рекомендуется применять по 500 мг ежедневно в течение 10-30 дней. Курсовая доза зависит от числа лейкоцитов в периферической крови и может достигать 10-15 г. Курсы можно повторять через 1 1/2-2 мес. Возможны парестезии (в области лица, чаще носогубного треугольника). У отдельных больных наблюдаются лейкопения и тромбоцитопения, сердцебиение и боль в области сердца. Противопоказан в терминальной стадии болезни, при декомпенсированных заболеваниях печени, почек и сердечно-сосудистой системы, лейкопении и тромбоцитопении (лейкоциты менее $3 \cdot 10^9$/л, тромбоциты ниже $75 \cdot 10^9$/л).

СПИРТ МЫЛЬНЫЙ (Spiritus saponatus). Состав: кали едкого плавленного 23 части, воды 75 частей, масла подсолнечного или хлопкового рафинированного 100 частей, спирта этилового 95 частей. Применяют наружно при заболеваниях кожи.

СПИРТ МЫЛЬНЫЙ СЛОЖНЫЙ (Spiritus saponatus compositus). Состав: мыла жидкого (специального калийного) 639,53 г, спирта этилового 90% 212,32 г, спирта лавандового 84,20, воды дистил-

лированной 63,95 г. Применяют наружно при заболеваниях кожи.

СПЛЕНИН (Spleninum). Препарат из селезенки крупного рогатого скота. Нормализует азотистый обмен и повышает обезвреживающую функцию печени. Применяют при токсикозе в первые месяцы беременности в/м или подкожно по 2 мл ежедневно в течение 10 дней, в тяжелых случаях по 2 мл 2 раза в день. Курс 10-15 дней. При гипопаратиреозе по 1-3 мл 1-2 раза в день.

СТАЛЬНИКА НАСТОЙКА (Tinctura Ononidis). Спиртовое извлечение (1:5) на 70% спирте. Применяют при геморрое как кровоостанавливающее и нормализующее стул средство по 1 ч.л. 2-3 раза в день.

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО (Corpus vitreum). Препарат из стекловидного тела глаз крупного рогатого скота. Биогенный стимулятор стимулирует образование костной ткани. Применяют для размягчения и рассасывания рубцовой ткани (после ожогов, операции и др.), при контрактурах суставов, как обезболивающее средство при невралгиях, фатомной боли, радикулите под кожу ежедневно по 2 мл в течение 8-10 дней, при контрактурах и рубцах до 25 дней. Противопоказан при воспалительных процессах, общем истощении, нефрите, циррозе печени, сер-

дечной недостаточности с отеками, злокачественных опухолях.

СТЕРКУЛИИ НАСТОЙКА (Tinctura Sterculiae). Настойка (1:5) на 70% спирте Sterculia plantanifolia. Применяют как стимулирующее и тонизирующее средство при астении, переутомлении по 10–40 капель 2-3 раза в день в течение 3–4 нед. Возможны сухость во рту, сердцебиение, раздраженность, ухудшение сна.

СТЕФАГЛАБРИНА СУЛЬФАТ (Stephaglabrini sulfas). Алкалоид, выделенный из клубней с корнями стефании гладкой (Stephania glabra). Обладает антихолинэстеразной активностью; ингибирует истинную и ложную холинэстеразу. Применяют при заболеваниях ЦНС: миопатия (у взрослых), боковой амиотрофический склероз, парез лицевого нерва, сирингомиелия и др. В/м по 1-2 мл 0,25% раствора 2 раза в день. Курс 20-30 дней. Противопоказан при эпилепсии, гиперкинезах, бронхиальной астме, стенокардии, брадикардии.

СТРЕПТАЗА (Streptaza). Стрептокиназа, полученная из фильтрата культуры β-гемолизирующих стрептококков. Проникает в тромб, лизирует фибрин и приводит к распаду тромба. Применяют при тромбозе глубоких вен, острых эмболиях периферических артерий, острой

эмболии легких, свежем инфаркте миокарда, непроходимости центральной артерии сетчатки глаза. В/в капельно, начиная с 100 000-250 000 МЕ в 50 мл изотонического раствора натрия хлорида в течение 30 мин (30 капель в 1 мин), затем 750 000 МЕ в 500 мл раствора (100 000 МЕ в 1 ч) и переходят на поддерживающие дозы 100 000 МЕ на 3-4 ч. Лечение продолжают 16-18 ч под контролем содержания в крови фибриногена и тромбинового времени. Возможны головная боль, люмбаго, повышение температуры до субфебрильных цифр, кровотечения (гематомы, гематурия), аллергические реакции. Противопоказан при кровотечениях, после недавно перенесенного инфаркта, при выраженной гипертонии, остром панкреатите, эндокардите.

СТРЕПТОДЕКАЗА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (Streptidecasum pro injectionibus). Относится к группе "иммобилизованных" ферментов и является активатором фибринолитической системы человека. Обладает тромболитической активностью, превращает плазмоген крови в плазмин и инактивирует его ингибиторы, оказывает пролонгированное фибринолитическое действие. Применяют при остром периферическом артериальном тромбозе или тромбоэмболии, за исключением случаев, когда показано экстренное хирургическое

вмешательство; периферическом флеботромбозе; острой тромбоэмболии в системе легочной артерии или в случаях рецидивирующего тромбоза ее мелких ветвей; тромбозе центральной вены и артерии сетчатки глаза; остром инфаркте миокарда в 1-2-е сутки заболевания или рецидивирующем его течении; при ретротромбозе после тромбэктомии. В/в, только в стационаре по утвержденной схеме (см. инструкцию по ее применению). Возможны аллергические реакции (озноб, повышение температуры, головная боль, гиперемия, крапивница, боль в пояснице и т.д.), а при сочетании с гепарином - геморрагические осложнения (кровотечения, образование гематом, гематурия и т.д.). Противопоказан при геморрагическом диатезе, кровотечениях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в течение 4 сут после операции и родов, при острой стрептококковой инфекции, сепсисе, эндокардите, острых воспалительных заболеваниях органов брюшной полости (панкреатит, холецистит, аппендицит и др.), беременности до 18 нед, высокой артериальной гипертензии; активном туберкулезном процессе, злокачественных новообразованиях, аллергии на фибринолитические препараты в прошлом; сахарном диабете, бронхоэктатической болезни с выраженным деструктивным процессом; циррозе печени, почечно-

каменной болезни в стадии обострения, выраженном атеросклерозе.

СТРЕПТОМИЦИНА СУЛЬФАТ (Streptomycini sulfas). Синонимы: Diplostrep, Endoctrep, Strycin. Соль органического основания, продуцируемого Streptomyces globisporus streptomycini. Обладает широким спектром антибактериального действия. Активен в отношении большинства грамотрицательных кислотоустойчивых и некоторых грамположительных бактерий, включая пенициллиноустойчивые штаммы. Высоко активен в отношении микобактерий туберкулеза. При длительном применении бактерии приобретают устойчивость к препарату. Применяют при туберкулезе различной локализации, менингите, перитоните, плеврите, заболеваниях мочевыводящих путей, эндокардите, гонорее, коклюше, туляремии, бруцеллезе, чуме и других заболеваниях, вызванных чувствительными к стрептомицину микробами. В/м вводят по 0,5-1 г (500 000-1 000 000 ЕД)/сут в 2-5 мл дистиллированной воды, изотонического раствора хлорида натрия или 0,25-0,5% раствора новокаина. Дозы для детей уменьшают соответственно возрасту. При туберкулезе суточную дозу можно вводить однократно. Интратрахеально (интрабронхиально) по 0,25-0,5 г (250 000-500 000 ЕД) в 5-10 мл 0,5% раствора новокаина 2-3 раза и бо-

...зе в неделю. В виде аэрозолей применяют в тех же дозах в 3-5 мл (при тепловлажной ингаляции в 25-100 мл) изотонического раствора хлорида натрия или дистиллированной воды. В полости препарат вводят по 0,25-0,5 г (250 000-500 000 ЕД). Внутрь назначают из расчета 0,03 г (30 000 ЕД)/кг. Возможны токсические и аллергические реакции: повышение температуры тела, дерматиты, кожные высыпания, зуд, головокружение, головная боль, сердцебиение, альбуминурия, гематурия. При длительном введении больших доз антибиотика - поражение VIII пары черепных нервов и связанные с этим нарушения вестибулярного и слухового аппарата. Противопоказан при повышенной чувствительности к стрептомицину, органических поражениях VIII пары черепных нервов. Не применять совместно с флоримицином (виомицином), гентамицином, неомицином, мономицином, канамицином. С осторожностью применять при поражениях печени, почек, тяжелых формах гипертонической болезни и после недавно перенесенного инфаркта миокарда.

СТРЕПТОМИЦИНА ХЛОРКАЛЬЦИЕВЫЙ КОМПЛЕКС (Streptomycini et Calci chloridum). Двойная соль кальция хлорида и стрептомицина гидрохлорида. Фармакологическое действие, побочное действие и противопоказания те же, что и при применении стрептомицина суль-

фата. Применяют при менингите туберкулезной этиологии, а также менингите, вызванном другими чувствительными к стрептомицину микроорганизмами. В/м в тех же дозах, что и стрептомицин. Эндолюмбально назначают 1 раз в сутки детям до 3 лет 10-15 мг (10 000-15 000 ЕД), от 3 до 7 лет 15-25 мг (15 000-25 000 ЕД), от 7 до 14 лет 30-50 мг (30 000-50 000 ЕД), подросткам и взрослым 50-100 мг (50 000-100 000 ЕД). Растворы готовят ex tempore на стерильной воде для инъекций или изотоническом растворе хлорида натрия в объеме 1-2 мл.

СТРЕПТОСАЛЮЗИД (*Streptosaluzidum*). Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, микобактерий туберкулеза. Применяют при туберкулезе (различные формы и локализации). Наиболее показан больным, страдающим одновременно заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В/м по 0,5-2 г/сут; интратрахеально и ингаляции по 0,5 г (в 2-5 мл изотонического раствора натрия хлорида). Побочное действие и противопоказания те же, что для стрептомицина и изониазида.

СТРЕПТОЦИД (*Streptocidum*). Синонимы: *Ambesid, Deseptyl, Sulfanilamid.* Сульфаниламидный препарат, применяемый при рожистом воспалении, ангине,

циститe, пиелите, колите, раневой инфекции. Внутрь по 0,5-1 г 5-6 раз в день. Детям дозы уменьшают соответственно возрасту. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г; суточная 7 г. Местно вводят в рану 5-15 г стерильного порошка; наружно в виде 5% линимента или 10% мази. Возможны головная боль, головокружение, тошнота, рвота, цианоз, аллергические реакции, лейкопения, агранулоцитоз, парестезии, тахикардия. Противопоказан при заболеваниях кроветворной системы, почек, тиреотоксикозе, повышенной чувствительности к сульфаниламидам.

СТРЕПТОЦИД РАСТВОРИМЫЙ (Streptocidum solubile). Сульфаниламидный препарат, применяемый в тех же случаях, что и стрептоцид, особенно при рвоте или бессознательном состоянии больного. Под кожу в/м до 100 мл 1-1,5% раствора 2-3 раза в сутки; в/в до 20-30 мл 2-5-10% раствора. Побочное действие и противопоказания те же, что и для стрептоцида.

СТРИХНИНА НИТРАТ (Strychnini nitras). Алкалоид семян чилибухи (Strychnos nux-vomica). Стимулятор ЦНС. Применяют при гипотонии, быстрой утомляемости, парезах и параличах, функциональных расстройствах зрительного аппарата, атонии желудочно-ки-

шечного тракта и др. Внутрь по 0,5-1 мг 2-3 раза в день, подкожно по 1 мл 0,1% раствора. При передозировке возможны напряжение мышц (в тяжелых случаях судороги), затруднение дыхания. Противопоказан при гипертонической болезни, стенокардии, выраженном атеросклерозе, склонности к судорогам.

СТРОФАНТИН К (Strophantinum K). Смесь сердечных гликозидов, выделяемых из семян строфанта Комбе (Strophantus Kombe), содержит в основном К-строфантин и К-строфантозид. Оказывает систолическое действие, мало влияет на частоту сердечных сокращений и проводимость по предсердно-желудочковому пучку. Применяют при острой сердечно-сосудистой недостаточности, пароксизмальной тахикардии. В/в 0,5-1 мл 0,025% или 0,05% раствора в 10-20 мл 40% раствора глюкозы. Высшая разовая доза 1 мл 0,05% раствора, суточная 2 мл 0,05% раствора. При передозировке возможны экстрасистолия, бигеминия, диссоциация ритма, тошнота, рвота. Противопоказан при органических изменениях сердца и сосудов, остром миокардите, эндокардите, выраженном кардиосклерозе.

СУКСИЛЕП (Suxilep). Синонимы: Asamid, Pyknolepsin, Zarontin. Противосудорожное средство, применяемое при ма-

лых эпилепсиях, миоклонических припадках. Внутрь по 0,25 г 4-6 раз в день. Возможны диспептические явления; в отдельных случаях головная боль, головокружение, кожные высыпания, лейкопения и агранулоцитоз.

СУЛЬГИН (Sulginum). Синонимы: Guamid, Sulfaguanidum. Сульфаниламидный препарат. Применяют при бактериальной дизентерии, колите и энтероколите с поносом, носительстве шигелл и палочек брюшного тифа, подготовке к операции на кишечнике. Внутрь по 1-2 г 6-5-4-3 раза в сутки; для профилактики послеоперационных осложнений со стороны кишечника по 0,05 г/кг каждые 8 ч в течение 5 дней до операции и 7 дней после операции. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г. Возможны тошнота, рвота, кристаллурия. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам, нарушении функции почек.

СУЛЬФАДИМЕЗИН (Sulfadimezinum). Синоним: Sulfadimerazine. Сульфаниламидный препарат. Применяют при пневмонии, менингококковом менингите, гонорее, сепсисе, дизентерии, токсоплазмозе (в сочетании с хлоридином). Внутрь по 1 г 4-6 раз в сутки. При пневмонии и менингите на первый прием назначают 2 г; детям из расчета 0,1 г/кг на первый при-

ем, затем по 0,25 г/кг каждые 4, 6, 8 ч. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г. Возможны тошнота, рвота, аллергические реакции, лейкопения, агранулоцитоз, кристаллурия. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам, заболеваниям кровеворной системы, нарушении функции почек.

СУЛЬФАДИМЕТОКСИН (Sulfadimethoxinum). Синонимы: Depo-Sulfamid, Madribon. Сульфаниламидный препарат длительного действия, применяемый при пневмонии, острых респираторных заболеваниях, бронхите, гайморите, отите, воспалительных поражениях ЦНС, дизентерии, воспалительных заболеваниях мочевыводящих и желчевыводящих путей, рожистом воспалении, пиодермии, раневой инфекции, трахоме, лекарственно-устойчивых формах малярии (в сочетании с противомалярийными препаратами). Внутрь однократно. В 1-й день 2 г, затем по 1 г/сут. Детям дозу уменьшают соответственно возрасту. Возможны головная боль, диспептические явления, кожные высыпания, лекарственная лихорадка, лейкопения. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидным препаратам. Необходима осторожность при заболеваниях кроветворной системы и декомпенсация сердечной деятельности.

СУЛЬФАЗИН (Sulfazinum). Синонимы: Adaazin, Sulfadiazin, Sulfapyrimidin. Эффективен при инфекциях, вызванных гемолитическим стрептококком, пневмококков, гонококком, стафилококком, а также эшерихиями. Применяют при пневмонии, менингококковом менингите, [illegible] стафилококком и стрептококком, [illegible] сисе и других инфекциях. [illegible] ниях совместно с другими [illegible] мидными препаратами, [illegible] противомалярийными [illegible] нин, хлоридин и др.), при этом усиливается противомалярийный эффект. Внутрь. Взрослым на первый прием дают 2 г (при тяжелых инфекциях до 4 г), затем в течение 1-2 дней по 1 г каждые 4 ч, а в дальнейшем по 1 г каждые 6-8 ч. Лечение проводят до нормализации температуры и в последующие 3 сут. Детям дают из расчета 0,1 г/кг на первый прием, затем по 0,025 г/кг каждые 4-6 ч. При дизентерии назначают так же, как сульфадимезин. Редко вызывает тошноту и рвоту, а также осложнения со стороны кроветворной системы; иногда наблюдаются гематурия, олигурия, анурия. Во время приема препарата рекомендуется обильное щелочное питье.

СУЛЬФАЛЕН (Sulfalenum). Синонимы: Келфизин, Sulfametopyrazine. Сульфаниламид, пролонгированного действия, обладающий противомикробной ак-

ивностью в отношении многих бактерий. Применяют при инфекционных заболеваниях, вызванных чувствительными к сульфаниламидным препаратам микроорганизмами (бронхит, пневмония, холецистит, холангит, пиелит, цистит, цистит, гнойная инфекция различной локализации, остеомиелит, отит, синуит и т. д.), при дизентерии неэффективен, так как быстро всасывается из тонкого кишечника. При острых и быстропротекающих инфекциях назначают внутрь в 1-й день 1 г, затем по 0,2 г в день за 30 мин до еды. При хронических инфекциях и для длительной профилактики (ревматоидные заболевания, хронический бронхит и др.) применяют 1 раз в неделю по 2 г в течение 1-1 1/2 мес. Возможны тошнота, аллергические реакции, головная боль, лейкопения. Противопоказан при наличии в анамнезе токсико-аллергических реакций на сульфаниламид, азотемии, беременности.

СУЛЬФАЛЕН-МЕГЛЮМИН (Sulfalenum-megluminum). Сульфаниламид сверхдлительного действия. Обладает высокой антимикробной активностью подобно сульфалену. Назначают взрослым при разных формах гнойной инфекции в хирургической, гинекологической, урологический практике; при тяжелых септических состояниях, пневмониях, гнойных менингитах и в других случаях, ког-

да требуется быстро создать необходимую концентрацию сульфалена в крови и тканях, а также для профилактики осложнений бактериальной инфекции в послеоперационном периоде. Особенно показан в тех случаях, когда неэффективны другие химиотерапевтические препараты сульфаниламидного ряда или их применение невозможно из-за непереносимости. В/в (струйно или капельно) или в/м. При легких и среднетяжелых формах заболеваний назначают в 1-й день 5 мл раствора, в последующие дни по 2 мл 1 раз в сутки. Курс 7-10 дней. При тяжелых формах в 1-й день вводят 10 мл, в последующие дни по 2 мл 1 раз в сутки. Курс до 10 дней. При гнойных менингитах - по 10 мл 1 раз в сутки в течение всего курса. При необходимости продолжают лечение, принимая препарат внутрь в виде таблеток. Возможны диспептические явления, аллергические сыпи, лейкопения. Во избежание кумуляции и появления токсических реакций не следует превышать дозы и сроки применения препарата. Противопоказан при наличии в анамнезе токсико-аллергических реакций на сульфаниламиды (агранулоцитоз, гемолитическая анемия, лекарственная лихорадка, дерматиты, гепатит), гиперазотемии и беременности.

СУЛЬФАМОНОМЕТОКСИН (Sulfamonomethoxinum). Синонимы: Daimeton,

Duphadin. Сульфаниламид длительного действия. Применяют при инфекциях дыхательных путей, гнойных инфекциях уха, горла, носа, дизентерии, энтероколитах, инфекциях желчевыводящих и мочевыводящих путей, гнойничковых заболеваниях кожи, раневой инфекции, генерализованной менингококковой инфекции, гнойных менингитах, гонорее, для профилактики гнойной бактериальной инфекции в послеоперационном периоде. Внутрь, по 0,5-1 г 2 раза в 1-й день лечения, затем по 0,5-1 г 1 раз в сутки; детям по 25 мг/кг в 1-й день лечения, затем по 12,5 мг/кг. Курс 7-14 дней. При менингите в 1-й день 2 г 2 раза в сутки, затем по 2 г 1 раз в день. При гонорее первые 2 дня по 1,5 г 3 раза в день, затем по 1 г. Курс 5 дней. Побочное действие. В отдельных случаях возможны тошнота, головная боль, лейкопения, аллергические реакции. Противопоказан при токсико-аллергических реакциях на сульфаниламиды.

СУЛЬФАПИРИДАЗИН (Sulfapyridazunum). Синонимы: спофадазин, кинекс, Altezol, Deposulfal, Kynex, Lederkyn, Spofadazin. Сульфаниламид длительного действия. Применяют при острых респираторных заболеваниях, пневмонии, бронхите, менингите, воспалительных заболеваниях ЦНС, дизентерии, воспалительных заболеваниях моче-

выводящих путей. [illegible] ной инфекции, [illegible] [illegible] сочетании с [illegible] кратно, в 1-й день [illegible] тяжело протекающих [illegible] день 2 г (в 1-2 [illegible]) однократно. [illegible] ответствии с [illegible] Возможны [illegible] та, кожные [illegible] лихорадка, [illegible] Противопоказания [illegible] вителыности [illegible]

СУЛЬФАПИРИДАЗИН НАТРИЯ

(Sulfapyridazinum-natrium). [illegible] По действию близок к сульфапиридазину. Применяют при [illegible] конъюнктивите, кератите, [illegible] гнойных заболеваниях [illegible] плевры, гнойных ранах и [illegible] Местно (глазные капли, ингаляции, введение в полость, орошение ран и т.д.) в виде 3-5-10% растворов на дистиллированной воде, изотоническом растворе хлорида натрия или поливиниловом спирте. Для лечения трахомы используют 10-20% растворы на поливиниловом спирте. Для ингаляции при хронических процессах в легких и бронхах по 5 мл 10% раствора 2 раза в день в течение 7-10 дней. Побочное действие и противопоказания те же, что и для сульфапиридазина.

СУЛЬФАСАЛАЗИН (Sulfasalazin). Синонимы: Salazopyrin, Salazosulfapyridine. Обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами; оказывает избирательное действие на слизистую и подслизистую оболочку кишечника. Применяют при неспецифическом язвенном колите. Внутрь по 1 г 4-6 раз в сутки в течение 2-3 нед с последующим постепенным уменьшением дозы на 1-0,5 г каждые 5-7 дней (под контролем ректороманоскопии). При необходимости курс продолжают в течение 4-6 мес. Возможны диспептические явления, аллергические реакции, изменения в крови (лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия). Противопоказан при индивидуальной непереносимости, нарушении функции печени и почек.

"СУЛЬФАТОН" ("Sulfatonum"). Комбинированный препарат, содержащий два действующих вещества: сульфаниламид - сульфамонометоксин и производное диаминопиримидина - триметоприм в соотношении 2,5:1. Антимикробный препарат широкого спектра действия, активный в отношении гноеродных кокков и грамотрицательных бактерий, возбудителей гнойных процессов и кишечных инфекций; хламидий (возбудители трахомы, орнитоза, пситтакоза); некоторых простейших (плазмодии малярии, токсоплазмы, лейшмании) и

возбудителей глубоких микозов. Действует также на штаммы бактерий с приобретенной устойчивостью к сульфаниламидам. Применяют при острых бактериальных инфекциях в случаях, когда неэффективны антибиотики широкого спектра действия или их применение невозможно из-за непереносимости; инфекциях дыхательных путей, гнойной хирургической инфекции, инфекциях мочевыводящих и желчевыводящих путей, дизентерии; рожистом воспалении, гонорее, гнойно-резорбтивной лихорадке, сепсисе, менингите и др. В 1-й день назначают внутрь ударную дозу, в последующие дни - в 2 раза меньшую (поддерживающую) дозу. Минимальная разовая доза 1 табл. (0,35 г), суточная 2 табл. ; максимальная разовая доза 4 табл., суточная 8 табл. Суточную дозу назначают в 2 приема - утром и вечером с интервалом 12 ч. Курс 7-14 дней. При лечении острой гонореи назначают в течение только одного дня по 5 табл. 3 раза. Применение сульфатона в этой дозе более одного дня противопоказано. Возможны диспептические явления (тошнота, рвота), аллергические сыпи, головная боль, анемия, лейкопения, в редких случаях агранулоцитоз. Противопоказан при наличии в анамнезе токсико-аллергических реакций на сульфаниламиды, триметоприм, бисептол (бактрим, септрин); бере-

менности; заболеваниях кроветворной системы. У больных с тяжелыми нарушениями функции печени и почек используют минимальные дозы под контролем функционального состояния органа.

СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЙ (Sulfacylum-natrium). Синонимы: Albucid-natricum, Prontamide. Сульфаниламид, применяемый при гнойных язвах роговицы, конъюнктивитах, блефаритах, гонорейных заболеваниях глаз, инфицированных ранах, инфекциях, вызванных эшерихиями. Наружно в виде глазных капель (10-20-30% водные растворы), мазей (10-20-30%) и присыпок; внутрь взрослым 0,5-1 г 3-5 раз в день, детям по 0,1-0,5 г 3-5 раз в день. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г. Возможно раздражение тканей; при приеме внутрь - аллергические реакции, диспептические нарушения. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам.

"СУЛЬФОДЕКОРТЭМ" ("Sulfodecortemum"). Мазь, содержащая 10 г серы осажденной и 0,4 г гидрокортизона ацетата, приготовленная на эмульсионной основе состава: вазелин медицинский 45 г, ланолин 10 г, стеариновая кислота 3 г, пентол 5 г, нипагин 0,08 г, нипазол 0,02 г и воды до 100 г. Оказывает керато-

литическое (отшелущивающее), антипаразитарное, противовоспалительное, антиаллергическое действие. Назначают взрослым для лечения себореи, розацеа и розовых угрей; в регрессивной и стационарной стадиях псориаза волосистой части головы, для лечения чесотки, осложненной дерматитом. Мазь наносят тонким слоем, слегка втирая в пораженный участок кожи, 2 раза в день в течение 5-14 дней. Курс можно повторить через 5-7 дней. При псориазе волосистой части головы препарат применяют после снятия чешуек путем мытья головы с мылом, при розовых угрях - после обтирания кожи антисептическими растворами. Возможны эритема и зуд. В этих случаях препарат отменяют. Противопоказан при повышенной чувствительности к сере и гидрокортизону; беременности.

СУЛЬФОКАМФОКАИН (Sulfocamphocainum). Комплексное соединение сульфокамфорной кислоты и новокаина. Применяют в тех же случаях, что и медицинскую камфору, особенно при острых состояниях (кардиогенный и анафилактический шок, острая легочная недостаточность). Вводят подкожно и в/м, в острых случаях, в/в (струйно или капельно) по 2 мл 10% раствора 2-3 раза в день. Высшая суточная доза 12 мл 10% раствора. Возможна индивидуальная непереносимость.

"СУНОРЕФ" МАЗЬ ("Sunoreph"). Состав: стрептоцида 5 г, норсульфазола 5 г, сульфадимезина 5 г, эфедрина гидрохлорида 1 г, камфоры 3 г, эвкалиптового масла 5 капель, мазевой оссновы до 100 г. Применяют при острых и хронических ринитах (смазывают слизистые оболочки носа). Возможны аллергические реакции. Противопоказан при повышенной чувствительности при сульфаниламидам.

СУПРАСТИН (Suprastin). Синонимы: Allergan S, Chloropyramine, Sinopen. Антигистаминный препарат, применяемый при аллергических заболеваниях (дерматозы, ринит, конъюнктивит, отек Квинке, крапивница, начальные стадии бронхиальной астмы и др.). Внутрь во время еды по 0,025 г 2-3 раза в день; в тяжелых случаях заболевания - в/м и в/в 1-2 мл 2% раствора. Возможны сонливость, общая слабость. Противопоказания те же, что и при применении димедрола.

СУРГАМ (Surgam). В 1 табл. 300 мг тиопрофеновой кислоты. Противовоспалительное и обезболивающее средство, применяемое при ревматических заболеваниях (артрозы, ревматоидный артрит, периартрит), переломах и повреждениях мягких тканей, хирургических вмешательствах, поверхностном флебите и флебосклерозе. По 1 табл. 2 раза в день (утром и вечером) во время еды. Следует с

осторожностью назначать сургам беременным женщинам, а также больным, имеющим в анамнезе язву желудка или двенадцатиперстной кишки. Могут возникнуть нарушение пищеварения, понос и изжога. Противопоказан при язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

СУСТАК (Sustac). Лекарственная форма нитроглицерина пролонгированного действия, применяемая только для предупреждения приступов стенокардии. Внутрь по 2,6 мг (сустак-мите) 2 раза в день; при необходимости 6,4 мг (сустак-форте) на прием. Возможны головная боль, головокружение, чувство жара. Противопоказан при остром инфаркте миокарда, коронарном тромбозе, кровоизлиянии в мозг, глаукоме.

СУШЕНИЦЫ ТОПЯНОЙ ТРАВА (Herba Gnaphalii uliginosi). Содержит витамин K, смолы, эфирное масло (следы), каротин, дубильные вещества, фитостерины. Применяют в качестве противовоспалительного и гипотензивного средства при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертонической болезни (начальные стадии) в виде настоя (10,0:200,0) по 1 ст.л. 2-3 раза в день.

ТАВЕГИЛ (Tavegil). Антигистаминный препарат пролонгированного дейст-

вия (не дает седативного эффекта). Применяют при аллергических заболеваниях (вазомоторный ринит, крапивница, аллергические дерматозы и др.). Внутрь по 0,001 г 2 раза в день, при необходимости суточную дозу увеличивают до 0,004 г. Детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 0,0005-0,001 г 2 раза в день. Противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности, водителям транспорта.

ТАКТИВИН (Tactivinum). Препарат полипептидной природы, получаемый из вилочковой железы (тимуса) крупного рогатого скота. Иммуномодулирующее средство. При иммунодефицитных состояниях препарат нормализует количественные и функциональные показатели Т-системы иммунитета, стимулирует продукцию лимфокинов. в том числе α и γ -интерферона, восстанавливает активнорсть Т-киллеров, функциональную активность стволовых гемопоэтических клеток и нормализует ряд других показателей, характеризующих напряженность Т-клеточного иммунитета. Применяют у взрослых при иммунодефицитных состояниях с преимущественным поражением Т-системы иммунитета, возникающих при инфекционных, гнойных и септических процессах, лимфопролиферативных заболеваниях (лимфогранулематоз, лимфолейкоз), рассеянном склерозе, тубер-

кулезе, рецидивирующем офтальмогерпесе, псориазе и др. Обычно 1 мл препарата (что составлет 40 мкг/м2 или 1-2 мкг/кг) вводят подкожно перед сном 1 раз в сутки ежедневно в течение 5-14 дней. При необходимости курс повторяют. При стойких нарушениях иммунитета тактивин назначают с заместительной целью в течение 5-6 дней с последующим введением препарата 1 раз в 7-10 дней. При рассеянном склерозе препарат применяют ежедневно в течение 5 дней, затем 1 раз в 5-14 дней. Курс от 1 до 3 лет. В тяжелых случаях рассеянного склероза тактивин назначают в комплексной терапии с кортикостероидами. Для лечения хирургических больных тактивин вводят перед операцией в течение 2 дней и после нее в течение 3 дней. При злокачественных новообразованиях и аутоиммунных заболеваниях тактивин назначают 5-6-дневными курсами в перерывах специфической терапии. Для лечения больных рецидивирующим офтальмогерпесом вводят 0,1 мл препарата (что составляет 10 мкг/м2 или 0,1-0,2 мкг/кг) в сутки с интервалом в 1 день в течение 14 сут. Курс повторяют через 4-6 мес. Противопоказан при атопической форме бронхиальной астмы, беременности.

ТАНИН (Tanninum). Галлодубильная кислота. Вяжущее, противовоспали-

тельное средство, применяемое при стоматитах, гингивитах, фарингитах, воспалительных заболеваниях полости рта, зева 1-2% водный раствор для полосканий 3-5 раз в день; наружно при ожогах, язвах, трещинах, пролежнях (3-10% растворы и мази); при отравлении алкалоидами, солями тяжелых металлов 0,5% водный раствор для промывания желудка.

"ТАНСАЛ" ("Tansalum"). Состав: танальбина 0,3 г, фенилсалицилата 0,3 г. Вяжущее и дезинфицирующее средство. Применяют при острых и подострых энтеритах и колитах по 1 табл. 3-4 раза в день.

ТАРИВИД (Tarivid). Синоним: Ofloxacin. Антибиотик широкого спектра действия из группы производных оксихинолинкарбоновой кислоты, благодаря иному механизму действия на возбудителя, чем у других антибиотиков группы аминогликозидов, тетрациклинов и бета-лактамов, а также сульфонамидов и триметоприма, таривид угнетает возбудителей, устойчивых к этим препаратам. Применяют при инфекциях дыхательных путей, уха, горла, носа, мягких тканей и кожи; инфекциях брюшной полости (включая малый таз), заболеваниях почек и мочевыводящих путей, гонорее. Обычно по 1 табл. 2 раза в день (в отдель-

... применяемое при ст...
...ингах, фарингитах, вос...
...спаниях полости рта, ...
...ый раствор для полоскан...
...; наружно при ожогах, ...
...нах, пролежнях (3-10...
...мази); при отравлени...
...солями тяжелых метал...
... раствор для промыван...

..." ("Tansalum"). Состав: та...
..., фенилсалицилата 0,3 г
...инфицирующее средство
...ри острых и подострых
...литах по 1 табл. 3-4 раза

...Д (Tarivid). Синоним...
...иотик широкого спектра
...ы производных оксихи...
...кислоты, благодаря
...действия на возбудите...
...антибиотиков группы
...тетрациклинов и бета-
...сульфонамидов и три...
...д угнетает возбудите...
...к этим препаратам...
...екциях дыхательных
...оса, мягких тканей и
...брюшной полости
...), заболеваниях по...
...их путей, гонорее
...аза в день (в отдель-

...ных случаях по 2 табл. 2 раза в день), не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Курс 7-10 дней. При инфекциях, вызванных β -гемолитическим стрептококком, курс не менее 10 дней. Не рекомендуется принимать таривид более 4 нед. При снижении почечной функции дозу таривида рассчитывают, исходя из тяжести заболевания почек. При клиренсе креатинина меенее 30-10 мл/мин, что соответствует уровню креатинина в сыворотке крови 221-442 мкмоль/л (2,5-5 мг/дл), следует назначать обычную суточную дозу. При значении креатининового клиренса менее 10 мл/мин, что соответствует уровню креатинина в сыворотке 442 мкмоль/л (5 мг/дл) и более, лечение следует начинать с обычной дозы, а затем каждые 24 ч принимать дозу в 2 раза меньшую, чем начальная. Редко наблюдаются аллергические реакции в виде кожной сыпи, отека лица, голосовых связок, при непереносимости возможен шок; в отдельных случаях - боль в животе, тошнота, рвота, понос, головная боль, головокружение, нарушение сна, повышение уровня билирубина в сыворотке крови. Не рекомендуется применять таривид одновременно со средствами, снижающими кислотность желудочного сока (антациды), так как эффективность его при этом снижается. Противопоказан при повышенной чувст-

вительности к производным хинолинкарбоновой кислоты; эпилепсии; детям и подросткам с незавершенным ростом скелета; беременным и кормящим женщинам.

ТАУФОН (Taufonum). Синоним: таурин. Стимулируеет репаративные и регенерационные процессы при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся резким нарушением метаболизма глазных тканей. Назначают взрослым в качестве стимулятора репаративных и регенераторных процессов при дистрофическаих поражениях сетчатой оболочки глаза, в том читсле наследственных тапеторетинальных абиотрофий, при дистрофиях роговицы, старческих, диабетических, травматических и лучевых катарактах, а также как средство стимуляции восстановительных процессов при травмах роговицы. При катарактах тауфон применяют в виде инстилляций по 2-3 капли 2-4 раза в день ежедневно в течение 3 мес. Курсы повторяют с месячным интервалом. При травмах применяют в тех же дозах в течение месяца. Для лечения тапеторетинальных абиотрофий и других дистрофических заболеваний сетчатки, а также при проникающих ранениях роговицы тауфон вводят под конъюнктиву по 0,3 мл 4% раствора 1 раз в день

в течение 10 дней. Курс через 6-8 мес повторяют.

ТАХИСТИН (Tachistin). Синоним: АТ-10. Влияет на обмен кальция и способствует повышению его содержания в организме. Применяют при гипокальциемических судорогах (паратиреогенные, энтерогенные, нефрогенные и др.), гипокальциемических судорогах (идиопатические, инфекционные, в результате органических поражений мозга). Внутрь по 20 капель масляного раствора (в 1 мл 1 мг) в течение 2-3 недель после еды; при необходимости дозу увеличивают до 100 капель в день; на 7-10-й день переходят на поддерживающую терапию. Противопоказан при повышенном содержании кальция в крови.

ТЕБРОФЕНОВАЯ МАЗЬ (Unguentum Tebrofeni). Противовирусное средство, применяемое при вирусных заболеваниях глаз и кожи, а также плоских вульгарных бородавках. При аденовирусном кератоконъюнктивите закладывают за края век 0,5% мазь 3-4 раза в день. При поражении кожи простым, пузырьковым герпесом, опоясывающим лишаем смазывают пораженные участки 2-3% мазью 3-4 раза в день в течение недели. При чешуйчатом и красном плоском лишае смазывают пораженные участки 2% мазью 2 раза в день в течение 3-4 нед. Для удаления

плоских вульгарных бородавок и контагиозных моллюсков втирают вначале 3-5% салициловую мазь,, а затем 3% теброфеновую мазь. Применяют в течение 2 нед и более. Возможно жжение на участке нанесения мази.

ТЕГРЕТОЛ (Tegretol). Синонимы: стазепин, финлепсин. Фармакологическое действие. Противоэпилептическое средство, вызывающее противосудорожный и одновременно психотропный эффект. Применяют при эпилепсиях со сложной и простой симптоматикой, смешанных и генерализованных формах припадков с тонико-клоническим компонентом; невралгии тройничного нерва при рассеянном склерозе; эссенциальной глоссофарингеальной невралгии; синдроме абстиненции; несахарном диабете, диабетической невропатии. При эпилепсии лечение следует начинать с малых доз препарата, индивидуально повышая их до достижения желаемого терапевтического эффекта. Средняя доза для взрослых в начале лечения - по 200 мг 1-2 раза в день, в дальнейшем она медленно повышается до оптимальной эффективной дозы - по 400 мг 2-3 раза в день. Средняя доза для детей 10-20 мг на кг массы тела, то есть в возрасте до 1 года - по 100-200 мг в день, от 1 до 5 лет - 200-400 мг, от 6 до 10 лет - 400-600 мг, от 11 до 15 лет - 600-1000 мг в день (в несколько при-

емов). При невралгии тройничного нерва начальную дозу 200-400 мг в день постепенно повышают вплоть до прекращения болей (в среднем до 200 мг 3-4 раза в день), а затем постепенно уменьшают до минимальной эффективной дозы. При синдроме абстиненции средняя доза - по 200 мг 3 раза в день. В тяжелых случаях ее можно повысить (например, по 400 мг 3 раза в день). В начале лечения при тяжелых явлениях абстиненции тегретол рекомендуется назначать в сочетании с седативно-гипнотическими препаратами. При несахарном диабете средняя доза для взрослых - по 200 мг 2-4 раза в день, для детей соответственно ниже в зависимости от возраста и массы тела; при диабетической невропатии средняя доза - по 200 мг 2-4 раза в день. Подбирая дозы тегретола, надо проявлять особую осторожность в отношении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями функции печени и почек (контроль должен осуществляться периодически), а также больных старческого возраста. Не рекомендуется принимать препарат в первые 3 мес беременности и в период лактации. При назначении или отмене тегретола необходимо изменять дозы пероральных антикоагулянтов в зависимости от клинических требований. В течение лечебного курса может снизиться надежность действия гормональных контр-

ацептивов; ухудшается реактивная способность при вождении автотранспортных средств в условиях уличного движения; предпочтительно воздерживаться от употребления алкоголя. В начале лечения могут наблюдаться потеря аппетита , сухость во рту, тошнота, диарея, запор, головная боль, головокружение, сонливость, атаксия, нарушения аккомодации, диплопия, у больных старческого возраста - спутанность сознания и возбуждение. Эти побочные явления, как правило, исчезают через 8-14 дней. Противопоказан при повышенной чувствительности к тегретолу, атриовентрикулярной блокаде сердца.

ТЕЗАНА ЛИНИМЕНТ (Linimentum Thesani). Состав: тезана 0,2 г, масла касторового 10 г, эмульгатора 10 г, воды дистиллированной 79,8 г. Стимулирует процессы регенерации тканей. Применяют для предупреждения повреждений кожи при лучевой терапии, при эритеме, сухом и влажном эпидермите после рентгенорадиотерапии; длительно не заживающих трофических язвах, пролежнях, термических и химических ожогах. После каждого сеанса облучения линимент наносят на облучаемую поверхность кожи; при кожных реакциях после лучевой терапии препарат наносят тонким слоем на поврежденную поверхность и накрывают марлевой салфеткой.Процедуры повторя-

…; ухудшается реактивная с…
… при вождении автотранспо…
…ств в условиях уличного движе…
…едпочтительно воздерживаться о…
…ления алкоголя. В начале лече…
…блюдаться потеря аппетита, с…
… рту, тошнота, диарея, запор, г…
…боль, головокружение, сон…
…аксия, нарушения аккомода…
…. У больных старческого возр…
…танность сознания и возбужд…
…побочные явления, как прави…
…ют через 8-14 дней. Противо…
…и повышенной чувствительност…
…, атриовентрикулярной блока…

…А ЛИНИМЕНТ (Linimentu…
…став: тезана 0,2 г, масла кас…
…, эмульгатора 10 г, воды дис…
…ой 79,8 г. Стимулирует про…
…рации тканей. Применяют…
…ждения повреждений кожи…
…рапии, при эритеме, сухом…
…идермите после рентгено…
… длительно не заживаю…
…их язвах, пролежнях, тер…
…мических ожогах. После…
… облучения линимент на…
…емую поверхность кожи…
…кциях после лучевой те…
…аносят тонким слоем на…
…верхность и накрывают…
…ой. Процедуры повторя-

ют 2-3 раза в день, не снимая марлевой салфетки. Лечение продолжают в течение 7-10 дней.

ТЕЙМУРОВА ПАСТА (Pasta Teimurovi). Состав: кислоты борной 7 г натрия тетрабората 7 г, кислоты салициловой 1,4 г, цинка окиси 30 г, талька 28 г, гексаметилентетрамина 3,5 г, формалина 3,5 г, свинца ацетата 0,3 г, глицерина 12 г, масла мятного 0,3 г, воды дистиллированной 7 г. Применяют в качестве дезинфицирующего, подсушивающего и дезодорирующего средства при потливости, опрелости и некоторых грибковых заболеваниях кожи.

ТЕМЕХИН (Temechinum). Активное ганглиоблокирующее средство; оказывает также гипотензивное действие. Применяют при гипертонической болезни и кризах, спазме периферических сосудов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Внутрь (после еды) по 0,001 г 2-4 раза в день. Побочное действие и противопоказания те же, что и для других ганглиоблокирующих средств.

ТЕМПАЛГИН (Tempalgin). Обладает мягким транквилизирующим свойством. Болеутоляющее средство. Успокоение боли выражено сильнее, чем при использовании анальгина, и более продолжительно. Применяют при невритах, головной боли, зубной боли, люмбаго, ре-

вматизме, желчной и почечной колике. Внутрь - для взрослых по 1 табл. 1-4 раза в день. Противопоказан при заболеваниях печени и декомпенсированном пороке сердца.

ТЕОБРОМИН (Theobrominum). Оказывает гипотензивное действие, расширяет коронарные сосуды и бронхи, увеличивает диурез. Применяют при спазме сосудов мозга и сердца, отеках сердечной этиологии. Внутрь по 0,25-0,5 г 1-2 раза в день.

"ТЕОДИБАВЕРИН" ("Theodibaverinum"). Состав: теобромина 0,15 г, дибазола 0,02 г, папаверина гидрохлорида 0,02 г. Применяют как сосудорасширяющее и спазмолитическое средство при гипертонической болезни и стенокардии по 1 табл. 2-3 раза в день.

ТЕОПЭК (Teopek). Форма теофиллина пролонгированного действия, применяемая при бронхиальной астме, хроническом обструктивном бронхите и других заболеваниях органов дыхания с проявлением бронхоспазма. Внутрь после еды, запивая водой. Таблетку можно делить, но нельзя измельчать (разжевывать) и растворять в воде. В первые 1-2 дня препарат назначают по 0,15 г (1/2 табл. по 0,3 г) 1-2 раза в день с интервалом 12-24 часа; в последующем разовую дозу увеличивают до 0,3 г 2 раза в сутки.

Индивидуальные дозы и продолжительность лечения устанавливается врачом. Возможны головная боль, головокружение, тахикардия, состояние беспокойства, нарушение сна, боли в области живота. В этих случаях следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Развитие побочных явлений более вероятно при коронарной недостаточности, наклонности к тахикардии, эпилепсии, хроническом гастрите и колите. Противопоказан при индивидуальной непереносимости теофиллина, гиперфункции щитовидной железы, экстрасистолии, остром инфаркте миокарда, беременности.

ТЕОТАРД 200, ТЕОТАРД 350, ТЕОТАРД 500 (Teotard). Чистый безводный теофиллин (производное ксантина) в виде гранул; обладает сильным бронхоспазмолитическим действием, что позволяет купировать бронхиальную обструкцию, оказывая расширяющее воздействие на дыхательные пути. Применяют при хронической бронхиальной астме, хроническом бронхите, бронхоспазме и эмфиземе легких у взрослых и детей. Употребляется для длительного лечения или профилактики приступов бронхиальной астмы. Дозы препарата подбирают индивидуально, но при этом недопустимо превышать суточную дозу более чем 15 мг/кг (20 мг/кг - для детей). Первые 3 дня следует

принимать (не разжевывая) по 1 ретард-капсуле каждые 12 ч; На третий день - произвести оценку эффективности терапии и переносимости препарата. Теотард 200 назначается детям с массой тела выше 20 кг, а также взрослым с низкой массой тела; теотард 350 - взрослым и детям с массой тела более 40 кг; теотард 500 - больным, для лечения которых необходимы высокие дозировки препарата. Противопоказано назначать больному другие препараты ксантинового ряда. Одновременный прием теотарда усиливает действие фуросемида и резерпина, уменьшает действие карбоната лития и пропранолола. Активность теофиллина повышается в случае предварительной вакцинации против гриппа и в случае одновременного приема циметидина. алопуринола, эритромицина и ликомицина; снижена эта активность у курильщиков. Передозировка препарата может вызвать у больных боли в области желудка, нарушение частоты сердечных сокращений (усилить аритмию сердца), бессонницу, тремор и повышенную раздражимость. Противопоказан при повышенной чувствительности к теофиллину, беременности, кормлении ребенка грудью, эпилепсии, инфаркте. Осторожность и уменьшение дозировки необходимы при нарушениях функции печени и почек, при сердечной декомпенсации.

"ТЕОФЕДРИН" ("Theophedrinum"). Состав: теофиллина 0,05 г, теобромина 0,05 г, кофеина 0,05 г, амидопирина 0,2 г, фенацетина 0,2 г, эфедрина гидрохлорида 0,02 г, фенобарбитала 0,02 г, экстракта красавки 0,004 г, цитизина 0,0001 г. Применяют как лечебное и профилактическое средство при бронхиальной астме по 1/2 - 1 таблетке 1 раз в день.

ТЕОФИЛЛИН (Theophyllinum). Синоним: Theocin. Применяют как сосудорасширяющее, бронхолитическое и диуретическое средство, при хронической коронарной недостаточности, спазме бронхов, застойных явлениях сердечного и почечного происхождения. Внутрь по 0,1-0,2 г 2-4 раза в день. Эффективен при применении в суппозиториях. Возможны изжога, тошнота, рвота, понос; при передозировке эпилептиформные припадки.

"ТЕПАФИЛЛИН" ("Thepaphyllinum"). Состав: платифиллина гидротартрата 0,003 г, папаверина гидрохлорида 0,03 г, фенобарбитала 0,03 г, теобромина 0,25 г. Холинолитическое спазмолитическое и сосудорасширяющее средство, применяемое при спазмах желудочно-кишечного тракта, сосудов; бронхиальной астме по 1 табл. 2-3 раза в день.

ТЕРМОПСИСА ТРАВА (Herba Thermopsidis) (трава мышатника). Содер-

...жит алкалоиды (1-2,5%), из которых главный термопсин, гликозид, термопсиланцин, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту. Применяют как отхаркивающее средство при хронических бронхитах. Настой (0,6-1,0:180,0-200,0) 2-4 раза в день по 1 ст.л., сухой экстракт по 0,01-0,05 г, таблетки от кашля (по 1 табл. на прием). Детям дозы уменьшают соответственно возрасту.

ТЕРПИНГИДРАТ (Terpinum hydratum). Применяют в качестве отхаркивающего средства при хроническом бронхите по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день. Большие дозы могут вызвать рвоту. Противопоказан при гастритах, язвенной болезни желудка.

ТЕРРИЛИТИН (Terrilytinum). Оказывает протеолитическое действие. Применяют при гнойных ранах, ожогах, трофических язвах, пролежнях, воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. При гнойных ранах, ожогах, пролежнях наружно в виде раствора, содержащего в 1 мл 40-50 ПЕ (протеолиттических единиц) террилитина. Содержимое флакона (200 ПЕ) растворяют в 4-5 мл воды для инъекций, изотонического раствора хлорида натрия или 0,25% раствора новокаина, смачивают салфетку и наносят рану. При глубоких поражениях с большим количест-

вом некротических тканей препарат применяют в виде присыпки; затем накладывают повязку, смоченную раствором натрия хлорида или 0,25% раствора новокаина, и сверху - влагонепроницаемую повязку. Аппликацию повторяют каждые 1-2 дня и удаляют некротизированные ткани. Для ингаляций содержимое флакона растворяют в 5-8 мл воды или изотонического раствора натрия хлорида и применяют в виде аэрозоля по 2 мл на ингаляцию (не более 5 мл). Ингаляции проводят 1-2 раза в сутки. Курс 3-5 дней. Возможны аллергические реакции, поэтому перед применением препарата вводят антигистаминные средства. При ингаляции возможна осиплость голоса, исчезающая самостоятельно. Может отмечаться быстропроходящая субфебрильная температура. Противопоказан при сердечной недостаточности, эмфиземе легких с дыхательной недостаточностью, декомпенсированных формах туберкулеза легких, дистрофии и циррозе печени, вирусном гепатите, панкреатите, поражениях почек, геморрагических диатезах. Не следует вводить препарат в очаги воспаления и в кровоточащие полости, а также наносить на изъязвленные поверхности злокачественных опухолей.

"ТЕСТОБРОМЛЕЦИТ" ("Testobromlecitum"). Состав: метилтестостерона 0,005 г, бромизовала 0,1 г, лецитина 0,05

г. Оказывает андрогенное и незначительное анаболическое действие, а также успокаивающее влияние на ЦНС и улучшает обменные процессы. Применяют при вегетативных нервных расстройствах у мужчин, связанных с недостаточностью функции половых желез; климак[illegible], неврастении, переутомлении, [illegible] формах стенокардии и т.д. [illegible] по 1-2 табл. 3 раза в день; [illegible] по 1 табл. 2-3 раза в день. Курс 1-2 мес; при необходимости через 3-4 мес лечение повторяют.

ТЕСТОСТЕРОНА ПРОПИОНАТ (Testosteroni propionas). Синонимы: Androfort, Testolutin. Обладает значительной андрогенной и анаболической активностью. Назначают мужчинам при половом недоразвитии, функциональных нарушениях в половой системе, климактерий и связанным с ним сосудистыми и нервными расстройствами, акромегалии, гипертрофии предстательной железы; женщинам при климактерических сосудистых и нервных расстройствах (когда противопоказаны эстрогенные препараты); раке молочной железы и яичников (в возрасте до 60 лет); дисфункциональных маточных кровотечениях (у женщин пожилого возраста). В/м или подкожно по 1 мл 1% или 5% раствора в масле ежедневно, через 1-2 дня от 2 нед до нескольких месяцев. Высшая разовая доза

0,05 г, суточная 0,1 г. Большие дозы могут вызвать повышение полового влечения, задержку воды и солей в организме; у женщин могут наблюдаться явления маскулинизации (вирилизма), огрубение голоса, появление избыточного роста волос на лице и теле, пастозность лица, атрофия молочных желез. Передозировка препарата при дисменореях может привести к прекращению менструации. Противопоказания те же, что и при применении метилтестостерона.

ТЕСТЭНАТ (Testoenatum). Комбинированный препарат, андрогенный препарат, оказывающий быстрое и продолжительное действие. Назначают мужчинам в случаях, когда показано применение андрогенных и анаболических стероидных препаратов; женщинам при климактерических расстройствах (в случаях, когда противопоказаны эстрогенные препараты), раке молочной железы и половых органов. В/м 1-2 мл 1 раз в 7-15 дней (в зависимости от показаний).

ТЕТРАЦИН-КАЛЬЦИЙ (Tetacinum-calcium). Синонимы: Chelaton, Mosatil. Комплексообразующее соединение. Применяют при отравлениях тяжелыми металлами и редкоземельными элементами (свинец, кадмий, кобальт, ртуть, уран, иттрий, цезий и др.) и их солями. В/в

(капельно) в изотоническом растворе натрия хлорида или в 5% растворе глюкозы по 20 мл 10% раствора 1-2 раза в день в течение 3-4 дней с последвующим перерывом 3-4 дня. Курс 1 мес. Возможны нарушение функции желудочно-кишечного тракта и почек; уменьшение содержания в организме гемоглобина, железа и витамина B12. Противопоказан при нефритах и нефрозах, заболеваниях печени с нарушением функции.

ТЕТРАВИТ (Tetravitum). Состав: тиамина бромида 0,0039 г, рибофлавина 0,003 г, кислоты аскорбиновой 0,15 г, кислоты никотиновой 0,02 г. По 1 табл. 2-3 раза в день с профилактической целью для работников горячих-цехов.

"ТЕТРАФОЛЕВИТ" (Tabulettae "Tetrafolevitum" obductae). Комбинированный поливитаминный препарат следующего состава: тиамина хлорида (витамин B1) 0,002 г (или тиамина бромида 0,00258 г), рибофлавина (витамин B2) 0,002 г, кислоты фолиевой 0,0001 г и никотинамида 0,015 г. Регулирует отдельные стадии углеводного, белкового и липидного обменов; предупреждает появление анемии. Применяют для профилактики гиповитаминоза у здоровых людей при различных перегрузках, больным назначают в процессе лучевой терапии и после нее, при лечении препаратами

мышьяка и солей тяжелых металлов, сульфаниламидами и антибиотиками, в период ремиссии при анемии и нарушении лейкопоэза различной этиологии (при интоксикациях, лучевых поражениях, циррозе печени), а также в комплексной терапии при истинной и себорейной экземе, псориазе и вульгарных угрях. Внутрь после еды по 1-2 табл. 2-3 раза в день. Детям старше 1 года по 1 табл. 1-2 раза в день. Курс (20-30 дней) можно повторить через 1-3 мес в зависимости от тяжести заболевания.

ТЕТРАЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД (Tetracyclini hydrochloridum). Синонимы: Ambramycin, Polfamycine. Обладает широким спектром антимикробного действия. Высокоактивен в отношении грамположительных и грамотрицательных микробов, риккетсий, возбудителей орнитоза, трахомы и простейших. Применяют при заболеваниях, вызываемых чувствительными к препарату возбудителями (ангина, бронхит, гнойный плеврит, перитонит, остеомиелит, бактериальная и амебная дизентерия, скарлатина, менингит); инфекциях мочевыводящих путей. Внутрь в таблетках во время или сразу после еды. Доза для взрослых 0,2-0,25 г 3-4 раза в день. Назначать препарат в дозе менее 0,8 г/сут не следует, так как, помимо недостаточного терапевтического эффекта, возможно развитие устойчивых форм микроор-

ганизмов. Курс 5-7 дней. После исчезновения симптомов заболевания продолжают давать препарат в течение 1-3 дней. Местно в дерматологии, оториноларингологии применяют мазь, которую наносят на очаги поражения 1-2 раза в сутки или используют в виде повязки, сменяемой через 12-24 ч. Продолжительность лечения от нескольких дней до 2-3 нед. Возможны тошнота, рвота, понижение аппетита, расстройства функции кишечника, при длительном применении кандидоз (поражение кожи и слизистых оболочек полости рта и желудочно-кишечного тракта). Противопоказан при заболеваниях печени и почек, беременности, повышенной индивидуальной чувствительности к препаратам тетрациклина.

ТЕТУРАМ (Teturamum). Специфически влияет на обмен алкоголя в организме, увеличивая концентрацию ацетальдегида в крови, что вызывает комплекс отрицательных вегетативных реакций в организме при употреблении алкоголя. Применяют для лечения алкоголизма. Внутрь по 0,5 г ежедневно с постепенным уменьшением дозы до 0,15-0,1 г/сут. Возможны головная боль, слабость, сонливость, аллергические реакции, тошнота, рвота; тяжелые реакции (коллаптоидные состояния, выраженная коронарная недостаточность, эпилептиформные припадки, острые психозы, ре-

флекторная анурия, желтуха). Противопоказан при эндокринных, тяжелых соматических и психических заболеваниях, туберкулезе, полиневритах, невритах слухового и глазного нервов, глаукоме, идиосинкразии к препарату.

ТИАМИНА БРОМИД (Thiamini bromidum). Синонимы: витамин B1, аневрин. Положительно влияет на проведение нервного возбуждения в синапсах. Обладает умеренными ганглиоблокирующими свойствами. Применяют при гиповитаминозе и авитаминозе B1; различных формах невритов; радикулитах, невралгиях, периферических парезах и параличах различного происхождения; болезни Меньера; психозе Корсакова; полиомиелите и энцефаломиелите; болезни Вернике; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; атонии кишечника; дистрофии миокарда; нарушениях коронарного кровообращения у больных стенокардией; тиреотоксикозе; эндартериите; неврогенных дерматозах; опоясывающем лишае; псориазе, экземах; отравлениях (сероуглеродом, тетраэтилсвинцом, ртутью, метиловым спиртом, мышьяком и др.). Внутрь с профилактической целью взрослым по 0,00258-0,00645 г в день, детям - по 0,00129-0,00258 г в день. С лечебной целью взрослым 0,00645-0,0129 г 1-3 раза в день. В/м взрослым по 0,5-1 мл 3% или 6%

раствора 1 раз в день. Курс 15-30 инъекций. В отдельных случаях (особенно при парентеральном введении) возможны аллергические реакции и анафилактический шок. Противопоказан при аллергических заболеваниях в анамнезе.

ТИАМИНА ХЛОРИД (Thiamini chloridum). Применяют в тех же случаях, что и тиамина бромид.

ТИЗАМИД (Tisamid). Синонимы: [illegible], Diazinamid, Pyrazinamid. Активный туберкулостатический препарат, применяемый при туберкулезе. Назначают из расчета 20-30 мг/кг в 1-3 приема после еды. Возможные варианты назначения препарата взрослым: 1,5-2 г 1 раз в день, по 1 г 2 раза или по 0,5 г 3 раза в день. Обычно лечение проводится в сочетании с другими противотуберкулезными препаратами. Возможны аллергические реакции (дерматиты, эозинофилия, лихорадочные реакции и др.), диспептические явления, ухудшение аппетита, головная боль, при длительном применении - токсическое действие на печень. Под влиянием задержки в организме мочевой кислоты отмечается боль в суставах подагрического характера. Противопоказан при нарушении функции печени, подагре.

ТИЗЕРЦИН (Tisercin). Синонимы: Methotrimeprazine, Nozinan. Активное

нейролептическое средство с разносторонней фармакологической активностью; оказывает быстрое седативное действие. Применяют при психомоторном возбуждении, психозах, маниакальных и депрессивно-параноидных состояниях при шизофрении; реактивных депрессиях и невротических реакциях с чувством страха, тревоги и двигательным беспокойством, бессоннице. Внутрь по 0,025-0,4 г/сут; в/м 2-4 мл 2,5% раствора; при необходимости дозу увеличивают до 0,5-0,75 г. Возможны экстрапирамидные нарушения, сосудистая гипотония, головокружение, сухость во рту, склонность к запорам, аллергические реакции. Противопоказан при заболеваниях печени и кроветворной системы; относительные противопоказания - стойкая гипотония у лиц пожилого возраста и декомпенсация сердечно-сосудистой системы.

ТИМАЛИН (Thymalinum). Препарат полипептидной природы, получаемый путем экстракции из вилочковой железы (тимуса) крупного рогатого скота. Синоним: тимарин. Восстанавливает иммунологическую реактивность, стимулирует процессы регенерации и кроветворения в случае их угнетения, улучшает процессы клеточного метаболизма. Применяют у взрослых и детей в качестве иммуномодулятора и биостимулятора при состояниях

и заболеваниях, сопровождающихся понижением иммунитета, в том числе при острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваниях костей и мягких тканей, острых и хронических вирусных и бактериальных инфекциях, нарушении регенераторных процессов (переломы костей, ожоговая болезнь и отморожения, трофические язвы, лучевые некрозы тканей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), бронхиальной астме, рассеянном склерозе, облитерирующем атеросклерозе, ревматоидном артрите; состояниях, связанных с гипофункцией вилочковой железы, с угнетением иммунитета и кроветворения после проведения лучевой терапии или химиотерапии у онкологических больных и при других состояниях. Используют также с целью профилактики инфекционных и других осложнений, в посттравматическом и послеоперационном периодах, в процессе проведения лучевой или химиотерапии, при назначении больших доз антибиотиков. Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1-2 мл изотонического раствора хлорида натрия. Препарат вводят в/м ежедневно в следующих дозах: взрослым по 5-20 мг (30-100 мг на курс лечения), детям до 1 года 1 мг; 1-3 лет 1-2 мг; 4-6 лет 2-3 мг; 7-14 лет 3-5 мг в течение 3-10 дней в зависимости от выраженности нарушений иммунитета.

..., сопровождающихся по-
...иммунитета, в том числе при
...онических гнойно-воспали-
...еваниях костей и мягких
...ых и хронических вирусных
...ых инфекциях, нарушениях
...их процессов (переломы ко-
...я болезнь и отморожения,
...язвы, лучевые некрозы тка-
...болезнь желудка и двенад-
...цатиперстной кишки), бронхиальной ас-
... склерозе, облитерирую-
...озе, ревматоидном артри-
...иях, связанных с
...вилочковой железы, с у-
...иммунитета и кроветворения
...я лучевой терапии или
...онкологических больных
...остояниях. Используют
...офилактики инфекци-
...осложнений, в посттрав-
...еоперационном перио-
...оведения лучевой или
... назначении больших
... Содержимое флакона
...растворяют в 1-2 мл
...вора хлорида натрия
... ежедневно в следу-
...м по 5-20 мг (30-100
...детям до 1 года 1 мг,
... 2-3 мг; 7-14 лет 3-5
...ой в зависимости от
...ений иммунитета.

При необходимости [illegible] повторный курс (через 1-о мес [illegible]. С профилактической целью препарат применяют [illegible] ежедневно взрослым по 5-10 мг, детям 1-5 мг в течение 3-5 дней.

ТИМОЛ (Thymolum). Антигельминтное средство, применяемое при кишечных инвазиях (анкилостомидоз, трихоцефалез, некатороз); в качестве антисептического средства - при поносах и метеоризме; для дезинфекции полости рта, носоглотки. Внутрь при глистных инвазиях по 0,75-4 г/сут, при поносах и метеоризме по 0,1 г 2-3 раза в день. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 1 г, суточная 4 г. Наружно в виде 0,05-0,1% растворов. Противопоказан при декомпенсации сердечной деятельности, болезнях печени и почек, язвенной болезни желудка и кишечника, беременности. Не назначают детям в возрасте до 2 лет.

ТИНИДАЗОЛ (Tinidazolum). Синоним: Fasigin. Подавляет развитие Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolitica и лямблий. Применяют при остром и хроническом трихомонозе у женщин и мужчин. Внутрь однократно 2 г (4 табл. по 0,5г) во время или после еды. В отдельных случаях возможны умеренная лейкопения, головокружение, наруше-

ние координации движений, в единичных случаях аллергические реакции. Противопоказан при нарушении кроветворения, заболеваниях ЦНС в активной фазе, в первые 3 мес беременности; препарат назначают с осторожностью в последующие месяцы беременности, и в период лактации. Во время лечения запрещается употребление алкогольных напитков во избежание спазма органов брюшной полости, тошноты, рвоты, не рекомендуется назначать с этионамидом.

ТИОАЦЕТАЗОН (Thioacetazonum). Синонимы: Tibon, Amithiozon. Обладает противомикробной активностью в отношении микобактерий туберкулеза и возбудителя лепры. Эффективен при устойчивости микобактерий туберкулеза к основным противотуберкулезным препаратам. Применяют при туберкулезе слизистых и серозных оболочек, лимфаденитах, специфических свищах, скрофулодерме, лепре. Внутрь после еды по 0,05 г 2 раза в день. Детям 0,0005-0,001 г/(кг·сут) (не более 0,05 г/сут). Возможны головная боль, тошнота, дерматиты, ухудшение аппетита. В редких случаях возможны анемия, агранулоцитоз, лейкопения альбуминурия, гепатит. Противопоказан при нарушениях функции печени и почек, заболеваниях кроветворной системы.

ТИОДИН (Tiodinum). Смесь 0,1 г йодида натрия и 0,12 г тиамина гидробромида (витамина B1), растворенных в 10 мл дистиллированной воды. Способствует нормальному течению углеводного обмена и тем самым препятствует накоплению в тканях молочной и пировиноградной кислот и развитию невритов и других поражений нервной системы. Способствует стабилизации витамина B1 в организме. Применяют при остром и хроническом пояснично-крестцовом радикулите в стадии обострения (в том числе дискогенный), плечевом плексите, воспалительных заболеваниях ЦНС (арахноэнцефаломиелиты). Вводят в/м медленно по 5-10 мл в день в течение 6-20 дней. Используют как самостоятельно, так и в комплексе с физиотерапевтическими методами лечения. Возможны общая слабость, ощущение разбитости, явления йодизма (насморк, отек Квинке, крапивница, слюно- и слезотечение, угревая сыпь на коже). В этом случае следует уменьшить дозу или отменить препарат. Противопоказан при гипертонической болезни, аллергических состояниях, повышенной чувствительности к препаратам йода, туберкулезе легких, нефритах, нефрозах, фурункулезе, хронической пиодермии, геморрагических диатезах, крапивнице, беременности.

ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЙ (Thiopentalum-natrium). Смесь 5-этил-5-(2-амил)-2-тиобарбитурата натрия с безводным карбонатом натрия. Синонимы: Penthiobarbital, Tiopan. Оказывает снотворное, а в больших дозах наркотическое действие. Применяют для вводного наркоза, реже для длительного наркоза при эндоскопических исследованиях, болезненных перевязках, небольших по объему хирургических процедурах. В/в в виде 2-2,5% раствора (детям, ослабленным больным и лицам пожилого возраста 1% раствор). Иногда (детям) вводят per rectum 5% раствор или в суппозиториях. Высшая разовая доза 1 г. Возможны ларингоспазм, повышенная саливация, при быстром введении препарата - коллапс. Противопоказан при органических заболеваниях печени и почек, бронхиальной астме, гипотонии, гиповолемии, лихорадочных состояниях, воспалительных заболеваниях носоглотки.

ТИОФОСФАМИД (Thiophosphamidum). Синонимы: тиоТЭФ; Tespamim, Thiotepum. Оказывает сильное цитостатическое действие на пролиферирующие ткани, включая и опухолевые; угнетает кроветворение. Применяют при опухолях яичника (после нерадикальных операций) с метастазами, раке молочной железы, мезотелиоме брюшины с асцитом, хроническом лимфолейкозе и миелолей-

хозе, лимфогранулематозе, лимфосаркоматозе. В/м, в/в, внутриартериально, внутриплеврально, внутрибрюшинно, а также непосредственно в опухоль. Способ введения и дозы устанавливают индивидуально. Обычно назначают 0,01-0,015-0,02 г в виде 0,5% раствора через 2, 4, 5 дней, в некоторых случаях 1 раз в неделю. На курс лечения от 0,15 до 0,3 г препарата. Курс лечения может быть повторен через 1 1/2-2 мес. В брюшную и плевральную полости препарат вводят по 0,02 г 1-2 раза в неделю или реже после предварительной эвакуации экссудата. Во всех случаях применения препарата систематически исследуют кровь. При применении лучевой терапии таким больным тиофосфамид можно назначать лишь через месяц при условии восстановления картины крови. Возможно угнетение костномозгового кроветворения, сопровождающееся лейкопенией (иногда с агранулоцитозом) и тромбоцитопенией с явлениями геморрагического диатеза; у некоторых больных понос. Противопоказан при общем тяжелом состоянии больных, кахексии, лейкопении, тяжелых заболеваниях печени, почек и сердечно-сосудистой системы.

ТИРЕОИДИН (Thyreoidinum). Гормональный препарат, получаемый измельчением обезжиренных и высушенных щитовидных желез убойного скота.

Синонимы: Thyranon, Thyroid. В малых дозах дает анаболический эффект, в больших приводит к усилению распада белка, тормозит тиреотропную активность гипофиза и понижает функцию щитовидной железы. Применяют при первичном гипотиреозе и микседеме, кретинизме, церебрально-гипофизарных заболеваниях и ожирении, протекающих с гипотиреозом; эндемическом и спорадическом зобе; раке щитовидной железы. Внутрь при микседеме и гипотиреозе по 0,05-0,2 г/сут. При раке щитовидной железы до 1 г в день; высшая разовая доза для взрослых 0,3 г, суточная 1 г. Детям дозы устанавливают в зависимости от возраста от 0,05 г до 0,45 г/сут. При микседеме и гипотиреозе назначают детям дозы, близкие к высшим, уточняя их в зависимости от клинического течения болезни и эффективности терапии. При передозировке возможны явления тиреотоксикоза, стенокардия, ухудшение течения сахарного диабета, аллергические реакции. Противопоказан при тиреотоксикозе, сахарном диабете, болезни Аддисона, общем истощении, тяжелых формах коронарной недостаточности.

ТИРЕОКОМБ (Thyreocomb). В 1 табл. содержит лиотиронина (трийодтиронина) 0,01 мг, левотироксина (тироксина) 0,07 мг, йодида калия 0,15 мг. Комбинированный препарат гормонов щитовидной железы и йодида калия.

Применяют при гипотиреоидизме, тиреоидите, эндокринном экзофтальме, для профилактики рецидивирующего зоба. Взрослым при гипотиреозе по 1 табл. 1 раз в день, постепенно повышая дозу до 2 табл. 3 раза в день; при тиреоидите и для профилактики рецидивирующего зоба после операции на щитовидной железе по 1 табл. ежедневно. Возможны беспокойство, бессонница, уменьшение массы тела, учащение пульса, повышение АД.

ТИРЕОТОМ (Thyreotom). 1 табл. содержит лиотиронина (трийодтиронина) 0,01 мг, левотироксина (тироксина) 0,04 мг. Влияет на обмен веществ и метаболизм. Применяют при гипотиреозе, эутиреоидном зобе, для профилактики и терапии рецидива после резекции зоба. Дозы необходимо индивидуализировать в зависимости от возраста больного, характера и течения заболевания; взрослым назначают обычно 1-3 табл. в день.

ТМИНА ПЛОД (Fructus Carvi). Содержит эфирное масло (3-6%), в состав которого входит до 50% карвона, жирное масло, белковые вещества. Применяют в качестве ветрогонного средства при ослаблении деятельности желудочно-кишечного тракта, метеоризме в виде настоя (20 г плодов на стакан кипятка) по 1-2 ст. л. 3-4 раза в день.

ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ (Tocopheroli acetas). Синонимы: витамин E, Erevit. Активное противоокислительное средство, защищающее различные вещества от окисления, в частности полиненасыщенные жирные кислоты, ретинол и др. Применяют при мышечных дистрофиях; амиотрофическом боковом склерозе; нарушениях менструального цикла; угрозе прерывания беременности; нарушениях сперматогенеза и потенции; некоторых дерматозах, псориазе, миокардиопатиях, спазмах периферических сосудов; заболеваниях печени; в педиатрии при склеродерме, гипотрофии, гипервитаминозе D. Внутрь при заболеваниях нервно-мышечной системы 15-100 мг/сут. При привычном аборте 10-15 мг/сут в первые 2-3 мес беременности. При угрожающем аботе 100-150 мг в день в течение 5-7 дней (вместе с прогестероном). При атеросклерозе и заболеваниях периферических сосудов 100 мг/сут в сочетании с ретинолом. Большие дозы вызывают креатинурию и снижение работоспособности.

ТОЛОКНЯНКИ ЛИСТ (МЕДВЕЖЬЕ УШКО) (Folium Uvae ursi). Содержит гликозид арбутин (6%), метиларбутин, гиперозид, дубильные вещества (30-35%) пирогалловой группы, гликозид гиперозид, урсоловую кислоту. Применяют в качестве диуретического и дез-

инфицирующего средства при воспали-тельных заболеваниях мочевыводящих путей в виде отвара (10,0:180,0) по 1 ст. л. 5-6 раз в день; детям (3,0:100,0) по 1 де-сертной ложке 4 раза в день.

ТОРЕКАН (Torecan). Противорвот-ное средство и средство против голово-кружения, успокаивающе влияет на рвотный центр. Применяют при тошноте и рвоте (в период беременности, после операции, вследствие черепно-мозговой травмы, расстройства желудочно-кишеч-ного тракта, нарушений деятельности пе-чени и желчных протоков, медикамен-тозной непереносимости, после рентгено-терапии, при морской и воздушной бо-лезни); головокружении (после сотрясения мозга, при атеросклерозе, ве-стибулярных нарушениях и болезни Меньера). Взрослым и детям старше 15 лет 1 драже или 1 суппозиторий 1-3 раза в день; в более тяжелых случаях по 1 ам-пуле подкожно, в/в или в/м. Детям до 15 лет назначать препарат не рекомендует-ся. Осторожность нужна и в отношении больных с тяжелой недостаточностью пе-чени и почек, и в отношении тех, кто на-ходится на работе, требующей быст-рой психофизической реакции. Иног-да наблюдаются сухость во рту, сонли-вость; редко - гипотензия и тахикардия. Эти явления исчезают при понижении дозировки или отмене

препарата. Противопоказан при депрессии, коматозных состояниях, острой глаукоме.

ТОРФОТ (Torfotum). Отгон торфа. Биогенный стимулятор, применяемый при блефарите, конъюнктивите, кератите, помутнении стекловидного тела, миопическом хориоретините и др., а также артритах, радикулитах, миалгиях. Подкожно по 1 мл ежедневно в течение 30-45 дней; под конъюнктиву по 0,2 мл через день (всего 15-20 инъекций). Курс повторяют через 1 1/2-2 мес 3-4 раза в год. Противопоказан при тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонической болезни, беременности после 7 мес, острых желудочно-кишечных расстройствах, далеко зашедших формах нефрозонефрита.

ТРАЗИКОР (Trasicor). Специфический блокатор симпатических β-адренорецепторов; обладает антиаритмическом свойством. Применяют при нарушениях сердечного ритма (тахикардия различной этиологии, в том числе при тиреотоксикозе, предсердная и желудочковая экстрасистолия, расстройства сердечного ритма при передозировке препаратов наперстянки), стенокардии. Внутрь по 0,02г 2-3 раза в день; при необходимости дозу повышают до 0,08-0,12 г/сут. Возможны диспептические явления, слабость, головокружение, явления сердеч-

ной недостаточности. Противопоказан при бронхиальной астме, атриовентрикулярной блокаде, выраженной недостаточности и брадикардии.

"ТРАЦЕПТИН" ("Traceptinum). Вагинальное противозачаточное средство, применяемое для предотвращения беременности. Вводят во влагалище по 1 табл. за 10 мин до полового сношения. Возможна аллергическая реакция, выражающаяся в чувстве жжения во влагалище. Противопоказан при кольпитах различной этиологии и эрозии шейки матки.

ТРЕМБЛЕКС (Tremblex). Одна ампула содержит 0,25 мг дексбензетимида. Эффективен при лечении экстрапирамидных нарушений, вызванных нейролептическими действиями. В/м в дозе 0,125-0,25 мг. Можно вводить в одном шприце вместе с флушпириленом (ИМФП) каждые 2-4 дня. Требуется особая осторожность при введении препарата больным глаукомой, аденомой предстательной железы, при беременности, болезни Паркинсона.

ТРЕНТАЛ (Trental). Синоним: Pentoxifyllin. Вазоактивное средство с ангиопротекторным действием. Применяют при микроангиопатиях различного генеза, периферических нарушениях артериовенозного кровообращения на фоне ате-

росклеротических и диабетических процессов (диабетическая ангиопатия, облитерирующий эндартериит и др.), расстройствах трофики (постинсультный синдром, язвы ног, гангрена отморожения), ангионевропатиях (парестезии, акроцианоз, болезнь Рейно); нарушениях мозгового кровообращения, острая и хроническая недостаточность кровоснабжения сетчатой оболочки глаза, острых нарушениях слуха вследствие расстройства кровообращения. При пероральном введении вначале назначают по 2 драже 3 раза в день, а затем по 1 драже 3 раза в день. При в/в введении назначают 5 мл (100 мг) препарата в 250-500 мл инфузионного раствора. Вводят капельно в течение 1 1/2-3 ч. Затем дозу можно увеличить до 15 мл (300 мг) препарата в день. При быстром парентеральном введении в высоких дозах возможны тошнота, рвота, головокружение, боль в области сердца, коллапс и другие реакции, встречающиеся при назначении теофиллина. Частота побочных реакций снижается до минимума при перфузии препарата в дозах, рекомендуемых выше. Противопоказан при остром инфаркте миокарда; обильном кровотечении; геморрагиях, тяжелом коронарном церебральном склерозе с гипертонией; не рекомендуется назначать беременным.

ТРИАМПУР-КОМПОЗИТУМ (Triampur-compositum). Комбинирован-

ный препарат, имеющий следующий состав: триамтерена 0,025 г, гидрохлортиазида (дихлотиазида) 0,0125 г. Усиливает выделение с мочой натрия, не повышая выведение калия; способен уменьшать гипокалиемию, вызываемую производными бензотиадиазина. Дихлотиазид (активный салуретик) уменьшает реабсорбцию ионов натрия и хлора в проксимальной (а частично и в дистальной) части извитых канальцев почек; реабсорбция калия и бикарбонатов также [illegible], однако в меньшей степени. Применяют при отеках сердечного и почечного происхождения, а также отеках [illegible] сроках беременности и [illegible] циррозе печени. Внутрь ежедневно по 2-4 табл. При длительном лечении - по 1 табл. ежедневно. Возможны тошнота, рвота, головная боль, понижение АД, однако при снижении дозы эти явления уменьшаются. Противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, подагре, гиперкалиемии, выраженных поражениях печени, в первые месяцы беременности.

ТРИБУСПОНИН (Tribusponinum). Содержит сумму стероидных сапонинов из травы якорцев стелющихся (Tribulus terresteris). Оказывает умеренное гипохолестеринемическое действие. Применяют в комплексной, терапии больных атеросклерозом (общего, церебрального, коронарных сосудов). Внутрь по 0,1-0,2 г 2-3

раза в день после еды. Лечение проводят циклами по 20-30 дней с 7-10-дневными перерывами. Курс 3-4 мес. При необходимости повторяют после 3-4-месячного перерыва. Возможны потеря аппетита, потливость, иногда кожный зуд.

ТРИЙОДТИРОНИНА ГИДРОХЛОРИД (Triiodthyronini hydrochloridum). Синтетический препарат, соответствующий естественному гормону щитовидной железы. Синоним: Liothyroninum, Trionine. Фармакологическое действие и показания к применению те же, что и для тиреоидина. Внутрь по 5-20 мкг-сут, при необходимости дозу постепенно увеличивают по 60-100 мкг/сут. Иногда препарат эффективен при резистентности к тиреоидину. Необходима осторожность при коронарном кардиосклерозе и вторичном гипотиреозе при наличии недостаточности коры надпочечников (во избежание обострения дозы не должны превышать 10-20 мкг/сут). Противопоказания те же, что и при применении тиреоидина.

ТРИЛИСТНИКА ВОДЯНОГО ЛИСТ (Folium Menyanthidis). Лист вахты трехлистной, лист трифолии (Folium Trifolii fibrini). Содержит горькие, флавоновые гликозиды (рутин, гиперозид) и дубильные вещества. Применяют в качестве средства, возбуждающего аппетит, при

понижении функции желудочно-кишеч[illegible]ного тракта в виде настоя (2 ч. л. на ст[illegible]кан кипятка) по 1/4 стакана 2-3 раза [illegible] день за 30 мин до еды.

ТРИМЕКАИН (Trimecainum). Сино[illegible]ним: Mesocain. Местноанестезирующ[illegible] средство; действует сильнее и [illegible]тельнее, чем новокаин. Прим[illegible] проводниковой или инфи[illegible] анестезии. Для инфильтра[illegible]стезии вводят до 800 мл 0,25[illegible] до 400 мл 0,5% раство[illegible] 1% раствора; для прово[illegible]зии - до 100 мл 1% или до 20 мл 2[illegible]твора. Возможны побледнени[illegible], го[illegible]ловная боль, тошнота. Противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к препарату.

ТРИМЕТИН (Trimethinum). Синонимы: Ptimal, Trimethadionum. Оказывает противосудорожное действие. Применяют при эпилепсии, преимущественно petit mal, психических и сосудистых эквивалентах. Внутрь во время или после еды по 0,25 г 2-3 раза в день, детям 0,05-0,02 г/сут. Возможны светобоязнь, кожные высыпания, нейтропения, агранулоцитоз, анемия, эозинофилия, моноцитоз. Противопоказан при нарушениях функции печени и почек, заболеваниях зрительного нерва и кроветворных органов.

ТРИНИТРОЛОНГ (Trinitrolong). Полимерные пленки овальной формы, содержащие 1 или 2 мг нитроглицерина. Применяют в качестве пролонгированного препарата нитроглицерина как для купирования, так и для профилактики приступов стенокардии. Пластинку тринитролонга прижимают пальцами к слизистой оболочке полости рта (обычно в области верхней десны над клыками или малыми коренными зубами). Наступление эффекта и продолжительность действия у разных больных неодинаковы и зависят от индивидуальной скорости рассасывания пластинки и правильного подбора дозы. Если необходимо прекратить действие препарата - пластинку удаляют. Пластинку рекомендуют наносить на слизистую оболочку десны после еды.

ТРИОКСАЗИН (Trioxazin). Синонимы: Sedoxazin, Trimetozinum. Транквилизатор, лишенный миорелаксирующего эффекта. Успокаивает ЦНС. Применяют при невротических состояниях с явлениями возбуждения, страха, бессонницы, повышенной раздражительности, вялости, апатии, утомляемости; ангионеврозах.

ТРИПСИН КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (Trypsinum crystallisatum). Протеолитический фермент, получаемый из поджелу-

...ИТРОЛОНГ (Trinitrolong)
...ие пленки овальной формы,
...е 1 или 2 мг нитроглицерина
... в качестве пролонгированно-
...а нитроглицерина как для ку-
...так и для профилактики при-
...стенокардии. Пластинку
...га прижимают пальцами к
...олочке полости рта (обычно
...рхней десны над клыками
... коренными зубами). На-
...офекта и продолжитель-
...ия у разных больных нео-
... и зависят от
...ой скорости рассасыва-
...и и правильного подбора
...необходимо прекратить
...арата - пластинку уда-
...нку рекомендуют нано-
...тую оболочку десны по-

...ИН (Trioxazin). Сино-
... Trimetozinum. Транкви-
...ый миорелаксирующего
...ивает ЦНС. Применяют
...х состояниях с явлени-
...траха, бессонницы, по-
...жительности, вялости,
...сти; ангионеврозах.

...РИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
...alium). Протеолитиче-
...чаемый из поджелу-

...дочной железы крупного рогатого скота. При местном применении расщепляет ...некротизированные ткани и фибринозные образования, разжижает вязкие секреты, экссудаты, сгустки крови; оказывает противовоспалительное действие. Применяют при тромбофлебитах, воспалительно-дистрофических формах пародонтоза, остеомиелите, гайморите, отите, ...рите, иридоциклите, кровоизлияниях в переднюю камеру глаза; как вспомогательное средство для облегчения удаления вязких секретов и экссудатов при воспалительных заболеваниях дыхательных путей (трахеиты, бронхиты и др.). В/м по 0,005 г в 1-2 мл изотонического раствора хлорида натрия 1-2 раза в день; ингаляции (5-10 трипсина в 2-3 мл изотонического расвора хлорида натрия); интраплеврально (10-20 мг в 20-50 мл изотонического раствора хлорида натрия); глазные капли (0,2-0,25% раствор). Побочное действие и противопоказания те же, что и для лидазы.

ТРИРЕЗИД-К (Triresid-K). Синонимы: Adelphan-Esidrex-K, Triniton. Гипотензивное средство, предназначенное для длительного лечения тяжелых видов артериальной гипертензии. АД понижается постепенно. Применяют при среднетяжелой и тяжелой эссенциальной и других видов гипертонии. По 1 драже 1-2 раза в день, при отсутствии доста-

точного гипотезивного эффекта суточную дозу постепенно увеличивают на 1 драже в интервалах 7-14 дней, но не более чем по 6 драже в день (3 раза по 2 драже). Поддерживающая доза составляет 1-2 драже в день. Препарат принимают после еды. Могут отмечаться головная боль, слабость, изжога, тошнота, рвота и др.

ТРИСАМИН (Trisaminum). Синонимы: триоламин, Trisbuffer и др. Буферное вещество, повышающее при в/в введении щелочной резерв крови. Применяют при хирургических вмешательствах, ожогах и других состояниях, сопровождающихся ацидозом, воспалительных процессах, интоксикациях, диабетических ацидозах, отравлениях салицилатами, барбитуратами и др. В/в в виде 3,66% раствора (медленно, так как при быстром введении возможны угнетение дыхания, снижение в крови содержания ионов натрия, калия и сахара, средняя скорость введения раствора 500 мл/ч - 120 капель/мин). Максимальная доза - не выше 50 мл/кг массы тела больного в сутки. Повторно можно вводить не ранее чем через 48 ч после предыдущего введения. При использовании больших доз следует добавлять натрия хлорид из расчета 1,75 г и калия хлорид из расчета 0,372 г на 1 л 3,66% раствора трисамина. При опасности развития гипогликемии рекомендуется одно-

временно с трисамином вводить 5-10% раствор глюкозы с инсулином из расчета 1 ЕД на 4 г глюкозы. Возможно угнетение дыхания. При передозировке возникают явления алкалоза, гипогликемия, гипотония, рвота. Противопоказан при нарушениях выделительной функции почек.

ТРИСЕДИЛ (Trisedyl). Синонимы: Trifluperidolum, Triperidol. Активный нейролептик, усиливает действие анальгезирующих и снотворных средств, оказывает противосудорожное действие. Применяют в психиатрии (острое возбуждение, галлюцинация и бред, острые ажитированные депрессии, маниакальные состояния, эпилептиформный психоз и др.). Внутрь по 0,25-0,5 мг с последующим повышением дозы до 1-2 мг/сут; в/м 1,25-5 мг. Возможны экстрапирамидные расстройства. Противопоказан при органических заболеваниях ЦНС, истерии.

"ТРИСОЛЬ". Солевой раствор для инъекций (Solutio "Trisolum" pro injectionibus). Состав: натрия хлорида 5 г, калия хлорида 1 г, натрия гидрокарбоната 4 г, воды для инъекций до 1 л. Уменьшает сгущение крови и метаболический ацидоз, улучшает капиллярное кровообращение, функциональную способность сердца и почек, оказывает дезинтоксикационное действие. Применяют при холе-

ре Эль-Тор (Инаба), острой дизентерии и пищевой токсикоинфекции в качестве средства, устраняющего или уменьшающего явления обезвоживания и интоксикации организма. В/в (струйно или капельно). При тяжелых формах заболевания (гиповолемический инфекционно-токсический шок, неадекватная капиллярная перфузия, декомпенсированный метаболический ацидоз, анурия) начинают со струйного введения препарата с последующим переходом к капельному. При более легких формах заболевания (интоксикация и обезвоживание организма, метаболический ацидоз, олигурия) можно ограничиться капельным введением препарата. Неотложная регидратационная терапия для выведения больных из гиповолемического шока заключается в 1-3-часовом струйном введении раствора, подогретого до 38-40° С. В течение 1-го часа вводят раствор в количестве, соответствующем 7-10% массы тела больного. В дальнейшем струйное введение раствора заменяют капельным в течение 24-48 ч со скоростью 40-120 капель в минуту. Препарат применяют под контролем лабораторных исследований. Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему жидкости, потерянной с рвотными массами, калом, мочой и потом. Баланс введенной и потерянной жидкости оп-

...° (Инаба), острой дизентерии и
...токсикоинфекции в качестве
...устраняющего или уменьшаю-
...ния обезвоживания и интокси-
...анизма. В/в (струйно или ка-
...При тяжелых формах заболева-
...оволемический инфекционно-
...й шок, неадекватная
...я перфузия, декомпенсирован-
...лический ацидоз, анурия) на-
...струйного введения препарата
...дим переходом к капельному.
...легких формах заболевания
...ия и обезвоживание орга-
...болический ацидоз, олигу-
...ограничиться капельным
...епарата. Неотложная регид-
...терапия для выведения
...поволемического шока за-
...3-часовом струйном введе-
...подогретого до 38-40° С. В
...са вводят раствор в коли-
...ствующем 7-10% массы
...В дальнейшем струйное
...ра заменяют капельным
...ч со скоростью 40-120
...у. Препарат применяют
...лабораторных исследова-
...ичество вводимого рас-
...соответствовать объему
...нной с рвотными мас-
...ной и потом. Баланс
...янной жидкости оп-

ределяется каждые 6 ч. При развитии гиперкалиемии и ее последствиях раствор "Трисоль" заменяют временно раствором "Дисоль" до нормализации электролитного баланса.

ТРИФЕРМЕНТ (Triferment). Ферментный препарат, участвующий в переваривании углеводов, липидов и белков. Применяют при хронической недостаточности поджелудочной железы, фиброкистозной болезни поджелудочной железы, хроническом колите, для подготовки больных к рентгенологическим исследованиям, а также к операциям на брюшной полости (для устранения газов). Взрослым по 3-6 драже в день, детям старше 1 года по 1-2 драже в день, детям грудного возраста по 1 драже в день, предварительно размельчая таблетку. При подготовке больных к рентгенологическому исследованию или к операции препарат назначают в течение 2-3 дней.

ТРИФТАЗИН (Triphthazinum). Синонимы: Stelazine, Terfluzin. Активное нейролептическое средство, применяемое при шизофрении (различной формы), других психических заболеваниях, протекающих с бредом и галлюцинациями (инволюционные и алкогольные психозы). Внутрь по 0,005 г с последующим повышением дозы в среднем на 0,005 г в

день (средняя терапевтическая доза 0,03-0,05 г/сут); в/м 1-2 мл 0,2% раствора. Возможны экстрапирамидные расстройства, вегетативные нарушения, в отдельных случаях токсический гепатит, агранулоцитоз и аллергические реакции. Противопоказан при острых воспалительных заболеваниях печени, заболеваниях сердца с нарушением проводимости и в стадии декомпенсации, тяжелых заболеваниях почек, беременности.

ТРИХЛОРЭТИЛЕН (Trichloraethylenum). Синонимы: Trilen, Narcogen, Trichloren. Мощное наркотическое средство, применяемое для наркоза (в основном для кратковременного) с помощью наркозных аппаратов. Хирургическая стадия наркоза наступает при дозе 2-3 об.%; при небольших операциях и для обезболивания родов - 0,4-0,8 об.%. При передозировке учащение дыхания с нарушением сердечного ритма. Противопоказан при заболеваниях печени и почек, аритмии, заболеваниях легких, анемии.

ТРИХОМОНАЦИД (Trichomonacidum). Оказывает антипротозойное действие на трихомонады. Применяют при урогенитальных заболеваниях женщин и мужчин, вызываемых трихомонадами. Внутрь после еды взрослым по 0,3 г

в день (в 2-3 приема) в течение [illegible] Женщинам одновременно назначают [illegible] …альные суппозитории по 0,[illegible] [illegible] в течение 10 дней [illegible] [illegible] Мужчинам одновременно [illegible] приемом внутрь [illegible] урет[illegible] по 10 мл [illegible] ежедневно в течение 5-6 [illegible] 10-20 дней курс повторяют [illegible] раздражающее действие на [illegible] оболочки и повышение [illegible] лений.

ТРИХОПОЛ (Trichopol). Синонимы: Flagyl, Metronidazole. Противотрихомонадное средство, применяемое при остром и хроническом трихомонозе у женщин и мужчин. Внутрь по 0,25 г 2 раза в день в течение 7-10 дней. Иногда первые 3-4 дня назначают по 0,25 г 3 раза в день. Общая доза на курс лечения 5 г. Возможны диспептические явления, сухость во рту, потеря аппетита; иногда лейкопения. В отдельных случаях избыточное развитие грибковой флоры влагалища, что требует одновременного назначения нистатина.

ТРОКСЕВАЗИН (Troxevasin). Синоним: Venoruton. Обладает Р-витаминной активностью, уменьшает проницаемость и ломкость капилляров. Применяют при

варикозном расширении вен, поверхностном тромбофлебите, венозных язвах и дерматитах, при геморроидальных узлах. Вначале в/м или в/в (медленное введение) по 1 ампуле через день (не менее 5 инъекций), затем переходят на пероральную терапию с применением 2-3 капсул в день во время еды в течение 2-4 нед и более. Гель наносят утром и вечером на кожу болезненного участка и слегка массируют до полного всасывания препарата.

ТРОПАФЕН (Tropaphenum). Расширяет периферические сосуды и снижает АД. Применяют при заболеваниях, связанных с нарушением периферического кровообращения (эндартериит, болезнь Рейно, акроцианоз и др.), трофических язвах конечностей, вяло заживающих ранах, гипертонических кризах, для диагностики и лечения феохромоцитомы. При нарушениях периферического кровообращения вводят подкожно или в/м по 1-2 мл 1-2% раствора 1-3 раза в день. Курс - 10-12 дней. Для купирования и предупреждения гипертонических кризов вводят подкожно или в/м 1 мл 1-2% раствора. Для фармакологической диагностики феохромоцитомы вводят в вену 1 мл 1% раствора взрослым и 0,5 мл 1% раствора детям. Возможны тахикардия, головокружение, ортостатический коллапс. Для предупреждения орто-

...ической гипотензии во время инъек-
...ции в течение 1 1/2-2 ч после нее боль-
...ные должны находиться в положении ле-
...жа. Противопоказан при выраженных
...ческих заболеваниях сердца и со-
судов.

ТРОПАЦИН (Tropacinum). Оказы-
вает выраженное центральное и перифе-
рическое антихолинергическое действие,
блокируя в основном м-холинореактив-
ные системы, а также обладает ганглиоб-
локирующим и спазмолитическим свой-
ствами. Применяют при паркинсонизме,
гиперкинезах, спастических парезах и па-
ралнчах. Внутрь после еды по 0,01-0,0125 г
1-2 раза в день; детям дозы устанавливают
соответственно возрасту (от 0,001 до 0,005 г).
Высшая доза для взрослых 0,03 г, суточная
0,1 г. Возможны сухость во рту, расширение
зрачков, диспептические явления, тахикар-
дия, головная боль, головокружение. Про-
тивопоказан при глаукоме.

ТУБОКУРАРИН-ХЛОРИД (Tubo-
curarini-chloridum). Курареподобный пре-
парат с антидеполяризующим действием.
Применяют в анестезиологии как миоре-
лаксант, в травматологии при репозиции от-
ломков и вправлении сложных вывихов, в
психиатрии для предупреждения травм при
судорожной терапии у больных шизофре-
нией и др. В/в из расчета 0,4-0,5 мг/кг. При
операции, продолжающейся 2-2 1/2 ч, вво-
...

дят до 45 мг препарата. Введение препарата требует осторожности, так как он может вызвать остановку дыхания. При необходимости для ослабления действия тубокурарина вводят прозерин. Противопоказан при миастении, выраженном нарушении функции печени и почек, в преклонном возрасте.

ТУРИНАЛ (Turinal). Синонимы: Gestanin, Orageston. Оказывает выраженное прогестативное действие и играет гормонозаместительную роль при беременности. Применяют при привычном и угрожающем аборте, угрожающих преждевременных родах. При угрожающем аборте назначают по 1 табл. 3 раза в день в течение 5-7 дней, при привычном аборте - по 1-2 табл. в день в течение месяца (обычно до V месяца беременности). При угрожающих преждевременных родах дозы и длительность применения устанавливают индивидуально в каждом конкретном случае.

ТУСУПРЕКС (Tusuprex). Синоним: Oxeladin. Оказывает противокашлевое и слабое отхаркивающее действие. Не угнетает дыхания, не вызывает пристрастия и привыкания. Применяют при сухом кашле, катарах верхних дыхательных путей, заболеваниях легких. Внутрь: взрослым по 20 мг 3-4 раза; детям до 1 года - по 5 мг 3-4 раза в день; детям старше 1 года - по

5-10 мг 3-4 раза в день. Возможны диспептические явления. Противопоказан при бронхоспастических состояниях, бронхоэктазиях, бронхиальной астме, бронхитах с затрудненным отхаркиванием мокроты.

ТЫКВЫ СЕМЯ (Semen Cucurbitae). Содержит жирное масло (40-50 %), фитостерин, смолистые вещества, аскорбиновую кислоту, витамин B_1. Применяют в качестве противоглистного средства при тениидозах внутрь натощак по 300 г семян (можно растереть в ступке и смешать с 50-100 г меда) небольшими порциями (через 3 ч слабительное); детям в возрасте 3-4 лет 75 г, 5-7 лет 100 г, 8-10 лет 150 г, 10-15 лет 200-300 г.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО ТРАВА И ЦВЕТКИ (Herba et Flores Achilleae Millefolii L.) Содержит витамин K, эфирное масло (до 1%), сесквитерпены, ахиллеин, дубильные вещества. Применяют в качестве кровоостанавливающего средства при маточных кровотечениях на почве воспалительных процессов, фибромиом, при геморроидальных кровотечениях в виде настоя (15,0:200,0) по 1 ст. л. 3 раза в день.

"УНДЕВИТ" ("Undevitum"). Состав: ретинола ацетата 0,001 (3300 МЕ), тиамина бромида 0,00258 г, рибофлавина

0,002 г, пиридоксина 0,003 г, цианокобаламина 2 мкг, никотинамида 0,02 г, рутина 0,01 г, токоферола ацетата 0,01 г, кислоты фолиевой 0,0005 г, кальция пантотената 0,003 г, кислоты аскорбиновой 0,075 г. Применяют для улучшения обменных процессов и общего состояния у лиц среднего и пожилого возраста с целью предупреждения и лечения преждевременного старения. Назначают внутрь после еды для профилактических целей по 1 драже 1-2 раза в день, для лечебных целей по 2 драже 3 раза в день в течение 20-30 дней. Курс повторяют через 1-3 мес.

"УНДЕЦИН" ("Undecinum"). Состав: ундециленовой кислоты 8 г, ундециленовой меди 8 г, пара-хлорфенилового эфира глицерина 4 г, мазевой основы 80 г. Обладает противогрибковой активностью. Применяют при различных формах эпидермофитии, дрожжевых дерматозах. Втирают в пораженные участки кожи 2 раза в день. Курс 15-20 дней.

УНИТИОЛ (Unithiolum). Оказывает противотоксическое действие при отравлении веществами, способными реагировать с сульфгидрильными группами. Применяют при острых и хронических отравлениях соединениями мышьяка, ртути, хрома, висмута и других металлов (но не свинца!), гепатолентикулярной де-

...: пиридоксина 0,003 г, ...
... 2 мкг, никотинамида 0,02 г, ...
... 0,01 г, токоферола ацетата 0, ...
...ты фолиевой 0,0005 г, кальция ...
...та 0,003 г, кислоты аскорбиновой ...
...г. Применяют для улучшения ...
...к процессов и общего состояния ...
...еднего и пожилого возраста ...
...предупреждения и лечения пре...
...нного старения. Назнач...
...осле еды для профилактики ...
... 1 драже 1-2 раза в день, для ...
...елей по 2 драже 3 раза в день ...
...0-30 дней. Курс повторяют ...
...с.

...ЕЦИН" ("Undecinum"). Состав ...
...овой кислоты 8 г, ундецил...
...г, пара-хлорфенилового эф...
...на 4 г, мазевой основы 80 ...
...противогрибковой актив...
...няют при различных форм...
...ии, дрожжевых дерматозах ...
...раженные участки кожи ...
...рс 15-20 дней.

...I (Unithiolum). Оказывает ...
...ское действие при отрав...
...ми, способными реагир...
...идрильными группами ...
... острых и хронических ...
...единениями мышьяка ...
...мута и других металлов ...
...епатолентикулярной де...

генерации. В/м или подкожно по 5-10 мл 5% раствора 3-4 раза в день в течение 6-7 дней; детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом. При гепатолентикулярной дегенерации вводят в/м по 5-10 мл ежедневно или через день; на курс 25-30 инъекций. В отдельных случаях возможны тошнота, тахикардия, побледнение лица, головокружение.

УЛЬФАМИД (Ulfamid). Противоязвенное средство из группы блокаторов H2-рецепторов. Ингибирует базальную и стимулированную секрецию желудочной кислоты и пепсина. Применяют при язве двенадцатиперстной кишки и желудка, синдроме Золлингер-Эллисона, рефлюксном эзофагите, для профилактики рецидива язвы двенадцатиперстной кишки. При язве двенадцатиперстной кишки и желудка: 1 табл. 40 мг 1 раз в день перед сном в течение 8 нед, терапия прекращается после доказанного рубцевания язвы; для профилактики рецидивов дуоденальной язвы: 1 табл. 20 мг в день перед сном; при синдроме Золлингер-Эллисона: начальная доза - 1 табл. 20 мг каждые 6 ч, дозировка должна соответствовать тяжести клинической картины. Употребление препарата не рекомендуется при беременности и в период кормления грудью. Возможны понос, головная боль, чувство усталости, запоры, сухость во рту, тош-

нота, рвота, метеоризм, уменьшение аппетита, сыпь.

УРЕГИТ (Uregit). Синоним: Hydromedin. Активное диуретическое средство. Способствует выведению из организма ионов натрия и хлора, а также воды. Применяют при отеках, вызванных недостаточностью кровообращения, нарушением функции почек; отеке мозга и легких. Внутрь 0,05-0,2 г однократно после еды (лучше утром). Возможны гипокалиемия, гипохлоремический алкалоз, головокружение, слабость, диарея (показана диета, богатая солями калия). Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

"УРОБЕСАЛ" ("Urobesalum"). Состав: экстракта красавки 0,015 г, фенилсалицилата 0,25 г, гексаметилентетрамина 0,25 г. Применяют при заболеваниях кишечника (колиты, энтероколиты) и мочевыводящих путей (циститы, пиелиты, пиелонефриты) по 1 табл. 3-4 раза в день внутрь (часто в сочетании с другими препаратами).

"УРОДАН" ("Urodanum"). Состав: пиперазина 2,5 г, гексаметилентетрамина 8 г, натрия бензоата 2,5 г, лития бензоата 2 г, динатрия фосфата (безводного) 10 г, натрия гидрокарбоната 37,5 г, кислоты виннокаменной 35,6 г, сахара 1,9 г

Входящие в состав препарата соли лития и пиперазин в сочетании с мочевой кислотой образуют легкорастворимые соединения и способствуют ее выведению из организма. Применяют при подагре, мочекаменной болезни, хронических полиартритах. Внутрь перед едой по 1 ч. л. в 1/2 стакана воды 3-4 раза в день. Применяют длительно (30-40 дней). При необходимости курс повторяют.

УРОЛЕСАН (Urolesanum). Комбинированный препарат. Состав из расчета на 100 г: масла пихтового 8 г, масла мяты перечной 2 г, масла касторового 11 г, спиртового экстракта семян дикой моркови 23 г, спиртового экстракта шишек хмеля 32,995 г, спиртового экстракта травы душицы 23 г, тринола Б 0,005 г. Обладает антисептическими свойствами, повышает диурез, подкисляет мочу, увеличивает выделение мочевины и хлоридов, усиливает желчеобразование и желчеотделение, улучшает печеночный кровоток. Применяют при различных формах мочекаменной и желчнокаменной болезни, солевых диатезах, острых и хронических пиелонефрите и холецистите, холангиогепатите и дискинезии желчных путей. По 8-10 капель на кусок сахара под язык 3 раза в день до еды. Курс лечения зависит от тяжести заболевания и продолжается от 5 дней до 1 мес. При почечных и

печеночных коликах разовый прием можно увеличить до 15-20 капель. Возможны легкое головокружение, тошнота. В этом случае назначают обильное горячее питье и покой.

УРОСУЛЬФАН (Urosulfanum). Синонимы: Sulfacarbamidum, Uramid. Сульфаниламид. Наиболее активен в отношении стафилококков и эшерихий. Применяют при гнойных инфекциях мочевыводящих путей. Внутрь по 0,5-1 г 3-5 раз в день. Курс 6-14 дней. Суточная доза для детей 1-2,5 г (в 4-5 приемов). Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам.

ФАЛИГНОСТ (Falignost). Диагностическое средство, применяемое при клинически обоснованном подозрении на заболевания желчного пузыря и внепеченочных желчных путей. Противопоказан при тяжелых заболеваниях печеночной паренхимы, заболеваниях пищеварительного тракта.

ФАЛИ-ЛЕПСИН (Fali-Lepsin). Синоним: Falepsin. Противосудорожное средство, применяемое при разнообразных судорожных пароксизмах, в том числе типа petit mal. Взрослым и детям с 12-летнего возраста по 0,05 г в день, при необходимости постепенно повышают дозу

до 0,1-0,15 г 3 раза в день (максимальная доза 0,5 г/сут). Возможны головная боль, вялость, заторможенность, утомляемость. Противопоказан при нарушениях функции печени и почек.

ФАЛИМИНТ (Falimint). При нанесении на слизистые оболочки раздражает нервные окончания, оказывает незначительное болеутоляющее действие. Обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Применяют при воспалительных заболеваниях дыхательных путей; для подавления рвоты при исследовании полости рта и зева, а также в стоматологической практике при протезировании зубов; для подавления кашля и чиханья у спортсменов, артистов, лекторов и др. По 1-2 драже 3-5 раз в день. Драже держат во рту до рассасывания, не разжевывая.

ФАРИНГОСЕПТ (Faringosept). Синоним: Ambazon. Оказывает сильное бактериостатическое действие. Применяют для профилактики и лечения острых инфекций (ангины, тонзиллиты, стоматиты). Детям 3-7 лет назначают ежедневно по 3 табл; взрослым 3-5 табл. в сутки в течение 3-4 дней. Таблетки принимают через 15-30 мин после еды и держат до полного рассасывания в полости рта. После приема препарата рекомендуется воз-

держаться от приема пищи и питья в течение 3 ч.

ФАСТИН, МАЗЬ (Unguentum Fastinum). Содержит фурацилин (2%), синтомицин (1,6%), анестезин (3%), ланолин, вазелин, стеарин ("Фастин"-1) и воду (в общей сложности до 100%). Оказывает антибактериальное и обезболивающее действие. Применяют при ожогах I степени, свежих ожогах II и III степени, гнойных ранах, пиодермии. Наносят на стерильные марлевые салфетки, накладывают на пораженную поверхность, меняют через 7-10 дней.

ФЕНАЗЕПАМ (Phenazepamum). Обладает транквилизирующей, гипнотической, противосудорожной и миорелаксирующей активностью. Применяют при различных невротических, неврозоподобных, психопатических и психопатоподобных состояниях, сопровождающихся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью и напряженностью, эмоциональной лабильностью; различных вегетативных дисфункциях и расстройствах ночного сна; для купирования алкогольной абстиненции и серийных припадков различной этиологии; для лечения ригидности мышц, атетозов, различных гиперкинезов, тиков, височной и миоклонической эпилепсии. Внутрь, начиная с 0,0005-0,001 г 2-3 ра-

...приема пищи и питья в те-

...МАЗЬ (Unguentum

...ержит фурацилин (2%),
...6%), анестезин (3%), ла-
..., стеарин ("Фастин"-1) и
...ложности до 100%). Ока-
...териальное и обезболива-
... Применяют при ожогах I
... ожогах II и III степени,
... пиодермии. Наносят на
...левые салфетки, накла-
...женную поверхность, ме-
...ней.

...М (Phenazepamum). Об-
...зирующей, гипнотиче-
...рожной и миорелакси-
...стью. Применяют при
...тических, неврозопо-
...ических и психопато-
...ниях, сопровождаю-
...страхом, повышенной
...ю и напряженностью,
...бильностью; различ-
...дисфункциях и рас-
...сна; для купирова-
...стиненции и серий-
...зличной этиологии;
...сти мышц, атетозов,
...незов, тиков, высо-
...еской эпилепсии
...0005-0,001 г 2-3 ра-

за в сутки (основная доза перед сном), постепенно увеличивая дозу до 0,002-0,005 г, в стационаре дозу можно осторожно повышать до 0,01 г. Больным пожилого возраста увеличивать дозу следует особенно осторожно. Возможны сонливость, мышечная слабость, головокружение, тошнота; при передозировке возможна выраженная атаксия. Противопоказан при тяжелой миастении, выраженных нарушениях печени и почек; беременности, отравлении другими транквилизаторами, нейролептиками, снотворными и наркотическими средствами, алкоголем; работе, требующей быстрой физической и психической реакции.

ФЕНАСАЛ (Phenasalum). Синонимы: Copharten, Vermitin. Антигельминтное средство, применяемое при тениаринхозе, дифиллоботриозе, гименолепидозе. Внутрь по 2 г 1 раз в день. Детям дозы уменьшают в соответствии с возрастом.

ФЕНАЦЕТИН (Phenacetinum). Синонимы: Acetophenetidin, Phenin. Жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство. Применяют при головной боли, мигрени, миалгиях, артритах, лихорадочных состояниях по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день. Высшая разовая доза 0,5 г, суточная 1,5 г. Возможны

аллергические реакции; большие дозы могут вызвать метгемоглобинемию. Противопоказан при индивидуальной непереносимости препарата, нарушении функции почек.

ФЕНИБУТ (Phenibutum). Обладает транквилизирующей активностью без противосудорожного и миорелаксирующего компонента. Применяют при невротических и психопатических состояниях, сопровождающихся тревогой, страхом, напряжением, повышенной раздражительностью, нарушением сна; в качестве успокаивающего средства перед хирургическими вмешательствами. Внутрь взрослым 2-3 раза в день, начиная с 0,25-0,5 г с постепенным повышением разовой дозы до 0,75 г; детям и больным пожилого возраста препарат назначают в меньших дозах. Возможна сонливость.

ФЕНИГИДИН (Phenihidinum). Синонимы: Corinfar, Adalat и др. Коронарорасширяющее средство, вызывающее длительное увеличение коронарного кровотока; обладает гипотензивным и спазмолитическим свойствами. Применяют при ишемической болезни сердца с приступами стенокардии, особенно в сочетании с гипертонической болезнью. Сублингвально по 0,02 г (20 мг) 2-3 раза в день. После достижения терапевтического эффекта больного переводят на под-

держивающую дозу - по 0,01 г (10 мг) 3 раза в день. Курс обычно 1-2 мес. После приема препарата рекомендуется находиться в лежачем положении 30-60 мин. При гипотонии применяют в меньших дозах - по 0,01 г (10 мг) 3 раза в день под контролем АД. Возможны головная боль, сердцебиение, тошнота. В этих случаях следует уменьшить дозу или отменить препарат. Противопоказан при беременности.

ФЕНИКАБЕРАН (Phenicaberanum). Спазмолитическое средство, применяемое в качестве одного из средств комплексной терапии при заболеваниях пищеварительного аппарата, сопровождающихся спастическим состоянием гладкомышечных органов (холециститы, желчнокаменаая болезнь, колиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), а также при хронической коронарной недостаточности, протекающей с приступами стенокардии. Внутрь при болезнях пищеварительного тракта по 0,02 г 3-6 раз в день в течение недели, в последующие 2 нед число приемов препарата сокращают до 3 раз в сутки. Курс лечения 3 нед. При хронической коронарной недостаточности по 0,02 г 3-4 раза в день в течение 3-4 нед, при приступе стенокардии в/м по 2 мл 0,25% раствора. Возможны головокружение, головная боль, общая слабость, снижение аппети-

та. Противопоказан при хроническом нефрите с отеками и нарушением азотовыделительной функции, кровоточащей язве желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарном диабете и беременности. При остром инфаркте миокарда феникаберан назначают с осторожностью, контролируя АД. При повышении АД препарат отменяют.

ФЕНИЛИН (Phenylinum). Синонимы: Hedulin, Trombosol и др. Антикоагулянт непрямого действия. Применяют в тех же случаях, что и дикумарин. Назначают внутрь: в 1-й день 0,12-0,2 г (в 3-4 приема), во 2-й день в суточной дозе 0,09-0,15 г, затем по 0,03-0,06 г в день в зависимости от содержания в крови протромбина. Для профилактических целей назначают по 0,03 г 1-2 раза в день. Высшая разовая доза для взрослых 0,05 г, суточная 0,2 г. Побочное действие и противопоказания те же, что и для неодикумарина. Кроме того, фенилин может вызвать аллергические реакции и угнетение кровотворения; иногда отмечается окрашивание ладоней в оранжевый цвет и мочи - в розовый.

ФЕНИЛСАЛИЦИЛАТ (Phenylii salicylas). Синоним: салол. Применяют в качестве антисептического средства при заболеваниях кишечника (колиты, энтероколиты) и мочевыводящих путей (цис-

титы, пиелиты, пиелонефриты) внутрь по 0,25-0,5 г на прием 3-4 раза в день (часто в сочетании с другими препаратами).

ФЕНКАРОЛ (Phencarolum). Противогистаминное средство, применяемое при поллинозах, острой и хронической крапивнице, отеке Квинке, сенной лихорадке, аллергических ринитах, дерматозах, аллергических осложнениях, связанных с приемом лекарств, и т.д. Взрослым внутрь по 0,025-0,05 г 3-4 раза в день после еды. Курс в среднем 10-20 дней. Детям в возрасте до 3 лет - 0,005 г 2-3 раза в день, от 3 до 7 лет - по 0,01 г 2 раза в день, от 7 до 12 лет - по 0,01-0,015 г 2-3 раза в день, старше 12 лет - по 0,025 г 2-3 раза в день. Возможны сухость во рту, диспептические явления, проходящие при уменьшении дозы. Противопоказан в первые 3 мес беременности; фенкарол назначают с осторожностью больным с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (возможность раздражающего действия на слизистую оболочку), печени, сердечно-сосудистой системы.

ФЕНКОРТОЗОЛЬ (Phencortosolum). Пенный аэрозольный препарат, представляющий собой эмульсию в аэрозольном баллоне. Состав препарата в одной упаковке: фенилсалицилата 5 г, гид-

рокортизона ацетата 0,125 г, масла оливкового 10 г, эмульгатора Т-2 3 г, ОС-20 2 г, глицерина 2,5 г, этилцеллозольва 3 г, нипагина 0,1 г, воды дистиллированной 24,275 г, дихлордифторметана (хладон-12) 5 г. При выходе из баллона образуется пена белого цвета со слабым запахом этилцеллозольва. Обладает фотозащитным и противовоспалительным свойствами. Применяют при фотодерматозах и дискоидной красной волчанке. Наносят на подвергающиеся действию солнечных лучей участки кожи при выходе больных на улицу в солнечную погоду. Нежелательно применение в холодное время года.

ФЕНОБАРБИТАЛ (Phenobarbitalum). Синонимы: Luminal, Barbital, Dorminal. Оказывает успокаивающее, снотворное и выраженное противосудорожное действие. Применяют при бессоннице, повышенной возбудимости нервной системы, эпилепсии, хорее, спастических параличах, начальной стадии гипертонической болезни (в сочетании со спазмолитическими средствами). Внутрь как снотворное и седативное средство по 0,01-0,05 г 2-3 раза в день; при эпилепсии по 0,05 г 1 раз в сутки с постепенным повышением дозы на 0,025 г в день. Высшая разовая доза 0,3 г, суточная 0,6 г. Возможны головная боль, атаксия, при длительном применении при-

выкание. Противопоказан при заболеваниях печени и почек с нарушением функции.

ФЕНОБОЛИН (*Phenobolinum*). Синонимы: *Nerobolil, Durabolin*. Активный анаболический стероид пролонгированного действия, применяемый при нарушениях белкового обмена при астении, кахексии; заболеваниях, сопровождающихся потерей белка; межуточно-гипофизарной недостаточности; хронической недостаточности надпочечников, токсическом зобе, диабетических ангиопатиях (ретинопатия и нефропатия) при сахарном диабете, гипофизарном нанизме; хронической коронарной недостаточности; инфаркте миокарда; миокардите; ревматических поражениях сердца, атеросклеротическом кардиосклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; хронических заболеваниях почек, сопровождающихся потерей белка и азотемией; хронических заболеваниях легких; остеопорозе; замедленном образовании костной мозоли при больших переломах и пластических операциях на костях; миопатиях; прогрессирующих мышечных дистрофиях; боковом амиотрофическом склерозе; прогрессирующей миопатии; старческой дегенерации сетчатой оболочки глаза; экземе; псориазе, а также в качестве средства, улучшающего компенса-

торные и адаптационные процессы у лиц старческого возраста и т.д. В/м по 0,025-0,05 г в виде масляного раствора 1 раз в 7-10 дней. Детям из расчета 1-1,5 мг/кг в месяц, причем 1/3-1/4 этой дозы вводят соответственно через каждые 7-10 дней. Курс 1 1/2-2 мес. При необходимости лечение повторяют через месяц. Детям с церебрально-гипофизарным нанизмом препарат назначают в течение 1-2 лет. Противопоказан при раке предстательной железы.

ФЕНОКСИМЕТИЛПЕНИЦИЛЛИН

(Phenoxymethylpenicillinum). Синонимы: Fenoxypen, V-Penicillin и др. По антимикробному действию аналогичен другим препаратам бензилпенициллина. Применяют при заболеваниях, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами (пневмония, бронхит, ангина, инфекции мягких тканей, скарлатина, рожистое воспаление, гонорея и др. Внутрь (таблетки или суспензия) по 0,1-0,2 г за 1/2-1 ч до еды 4-6 раз в сутки; для детей в возрасте до 1 года суточная доза составляет 25-30 мг/кг, от 1 года до 6 лет - 15-30 мг/кг, от 6 до 12 лет - 10-20 мг/кг, старше 12 лет - 0,5-1 г. Возможны раздражение слизистой оболочки полости рта (стоматиты, фарингиты) и желудочно-кишечного тракта. Противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам пенициллина и заболевани-

...ях, сопровождающихся нарушением всасывания из желудочно-кишечного тракта.

ФЕНОЛФТАЛЕИН (Phenolphtaleinum). Синонимы: пурген, Purgyl. Применяют как слабительное при хронических запорах по 0,1-0,2 г на прием, детям по 0,05-0,2 г в зависимости от возраста. При длительном применении возможно раздражение почечной ткани.

ФЕНТОЛАМИН (Phentolamin). Синонимы: Dibasin, Regitine. α-Адреноблокатор. Расширяет периферические сосуды; несколько снижает АД; оказывает выраженное гипотензивное действие при феохромоцитоме. Применяют при нарушении периферического кровообращения (эндартериит, болезнь Рейно и др.); для предупреждения и лечения гипертонических кризов, для диагностики феохромоцитомы и в период операции по поводу ее удаления. При нарушении периферического кровообращения внутрь после еды по 0,05 г 3-4 раза в день (при необходимости дозу увеличивают до 0,1 г (взрослым) 3-5 раз в день. Курс 3-4 нед. Возможны тахикардия, головокружение, тошнота, рвота, понос, набухание слизистой оболочки носа, гиперемия и зуд ко-

жи; ортостатический коллапс. Противопоказан при тяжелых органических поражениях сердечно-сосудистой системы.

ФЕНХЕЛЯ ПЛОДЫ (Fructus Foeniculi). Укроп аптечный. Содержит 3-6% эфирного масла, в котором до 60% анетола, жирное масло, белковые вещества. Наравне с укропом аптечным используют плоды укропа огородного (Fructus Anethi graveolentis). Применяют в качестве ветрогонного средства при метеоризме в виде укропной воды (1 часть укропного масла на 1000 частей воды) по 1 ст. л. 3-6 раз в день и как отхаркивающее при бронхите в виде настоя (10,0:200,0) по 1 ст. л. 3-4 раза в день.

ФЕПРАНОН (Phepranonum). Синонимы: Amfepramonum, Parabolin. Анорексигенное средство. Применяют при различных формах ожирения (в том числе экзогенное); адипозогенитальной дистрофии и гипотиреозе (в комплексе с другими препаратами). Внутрь за 30 мин до еды по 0,025 г 2-3 раза в день (при необходимости дозу увеличивают до 0,1 г/сут) в течение 1 1/2-2 1/2 мес. Возможны сухость во рту, тошнота, диарея, запор, бессонница, раздражительность. Во избежание нарушения сна не следует назначать препарат во второй половине дня.

...тический коллапс. ...зан при тяжелых ор... ...ражениях сердечно-со... ...мы.

ПЛОДЫ ... аптечный (Fructus ...). Содержит 3-... ...сла, в котором до 60% ...масло, белковые веще... ...укропом аптечным ис... укропа огородного ...aveolentis). Применя... ...етрогонного средства ...виде укропной воды ...о масла на 1000 час... ...л. 3-6 раз в день и ...ее при бронхите в ...200,0) по 1 ст. л. 3-4

...hepranonum). Сино... ...Parabolin. Анорек... ...Применяют при раз... ...ения (в том числе эк... ...итальной дистрофии ...нексе с другими пре... 30 мин до еды по ... (при необходимости ... 1 г/сут) в течение 1 ...ны сухость во рту, ...бессонница, раз... ...бежание наруше... ...начать препарат ...ы.

ФЕПРОМАРОН (Phepromaronum). Антикоагулянт непрямого действия. Применяют в тех же случаях, что и неодикумарин. Назначают внутрь в первые дни по 0,03-0,05 г/сут, затем 0,01-0,005 г 1 раз в день или через день. Побочное действие и противопоказания те же, что и для неодикумарина.

ФЕРАКРИЛ (Feracrylum). Гемостатик местного значения. Обладает бактерицидной и бактериостатической активностью в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микробов, дает местный обезболивающий эффект. Применяют в качестве наружного гемостатического средства у взрослых и детей, включая больных с нарушением свертывающей системы крови. Не нарушая стерильность, 1% раствором смачивают марлевые или ватные тампоны и, слегка отжав, прикладывают их к предварительно осушенной поверхности. Для остановки кровотечения после экстракции зуба тампон, смоченный раствором, прижимают к кровоточащему месту в течение 5-10 мин. Нельзя применять одновременно с эпсилонаминокапроновой кислотой.

ФЕРАМИД (Ferramidum). Комплексное соединение железа хлорида с никотинамидом. Стимулятор функции кроветворных органов. Применяют при по-

геморрагических анемиях, железодефицитных анемиях различного происхождения. Внутрь (после еды), взрослым по 0,1 г 3 раза в день; детям до 1 года - по 0,01 г 2 раза в день, от 1 года до 3 лет - по 0,02 г 2-3 раза в день; от 3 до 7 лет - по 0,02 г 3-4 раза в день. Курс 3-4 нед. Возможны запоры.

ФЕРБИТОЛ (Ferbitolum). Водный раствор железо-сорбитолового комплекса, содержащий 4,5-5% железа. Оказывает противоанемическое действие. Применяют при гипохромной железодефицитной анемии различной этиологии (постгеморрагическая, гастрогенная, агастральная, анентеральная, хлороз и др.), особенно при плохой переносимости препаратов железа, применяемых внутрь. Детям при железодефицитной анемии, связанной с дефектами вскармливания, алиментарно-инфекционными заболеваниями, а также при анемии у недоношенных. В/м взрослым ежедневно по 2 мл. Курс 15-25 инъекций в зависимости от тяжести анемии. Детям до 2 лет - по 0,5-1 мл, старше 2 лет - 1-2 мл. При болезненности в месте инъекции препарат вводят с раствором новокаина. Возможна тошнота. Противопоказан при острых и хронических заболеваниях печени, гемохроматозе.

ФЕРЕЗОЛ (Pheresolum). Гомогенная смесь, состоящая из 60% фенола и 40%

трикрезола. Обладает прижигающими и бактерицидными свойствами. При контакте с тканями организма препарат вызывает химический ожог. Применяют при папилломах, остроконечных кондиломах кожи, кератомах, бородавках, сухих мозолях. Используют только в лечебных учреждениях (наружно). Наносят точно на обрабатываемый участок, не допуская попадания на соседние участки и особенно на слизистые оболочки. Папилломы, бородавки, кондиломы смазывают препаратом непрерывно 10-60 мин (в зависимости от их размеров). У папиллом, имеющих тонкую ножку, смазывают только ножку. Повторную обработку проводят через 6-8 дней после отпадения струпа. Бородавки на кистях, кератомы, сухие мозоли с ороговением предварительно размягчают распариванием, а затем смазывают ферезолом непрерывно в течение часа. При необходимости через 2 нед непрерывно в течение часа. При необходимости через 2 нед указанную процедуру можно повторить. Допускается проведение 4-5 процедур. Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки, особенно на слизистую оболочку глаза. Не бинтовать участки, обработанные препаратом, и не удалять струпа; не наносить повторно препарат раньше сроков, указанных выше. Одежда из синтети-

ческих тканей не должна прикасаться к участку кожи, обработанному препаратом. Обработанный участок кожи высушить на воздухе во избежание явлений дерматита, его нельзя смазывать какими-либо мазями, мытье водой допустимо. При правильном применении препарат не оставляет рубцов. Обработка очагов вблизи глаза может вызвать отек клетчатки, который проходит самостоятельно. Противопоказан при невусах; не наносить на поверхность кожи площадью свыше 20 см^2.

"ФЕРРОКАЛЬ" ("Ferrocalum"). Состав: железа закисного сульфата 0,2 г, кальция фруктозодифосфата 0,1 г, лецитина 0,02 г. Применяют при различных формах вторичного малокровия (гипохромных анемиях), астении после инфекционных заболеваний и др. Внутрь по 2-6 табл. 3 раза в день.

"ФЕРРОПЛЕКС" ("Ferroplexum"). Состав одного драже: аскорбиновой кислоты 30 мг, сульфата железа 50 мг. Стимулирует гемопоэз. Применяют при различных формах железодефицитной анемии. Внутрь взрослым по 1-2 драже 3 раза в день, детям - по 1 драже 3 раза в день.

"ФЕРРОЦЕРОН" ("Ferroceronum"). Синоним: эритростимулин. Стимулирует

процессы кроветворения. [illegible] в комплексе с другими сти[illegible] [illegible]ми кроветворения для про[illegible] и лечения гипохромной же[illegible]цитной анемии, при [illegible] по 0,3 г 3 раза в день чер[illegible] [illegible]мия после еды в течение [illegible] Наблюдается окрашивание [illegible] красноватый цвет; в первые [illegible]чения возможна тошнота.

ФЕРРУМ ЛЕК (Ferrum Lek). Одна ампула для в/м введения (2 мл) содержит 100 мг железа в виде ферри-полиизомальтозата; одна ампула для в/в введения (5 мл) содержит 100 мг железа в виде ферри-сахарата. Способствует быстрому восстановлению железа при недостатке его в организме. Применяют при железодефицитных анемиях различной этиологии. Глубоко в/м через день по 2 мл. Максимальная суточная доза при в/м введении для взрослых - 4 мл, для детей с массой тела до 5 кг - 0,5 мл, детям с массой тела 5-10 кг - 1 мл. В/в взрослым - в 1-й день 2,5 мл (1/2 ампулы), на 2-й день - 5 мл (1 ампула) и 3-й - 10 мл (2 ампулы), далее 2 раза в неделю по 10 мл. После первой инъекции рекомендуется наблюдать за больными с целью выявления реакции на препарат. Противопоказан при гемохроматозе и гемосидерозе, а также анемиях, не связанных с дефицитом железа.

ФЕСТАЛ (Festal). Препарат стандартизованных панкреатических ферментов (липаза, амилаза, протеаза), гемицеллюлозы и высушенной бычьей желчи. Способствует расщеплению и усвоению продуктов, содержащих жиры, белки, углеводы и растительные балластные вещества (гемицеллюлозу). Применяют при относительной или абсолютной секреторной недостаточности поджелудочной железы различной этиологии, метеоризме вследствие холецистита, аэрации кишечника перед рентгенограммой; гастроинтестинальных расстройствах в результате лечения парааминосалициловой кислотой и антибиотиками с широким спектром действия; повреждениях жевательного аппарата; недостаточности пищеварения в преклонном возрасте. Внутрь по 1-2 драже во время или после еды 3 раза в день.

ФЕТАНОЛ (Phethanolum). Синонимы: этиладрионол, эффортил и др. Повышает АД в меньшей степени, чем мезатон, но на более длительный срок. Применяют при гипотониях различного происхождения, шоке, коллапсе. Внутрь по 5 мг 2-3 раза в день при необходимости в течение нескольких недель. Парентерально: по 1 мл 1% раствора под кожу, в/м или медленно в/в. Можно вводить в/в капельно в 5% растворе глюкозы или в изотоническом растворе хлорида на-

(Festal). Препарат стан-
панкреатических фер-
амилаза, протеаза), ге-
высушенной бычьей
вует расщеплению и ус-
ов, содержащих жиры,
растительные балласт-
мицеллюлозу). Приме-
ельной или абсолютной
статочности поджелу-
личной этиологии, ме-
не холецистита, аэра-
ред рентгенограммой;
ых расстройствах в
парааминосалицило-
ибиотиками с широ-
твия; повреждениях
ата; недостаточности
еклонном возрасте.
во время или после

hanolum). Синони-
фортил и др. Повы-
степени, чем меза-
ельный срок. При-
х различного про-
лапсе. Внутрь по 5
необходимости в
едель. Паренте-
створа под кожу,
Можно вводить
оре глюкозы или
ре хлорида на-

рия (из расчета 1 мл 1% раствора фетанола на 100 мл раствора; всего вводят до 300 мл, т.е. 30 мг препарата). При быстром в/в введении головная боль. Противопоказан при выраженном атеросклерозе, гипертонической болезни (за исключением случаев коллапса). Необходима особая осторожность при склонности к ангиоспазмам.

ФЕТИМИН · (Fetimin). Синоним: нафтифин. Обладает фунгицидным действием в отношении дерматофитов и фунгистатическим действием в отношении условно-патогенных грибов. Применяют при поверхностных и более глубоких грибковых поражениях кожи, волосистой части головы и ногтей, вызванной дерматофитами или грибками молочнице. Крем наносится тонким слоем, а затем осторожно втирается в пораженный участок кожи и в здоровые пограничные участки. При лечении онихомикоза рекомендуется наносить препарат дважды в день, закрывая пораженный ноготь глухой повязкой. Терапия длится 2 нед после исчезновения симптомов заболевания. Лечение дерматофитоза обычно длится 2-4 нед, а в тяжелых случаях до 8 нед. При кожных инфекциях, вызванных Candida spp., курс 4 нед, при питириазе - 2 нед, при онихомикозе - до 6 мес. Возможны незначительное жжение, а также сухость обрабатываемых участков кожи.

ФИАЛКИ ТРАВА (Herba Violae). Трава фиалки трехцветной (анютины глазки, Иван-да-Марья) (Viola tricolor L.). Содержит гликозид, отщепляющий метиловый эфир салициловой кислоты; флавоноиды (рутин, виолокверцитин); антоциановый гликозид виоланин; аскорбиновую кислоту; сапонины. Применяют в качестве отхаркивающего средства при бронхите в виде настоя (10,0:100,0) по 1 ст. л. 3 раза в день. •

ФИБРИНОЛИЗИН (Fibrinolysinum). Сухой белковый препарат естественного фермента, выделенного из плазмы донорской крови. Аналог - Actase, Thrombolysin. Способен растворять нити фибрина. Применяют при тромбоэмболии легочной и периферических артерий, тромбоэмболии сосудов мозга, свежем инфаркте миокарда, остром тромбофлебите, обострении хронического тромбофлебита. В/в (капельно) в изотоническом растворе хлорида натрия (100-160 ЕД препарата в 1 мл раствора) с добавлением гепарина (до 20 000 - 40 000 ЕД). Возможны неспецифические реакции на белок (гиперемия лица, боль по ходу вены, боль за грудиной и в животе, озноб, повышение температуры тела, крапивница и др.). Противопоказан при геморрагических диатезах, кровотечениях, открытых ранах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной

кишки, нефрите, фибриногенопении, туберкулезе (острая форма), лучевой болезни.

ФИБС (Fibs). Препарат, получаемый из отгона лиманной грязи; содержит коричную кислоту и кумарины. Биогенный стимулятор. Применяют при блефарите, конъюнктивите, кератите, помутнении стекловидного тела, миопическом хориоретините, артритах, радикулитах, миалгиях и др. Подкожно по 1 мл ежедневно в течение 30-35 дней. Противопоказания те же, что и для применения торфота.

ФИНОПТИН (Finoptin). Синонимы: Isoptin, Verpamil. Расширяет коронарные сосуды и увеличивает коронарный кровоток. Оказывает также антиаритмическое, натрийуретическое и диуретическое действие. Применяют при коронарной недостаточности, пароксизмальной экстрасистолии, постинфарктном периоде; для профилактики инфаркта миокарда. Внутрь по 0,04-0,08 г 3 раза в день, в/в (медленно) по 2-4 мл 0,25% раствора 1-3 раза в день. Возможны тошнота, головокружение. Противопоказан при кардиогенном шоке, нарушениях атриовентрикулярной проводимости. Не следует комбинировать с β-адреноблокаторами, особенно у больных с синдромом слабости синусового узла.

ФИТИН (Phytinum). Смесь кальциевых и магниевых солей различных инозитфосфорных кислот, в основном инозитгексафосфорной кислоты. Стимулирует кроветворение, усиливает рост и развитие костной ткани, улучшает деятельность нервной системы при заболеваниях, связанных с недостатком фосфора в организме. Применяют при заболеваниях нервной системы, гипотонии, истерии, неврастении, упадке питания, рахите, остеомаляции, диатезах и др. Внутрь по 0,25-0,5 г 3 раза в день в течение 6-8 нед; детям в зависимости от возраста по 0,05-0,5 г на прием.

ФИТОЛИЗИН (травяная паста) (Phytolysinum). Смесь водных травяных экстрактов и эфирного масла, содержащая производные флавоны, инозит, силикаты, сапонины, цинеол, борнеол, терпинеол, камфен и др. Оказывает мочегонное, противовоспалительное, болеутоляющее и бактериостатическое действие, а также облегчает разрыхление и удаление мочевых конкрементов. Применяют при воспалении мочевыводящих путей, почек, почечных лоханок и мочевого пузыря. Растворяют 1 ч. л. пасты в 1/2 стакана теплой сладкой воды. Принимают 3-4 раза в день после еды.

ФИТОМЕНАДИОН (Phytomenadionum). Обладает коагуляционной и

антигеморрагической активностью. Эффективен при алиментарной К-витаминной недостаточности. С лечебной целью применяют при геморрагическом синдроме с гипопротромбинемией, вызванном нарушением функции печени (гепатиты, циррозы печени) и некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колит и др.); при геморрагиях, связанных с применением (передозировкой, индивидуальной повышенной чувствительностью) антикоагулянтов непрямого действия (кумаринового и индандионового ряда), антибиотиков, салицилатов, сульфаниламидов, транквилизаторов; с профилактической целью перед тяжелыми операциями для уменьшения кровоточивости. Внутрь через 30 мин после еды по 0,01-0,02 г 3-4 раза в день (в отдельных случаях до 6 раз в день). Дозы и длительность курса лечения индивидуальны и зависят от показателей гемокоагуляции. При передозировке препаратов, перечисленных выше, курс лечения от 2 до 5 дней (реже до 10 дней), при заболеваниях печени и желудочно-кишечного тракта - от 7 до 25 дней. При профилактическом применении по 0,03 г/сут в течение 3-4 дней перед операцией.

"ФИТОФЕРРОЛАКТОЛ" ("Phytoferrolactolum"). Состав: фитина 0,2 г, же-

леза лактата 0,2 г. Применяют при заболеваниях, связанных с истощением нервной системы, анемии, общем упадке питания по 1 табл. 3 раза в день.

ФЛАВИНАТ (Flavinatum). Уменьшает или устраняет гипо- и авитаминоз B2. Гипо- и авитаминоз B2, абиотрофические и дистрофические процессы в сетчатой оболочке глаза, глаукома, кожная печеночная форма порфирии, псориаз, себорея, стрептодермии, хронические заболевания печени, поджелудочной железы и кишечника, длительная лекарственная тепария. При офтальмологических заболевания под конъюнктиву глаза по 0,0006 г флавината (0,3 мл 0,2% раствора) через день; на курс назначают 10-15 инъекций. При глаукоме вводят в/м по 0,002 г ежедневно в течение 10 дней. При порфирии в/м по 0,002 г 3 раза в день в течение месяца. При кожных заболеваниях, заболеваниях печени, поджелудочной железы и кишечника по 0,002 г 1-2 раза в сутки, при циррозах печени- по 0,001 г ежедневно или через день. Детям- по 0,001-0,002 г/сут. Курс - 5-40 дней. При длительной лекарственной терапии флавинат вводят в/м по 0,001-0,002 г 1 раз в день ежедневно в течение всего курса. При введении раствора флавина под конъюнктиву глаза возможны головная боль, головокружение, слезотечение.

"ФЛАКАРБИН" [illegible]
(Flacarbinum granulae). Комби[illegible] препарат, каждые 100 г которого содержат ликуразида и кверцетина по [illegible] натрия карбоксиметилцеллюлозы [illegible] пектина по 10 г, глюкозы 75 г. [illegible] противовоспалительное и спазмолитическое действие, обладает капилляроукрепляющей и послабляющей активностью. Применяют при язвенной болезни [illegible] и двенадцатиперстной кишки. Внутрь по 1/2 ч. л. 3 раза в день перед едой. Запивают теплой водой (1/3-1/2 стакана). Курс 3-4 нед.

ФЛАКУМИН (Flacuminum). Сумма флавоноловых агликонов, получаемая из листев скумпии (Cotinus coggygria scop.). Обладает желчегонным свойством, оказывая спазмолитическое действие на желчные пути и способствуя выделению желчи из желчного пузыря. Применяют в качестве желчегонного средства при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, особенно при их дискинезии. Внутрь по 0,02-0,04 г (1-2 табл.) за 30 мин до еды 2-3 раза в день. Курс 3-4 нед. Противопоказан при остром гепатите, острой и подострой дистрофии печени, обтурационной желтухе.

ФЛАМИН (flaminum). Сумма флавонов бессмертника песчаного (Helichrysum arenarium; DS). Применяют внутрь как

[illegible]елчегонное средство при хронических гепатохолециститах и холециститах по 0,05 г 3 раза в день за 30 мин до еды с небольшим количеством воды в течение 10-40 дней.

ФЛОВЕРИН (Phloverinum). Природ[illegible]смесь дигидросамидина и виснадина, [illegible]енная из корней вздутоплодника [illegible]рского (Phlogodicarpus sibiricus). Об[illegible] спазмолитическими свойствами. [illegible]ют взрослым как спазмолитическое средство при спазмах периферических сосудов, спастических форм[illegible] [illegible]артериита, болезни Рейно и [illegible] формах хронической коронарной недостаточности. Внутрь после [illegible] 2 табл. 2-3 раза в день. Курс 3-[illegible]. При необходимости через 1-2 [illegible] курс можно повторить. Возможно [illegible]временное [illegible] головокружение, проходящее после отмены препарата. Противопоказан при гипотонии, метеоризме и наклонности к атоническим запорам.

ФЛОРЕНАЛЕВАЯ МАЗЬ (Unguentum Florenali). Оказывает нейтрализующее действие в отношении вируса Herpes simplex, Herpes zoster. Применяют при вирусных заболеваниях глаз. При вирусном кератоконъюнктивите и кератите, вызванном вирусом простого герпеса и Herpes zoster, закладывают за веки 0,5% мазь вначале 3 раза в день, а затем 1-2

раза в день. Длительность лечения при поверхностных конъюнктивитах 10-14 дней, при глубоких - 1-1 1/2 мес. При отсутствии эффекта в течение 10 дней рекомендуются другие методы лечения. Возможно быстро исчезающее чувство жжения. При развитии дерматоза мазь отменяют.

ФЛОРИМИЦИНА СУЛЬФАТ (Florimycini sulfas). Антибиотик, продуцируемый Streptomyces floridae, Streptomyces puniceus, Streptomyces vinaceus. Синонимы: Viomycinum sulfuricum, Geliomycin, Viocin. Обладает антибактериальной активностью в отношении микобактерий туберкулеза. Применяют при различных формах и локализациях туберкулеза, преимущественно в случаях устойчивости возбудителя к противотуберкулезным препаратам I ряда. В/м по 500 000 ЕД (0,5 г) 2 раза в день в течение 6 дней, на 7-й день перерыв. Лечение длительное. Суточная доза для взрослых 1 г, детям 0,015-0,02 г/кг (но не более 0,75 г). Возможны нейро- и нефротоксичность и нарушение электролитного баланса. Противопоказан при поражениях VIII пары черепных нервов, нарушении функции почек, не сочетать с канамицином, мономицином и неомицином.

"ФОГЕМ" ("Fogenum"). Линимент состава: гемин - 0,1 г, диметилсульфоксид (ДМСО) - 60 г, кальция стеарат - 20

г, вода дистиллированная - 20 г. Обладает фотозащитной активностью. Применяют в качестве лечебного и профилактического средства при фотодерматозах (дискоидная красная волчанка, солнечная экзема, солнечная почесуха), связанных с нарушением порфиринового обмена. Наносят на предварительно вымытую кожу, равномерно и быстро втирая. При поражениях лица наносят на всю поверхность, при других локализациях - только на пораженные участки кожи. В течение 1-й недели следует втирать в кожу 0,1-0,2 г 3 раза в день; в течение 2-й недели применяют в тех же дозах 1-2 раза в день, далее - в поддерживающей дозе - 0,1 г 1 раз в 2-3 дня. Контролем служит степень пигментации кожи лица. При необходимости можно применять в указанных выше дозах 2-3 раза в день в течение 3-4 нед. Для профилактики обострения болезни фогем применяют 2-3 раза в неделю в течение всего весенне-летнего периода. Иногда местно ощущается жжение и слабый металлический привкус во рту, исчезающий через несколько минут после применения. При передозировке интенсивность и длительность ощущения жжения возрастают в зависимости от степени передозировки. При недостаточно тщательном втирании линимента после его всасывания на поверхности кожи могут появиться белесые пятна, которые

легко удаляются с поверхности кожи ватным тампоном.

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (Acidum folicum). Синонимы: фолацин, витамин Bc. Недостаток фолиевой кислоты нарушает нормальное кроветворение, задерживает превращение мегалобластических форм эритроцитов в нормобластические. Вместе с цианокобаламином стимулирует эритропоэз. Участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, пуриновых и пиримидиновых оснований. Применяют при мегалобластической анемии у беременных; алиментарной макроцитарной анемии у взрослых и у детей; спру; макроцитарной анемии после резекции желудка; анемии при хроническом алкоголизме; лейкопениях при ионизирующем облучении, рентгенотерапии, приеме сульфаниламидов. Внутрь взрослым по 0,0005-0,001 г (0,5-1 мг) 1-2 раза в день. Детям - соответственно возрасту. Курс - 20 дней. Возможны аллергические реакции, крапивница.

ФОЛЛИКУЛИН (Folliculinum). Естественный фолликулярный гормон. Синонимы: Estrone, Folestrin. Оказывает специфическое эстрогенное действие. Применяют при заболеваниях, сопровождающихся недостаточной функцией яичников, кожных болезнях (угри, вирильный гипертрихоз и др.) В/м 5000 - 20 000

ЕД; при кожных заболеваниях наружно. При длительном применении возможны маточные кровотечения. Противопоказан при новообразованиях половых органов, молочных желез и других органов, женщин в возрасте до 60 лет), мастопатии, эндометрите, склонности к маточным кровотечениям, в гиперэстрогенной фазе климакса.

ФОПУРИН (Phopurinum). Обладает противоопухолевой активностью и, в частности, способен быстро подавлять лейкозный процесс. Применяют при остром лейкозе, хроническом миелолейкозе, кожных "ретикулезах" (кожных проявлениях гемобластозов) и ретинобластоме. Вводят в/в или в/м. Растворяют в изотоническом растворе хлорида натрия, воде для инъекций или 0,5% растворе новокаина - при внутримышечном введении. В момент в/в введения препарата и в течение 1-1 1/2 ч после него больной должен находиться в горизонтальном положении (возможность ортостатической гипотонии). При остром лейкозе вводят ежедневно по 40-120 мг в зависимости от переносимости. Начинают с 40 мг и при хорошей переносимости дозу увеличивают до 60, 80, 100 или 120 мг (обычно 1,2-1,5 мг/кг). Курсовая доза составляет 1-3 г. Детям с острым лейкозом назначают по 5-30 мг 1 раз в сутки. В течение курса лечения производят 20-40 инъекций (500-

700 мг препарата). При кожных "ретикулезах" назначают ежедневно, в нарастающих дозах - 20, 40, 60, 80, 100 и [illegible]) мг (в/м введение допустимо только до [illegible] мг; введение препарата в более высоких дозах сопровождается болезненностью в месте инъекций). Курсовая доза 1-3 г. При ретинобластоме вводят в/м 1 раз в день в первоначальной суточной дозе 5 мг/кг в течение 5 дней. В дальнейшем при хорошей переносимости дозу увеличивают каждые 5 дней на 5 мг, но не более чем до 40 мг на инъекцию. В течение курса производят 10-60 инъекций. В случае необходимости повторные курсы лечения. Возможны головокружение, умеренная головная боль, головокружение, умеренные диспептические явления, сонливость, ощущение жжения, тяжести и тепла в конечностях, чувство опьянения, онемения кожи в области спины, аллергические явления, ортостатическая гипотония. При повышенной чувствительности больных или при передозировке возможно угнетение кроветворения (лейкопения, тромбоцитопения). В этом случае проводят соответствующее мероприятия, направленные на стимуляцию гемопоэза. Противопоказан при заболеваниях печени и почек с нарушением их функции, резко выраженных лейкопениях и тромбоцитопении, в терминальном состоянии у больных.

ФОРМАЛИН (Formalinum). 40% раствор формальдегида. Дезинфицирующее и дезодорирующее средство. Применяют для мытья рук и обмывания кожи при повышенной потливости (0,5-1% растворы), спринцеваний (1:2000 - 1:3000), дезинфекции инструментов (0,5% раствор).

ФОРМИДРОН (Formidronum). Состав: формалина 10 частей, спирта этилового 96% 40 частей, воды 50 частей, одеколона 0,5 части. Применяют наружно при повышенной потливости.

ФОСФАДЕН (Phosphadenum). Синоним: Adenyl. Обладает антиагрегационными свойствами, вследствии чего улучшает макро- и микроциркуляцию. Усиливает трофику тканей и процессы регенерации, оказывает сосудорасширяющее действие. Применяют при острой перемежающейся порфирии и свинцовом отравлении с выраженным полиневритическим синдромом; различных сосудистых заболеваниях конечностей; острой артериальной непроходимости; в пред- и послеоперационные периоды венэктомии; при хронических облитерирующих заболеваниях артерий конечностей, тромбофлебите, хронической венозной недостаточности, вторичных сосудистых синдромах; послеожоговых осложнениях, гепатоцеребральных дистрофиях и других на-

следственных заболеваниях ЦНС; в комплексной терапии некоторых заболеваний печени, сердца; при остром радикулите; астеническом синдроме. Применяют внутрь, динатриевую соль фосфадена - в/м. При порфирии и сосудистых заболеваниях конечностей лечение начинают с введения динатриевой соли фосфадена в/м по 0,04-0,06 г 2-5 раз в день, далее курс инъекций сокращают и переходят к приему фосфадена внутрь по 0,05 г 2-3 раза в день. При других заболеваниях фосфаден назначают внутрь по 0,025-0,05 г 2 раза в день. Возможны головокружение, тошнота, тахикардия, аллергические реакции.

ФОСФАКОЛ (Phosphacolum). Синонимы: Mintacol, Soluglaucit. Обладает выраженной антихолинэстеразной активностью. Применяют при глаукоме, в качестве миотического средства. В виде глазных капель 0,013% раствора по 2 капли 2 раза в день. Возможны боль в глазу, подергивание век, гиперемия слизистой оболочки глаз, головная боль.

ФОСФАЛЮГЕЛЬ (Phosphalugel). Состав: гель фосфата алюминия в форме гидрофильных коллоидных мицелл 8,8 г, гель пептина и агар-агара с корригирующим веществом до 16 г, консерванты - сорбиновая кислота, метил- и пропил-па-

ра-оксибензоат, отдушка - натуральная апельсиновая эссенция до 16 г. Обладает буферно-антацидным, обволакивающим, адсорбирующим, антипептическим свойством. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колите, диверкулитах кишечника, сигмоидите, отравлении кислотами, щелочами, ядами и др. Внутрь за 30 мин до еды по 1-2 пакета 2-3 раза в день. При язвенной болезни, сопровождающейся сильной болью или кровотечением, назначают по 1 пакету через каждые 2 ч, после ослабления острых симптомов - 1-2 пакета 3 раза в день. Курс (15-30 дней) при необходимости повторяют.

ФОСФОТИАМИН (Phosphothiaminum). Монофосфорный эфир тиамина фосфата. Относится к витамину B1 и применяется в тех же случаях и дозах, что и тиамина бромид.

ФОСФЭСТРОЛ (Phosphoestrolum). Синонимы: Cytonal, Fosfostilben, Honvan. Оказывает противоопухолевое действие при раке предстательной железы. Лечение начинают с в/в введения (медленно, иногда капельно) 0,15 г препарата (2,5 мл 6% раствора фосфэстрола); при хорошей переносимости дозу увеличивают до 0,3 г (5 мл 6% раствора) в течение 20-25 дней. Затем 2-3 мес проводят поддерживающую терапию; внутрь по 0,1 г препа-

рата 2-3 раза в день или в/в по 0,3 г (2,5 мл 6% раствора) 1-2 раза в неделю. Длительность лечения зависит от течения заболевания; по получении стойкого эффекта рекомендуется длительная поддерживающая терапия (внутрь по 0,3-0,6 г 1-2 раза в неделю). Одним из биохимических показателей действия препарата является понижение фосфатазной активности сыворотки крови. В начале лечения иногда отмечаются тошнота, рвота, ухудшение общего состояния; эти явления исчезают в процессе дальнейшего лечения. Возможны также неприятные ощущения (чаще зуд или боль) в анальной и генитальной областях, реже в области лица и шеи. Иногда при быстром введении препарата возникает боль в области метастатических узлов, возможны понижение свертываемости крови и геморрагический диатез; незначительная феминизация. Противопоказан при пониженной свертываемости крови, наклонности к геморрагиям.

ФОТРИН (Photrinum). Обладает противоопухолевой активностью, вызывает (противолейкозной) ремиссии при хроническом лимфолейкозе, эритремии, гемодермиях, раке яичника и некоторых других опухолях. Применяют при хроническом лимфолейкозе (умеренная анемия и тромбоцитопения не являются противопоказаниями к назначению препарата); эритремии, включая ее радиореф-

рактерные формы, грибовидном микозе, первичном "ретикулезе" кожи, ретикулосаркоматозе, саркоме идиопатической множественной геморрагической (ангиоретикулез Капоши), раке яичников. В/в, в/м и внутрибрюшинно (в изотоническом растворе натрия хлорида). Вводят по 5-40 мг ежедневно или через 1-2 дня. В зависимости от характера заболевания, эффективности лечения и переносимости препарата на курс требуется 80-310 мг фотрина. Возможно угнетение кроветворения. У некоторых больных ухудшается аппетит, наблюдаются легкая тошнота, головная боль. Противопоказан при тяжелых заболеваниях печени и почек неопухолевой природы, в терминальном состоянии у больных, а также резко выраженных лейкопении и тромбоцитопении.

ФРЕНОЛОН (Phrenolon). Синоним: Methophenazin. Нейролептическое средство с психостимулирующим и умеренно выраженным антипсихотическим действием. В малых дозах обладает транквилизирующими свойствами. Применяют при шизофрении с психомоторной заторможенностью, апатоабулическими расстройствами, отказом от еды; неврозах и неврозоподобных состояниях с тревогой, депрессией, вялостью, снижением аппетита. Внутрь и в/м по 0,005 г 2 раза в день с последующим повышением дозы

до 0,06 г. Возможны тошнота, головокружение, бессонница, отечность лица, экстрапирамидные расстройства. Противопоказан при тяжелых заболеваниях печени и почек, заболеваниях сердца с нарушением проводимости, эндокардите.

ФРИЗИУМ (Frisium). Синоним: клобазам. Транквилизатор, уменьшает напряженность, раздражение, возбуждение, агрессивность, позволяет добиться полной психической стабильности. Применяют при чувстве страха, напряжения, внутреннем беспокойстве, возбуждении, раздражительности, агрессивности, нервном истощении, нарушениях сна, головной боли, мигрени, функциональных нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и мочеполовых путей; как дополнительное средство при лечении антидепрессантами и нейролептиками, при кожных и ревматологических заболеваниях, до и после хирургических вмешательств. Обычно начинают с 20 мг в день, оптимальный эффект достигается при дозе 30 мг в день в течение 2-4 нед. Фризиум не следует назначать детям до 3 лет, кормящим матерям, в I триместре беременности, если для этого не существует прямых показаний. Может усиливать действие снотворных препаратов, транквилизаторов, антидепрессан-

тов типа имипрамина и спиртных напитков. Нельзя назначать водителям транспорта и лицам, работа которых требует концентрации внимания. В начале терапии может возникать чувство усталости, которое в дальнейшем проходит. В редких случаях наблюдается головокружение, сухость во рту или тремор пальцев рук. Противопоказан при миастении, повышенной чувствительности к препарату.

ФТАЗИН (Phthazinum). Сульфаниламид длительного действия. Применяют при дизентерии, гастроэнтерите, энтероколитах, колитах. Внутрь в 1-й день по 1 г 2 раза в день, в последующие 5-6 дней по 0,5 г 2 раза в день. Курсовая доза 7-8 г. Детям дозу уменьшают в соответствии с возрастом. В отдельных случаях возможны диспептические явления, аллергические реакции. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам.

ФТАЛАЗОЛ (Phthalazolum). Синоним: Phthalylsulfathiazolum, Sulfathalidine, Thalazol. Сульфаниламид, применяемый при дизентерии, колитах, гастроэнтеритах, операциях на кишечнике (для предупреждения гнойных осложнений). Внутрь по 1 г 4-6 раз в сутки в течение 5-7 дней. Детям дозу уменьшают соответственно возрасту. Вы-

…шие дозы для взрослых внутрь: разовая 2 г, суточная 7 г. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам.

ФТИВАЗИД (Phthivazidum). Синонимы: Ftivazidum, Vanizide. Обладает высокой бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза. Назначают внутрь по 0,5 г 2-3 раза в день, детям из расчета 0,03-0,04 г/(кг·сут) в 3 приема (но не более 1,5 г/сут). При туберкулезной волчанке 0,25-0,3 г 3-4 раза в день; на курс 40-60 г. Курс повторяют 2-3 раза с месячными перерывами. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 1 г, суточная 2 г. Переносится лучше, чем изониазид, но возможны те же побочные явления, что и при применении изониазида. Противопоказан при стенокардии, декомпенсации сердечно-сосудистой системы, органических заболеваниях ЦНС, заболеваниях почек нетуберкулезного характера, сопровождающихся нарушением выделительной функции.

ФТОРАФУР (Phthorafurum). По фармакологическим свойствам близок к 5-фторурацилу, но менее токсичен и несколько лучше переносится больными. Применяют при раке прямой и толстой кишки, раке желудка, раке молочной железы. В/в через каждые 12 ч по 1,2-2 г

(30 мг/кг). На курс лечения 30-40 г препарата, в отдельных случаях 50-60 г. Лечение проводят через 1 мес после предшествующего лучевого и химиотерапевтического лечения. В момент введения возможно головокружение. При длительном применении, введении больших доз и повышенной чувствительности больного развиваются тошнота, рвота, стоматит, диарея, лейкопения и тромбоцитопения. Противопоказан в терминальных стадиях болезни; при заболеваниях печени и почек; лейкопении (менее 3•10⁹/л) и тромбоцитопении (менее 100•10⁹/л).

ФТОРАЦИЗИН (Phthoracizinum). Усиливает и пролонгирует действие фенамина, устраняет каталепсию, вызванную нейролептиками, потенцирует наркотическое действие гексенала. Обладает также центральной и периферической м-холинолитической активностью. Применяют при депрессивных состояних различной этиологии (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, инволюционная депрессия, циклотимия, реактивные состояния и др.), в том числе сопровождающихся чувством тревоги, страха и напряженности. Эффективный корректор при нейролептической терапии. Внутрь по 0,025-0,05 г/сут с последующим увеличением до 0,075-0,2 г, в/м вводят по 2 мл 1,25% раствора 3-6 раз в день. Сухость во рту, нарушение ак-

На курс лечения 30-40 г пре-
... отдельных случаях 50-60 г. Ле-
... дят через 1 час после при-
... лучевого и химиотерапев-
... лечения. В момент введе-
... головокружение. При длитель-
... лечении, введении больших доз
... ной чувствительности боль-
... ется тошнота, рвота, стоматит,
... копения и тромбоцитопения
... показан в терминальных стадиях
... при заболеваниях печени и по-
... копении (менее $3 \cdot 10^9$/л) и тромбо-
... пении (менее $100 \cdot 10^9$/л).

... РАЦИЗИН (Phthoracizinum)
... и пролонгирует действие фе-
... страняет каталепсию, вызван-
... лептиками, потенцирует нар-
... действие гексенала. Обладает
... ральной и периферической
... ческой активностью. Приме-
... депрессивных состояниях раз-
... логии (шизофрения, маниа-
... сивный психоз, инволюцион-
... прессия, циклотимия,
... стояния и др.), в том числе
... ихся чувством тревоги,
... женности. Эффективный
... нейролептической тера-
... 0,025-0,05 г/сут с после-
... нием до 0,075-0,2 г, в/м
... 25% раствора 3-6 раз
... рту, нарушение ак-

комодации, задержка мочеиспускания, тошнота, боль в мышцах. Противопоказан при глаукоме, аденоме предстательной железы, атонии мочевого пузыря.

ФТОРОКОРТ (Phthorocort...). Оказывает антиаллергическое, [illegible] и противозудное действие. Применяют при экземе, [illegible] аллергических кожных заболеваниях, ограниченном псориазе и др. [illegible] в виде 0,1% мази.

ФТОРОТАН (Phthorothanum). Синоним: Narcotan. Мощное наркотическое средство, применяемое для [illegible] наркоза при различных хирургических вмешательствах, диагностических исследованиях и в стоматологии. В смеси с кислородом или закисью азота и кислорода с помощью наркозных аппаратов (для вводного наркоза 3-4 об.% во вдыхаемой газовой смеси, для поддержания хирургической стадии 0,5-1,5 об.%). После длительного наркоза возможна небольшая гипотермия, при передозировке гипотония, брадикардия вплоть до фибрилляции желудочков сердца; иногда тошнота, рвота, головная боль. Противопоказан при феохромоцитоме, выраженном гипертиреозе, повышением содержания адреналина в крови. Необходима осторожность при нарушении функции печени, гипотонии, аритмиях.

ФТОРУРАЦИЛ (Phthoruracilum). Синоним: Fluorouracilum. Относится к группе антиметаболитов нуклеинового обмена. В отличие от многих противоопухолевых препаратов эффективен при опухолях желудочно-кишечного тракта. Токсичен, особенно сильно угнетает функции костного мозга и желудочно-кишечного тракта. Применяют при иноперабельных формах, рецидивах и метастазах рака желудка, опухолях различных отделов толстой кишки и поджелудочной железы. В/в (медленно) ежедневно по 10-15 мг/кг в день до появления побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта (понос, рвота и др.). Иногда препарат вводят в тех же дозах ежедневно в течение 4 дней и при отсутствии побочных реакций через день: на 6-й, 8-й, 10-й и 12-й день по 5-7,5 мг/кг. Курс 12 дней (3-7 г), суточная доза не более 1 г. При хорошей переносимости через 4-6 нед курс лечения повторяют. Возможна лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, понос, язвенный стоматит, язвенные поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, алопеция. Противопоказан в терминальных стадиях заболевания при кахексии, лейкопении, тромбоцитопении, тяжелых поражениях печени и почек. Не следует вводить препарат ранее чем через 3-4 нед после сложных

хирургических вмешательств и ранее чем через 1 мес после лучевой [illegible] и лечения другими противоопу[illegible]ыми препаратами, а также при о[illegible]ых метастазах в костный мозг.

ФУБРОМЕГАН [illegible] [illegible]anum). Обладает выраженным [illegible] н- и м-холинолитическим [illegible]ческим [illegible]. Прерывает проведение [illegible] [illegible]ством. [illegible]сов на уровне межне[illegible] [illegible]х импуль- [illegible] [illegible]апсов. Применяют при язвенной [illegible] желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астме и ряде других заболеваний, сопровождающихся спастическим состоянием гладких мышц (печеночная, почечная и кишечная колика); спазмах коронарных сосудов. Лечение начинают с 30 мг (внутрь), затем увеличивают дозу постепенно до 60-100 мг на прием 2-3 раза в день. Курс 2-3 нед. Для сохранения достигнутых результатов в стадии ремиссии необходимо проводить 2-4 курса в год. В отдельных случаях возможны головная боль и боль в области сердца, которая исчезает при снижении дозы или отмене препарата. Противопоказан при глаукоме, беременности.

ФУЗИДИН-НАТРИЙ (Fusidinum-natrium). Антибиотик, получаемый из культуральной жидкости Fusidium coccineum. Синонимы: Fusidin, Fucidin. Высокоактивен в отношении стафилокок-

ков, в том числе устойчивых к действию других антибиотиков. Применяют при заболеваниях, вызванных устойчивыми к другим антибиотикам стафилококками (сепсис, эндокардит, остеомиелит, фурункулез, отит, пневмония, инфекция кожи и мягких тканей), а также инфицированных ожогах и ранах. Внутрь 3 раза в сутки по 0,5-1 г с жидкой пищей или молоком. Детям до 1 года 60-80 мг/кг (в виде суспензии на сахарном сиропе), от 1 года до 4 лет 40-60 мг/кг, от 4 до 14 лет 20-40 мг/(кг.сут). Курс 7-10 дней. Возможны боль в животе, тошнота, рвота, диарея; в редких случаях - аллергические реакции.

ФУРАГИН (Furaginum). Оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Эффективен в отношении микроорганизмов, устойчивых к сульфаниламидам и антибиотикам. Применяют при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, гнойных ранах, ожогах; свищах, в акушерско-гинекологической практике; офтальмологии (конъюнктивиты, кератиты) и др. Внутрь для лечения болезней мочевыводящих путей после еды по 0,1-0,2 г 2-3 раза в день в течение 7-10 дней. Местно в изотоническом растворе натрия хлорида (1:13 000). В офтальмологической практике в виде глазных капель (2 капли водного

ые устойчивых к действию
иотиков. Применяют при
вызванных устойчивыми к
иотикам стафилококками
кардит, остеомиелит, фу-
т, пневмония, инфекция
тканей), а также инфици-
ах и ранах. Внутрь 3 раза
1 г с жидкой пищей или
до 1 года 60-80 мг/кг (в
на сахарном сиропе), от 1
-60 мг/кг, от 4 до 14 лет
). Курс 7-10 дней. Воз-
животе, тошнота, рвота,
случаях - аллергические

Furaginum). Оказывает
е действие в отноше-
ельных и грамотрица-
Эффективен в отно-
низмов, устойчивых к
и антибиотикам. При-
ительных заболевани-
путей, гнойных ра-
х, в акушерско-гине-
нике; офтальмологии
ратиты) и др. Внутрь
ей мочевыводящих
0,1-0,2 г 2-3 раза в
ей. Местно в изото-
трия хлорида (1:13
ческой практике в
(2 капли водного

раствора 1:13 000 4-6 раз в день). Возможны угнетение аппетита, изжога, рвота, головокружение, аллергические сыпи. При длительном применении могут развиваться невриты. Противопоказан при повышенной чувствительности к производным нитрофуранового ряда. Необходима осторожность при нарушении функции почек.

ФУРАГИН РАСТВОРИМЫЙ (Furaginum solubile). Порошок, содержащий 10% фурагина растворимого и 90% натрия хлорида. Синоним. Furaginum-Kalium). По антимикробной активности сходен с фурагином. Применяют при тяжелых формах инфекционных заболеваний: сепсисе, раневых и гнойных инфекциях, пневмониях, воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, анаэробной инфекции; в комплексе с другими антибактериальными препаратами при брюшном тифе и паратифах. В/в интратрахеально, внутрь полости, интрабронхиально или местно. В/в вводят 1% раствор капельно, медленно в течение 3-4 ч. Суточная доза для взрослых 300-500 мл. Курс лечения - 3-7 вливаний. Интратрахеально вводят при проведении лечебной или лечебно-диагностической санации бронхов 100-300 мл 1% раствора. Курс - 13-14 вливаний. При бронхофиброскопии вводят подогретый до 36-39° C 0,5% или 1% раствор фракционно в дозах 20-

60 мл. При промывании бронха вводят подогретый до 36-39° С 0,5% раствор фракционно по 50-100 мл в общей дозе 500-800 мл с одновременным отсасыванием вводимой жидкости. Промывание можно повторять. Для промывания полостей при перитоните, эмпиеме плевры, нагноении суставных полостей, а также местно при лечении ожогов применяют 1% раствор. Возможны головная боль, шум в ушах, тошнота. Противопоказан при повышенной чувствительности к производным нитрофуранового ряда.

ФУРАДОНИН (Furadoninum). Синонимы: Furadantin, Nitrofurantoinum. Обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Применяют при инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей, урологических операциях (для предупреждения инфекций). Внутрь по 0,1-0,15 г 3-4 раза в день. Курс лечения 5-8 дней. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,3 г, суточная 0,6 г. Возможны аллергические сыпи, потеря аппетита, тошнота, изжога, иногда рвота. Противопоказан при тяжелых заболеваниях сердца, печени и почек; повышенной чувствительности к производным нитрофурана.

ФУРАЗОЛИДОН (Furazolidonum). Синонимы: Nifulidone, Trichofurin. Обла-

промывании бронха вводят
по 36-39° С 0,5% раствор
по 50-100 мл в общей дозе
одновременным отсасыва-
й жидкости. Промывание
ть. Для промывания поло-
тоните, эмпиеме плевры,
авных полостей, а также
нении ожогов применяют
озможны головная боль,
ошнота. Противопоказан
ой чувствительности к
трофуранового ряда.

ИН (*Furadoninum*). *Си-
ntin, Nitrofurantoinum.*
*зомикробной активно-
грамположительных и
х бактерий. Применя-
нных заболеваниях мо-
й, урологических опе-
упреждения инфек-
,1-0,15 г 3-4 раза в
5-8 дней. Высшие до-
рь: разовая 0,3 г, су-
жны аллергические
а, тошнота, изжога,
опоказан при тяже-
дца, печени и по-
вствительности к
рана.*

*(Furazolidonum).
Trichofurin. Обла-*

дает противомикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, трихомонад и лямблий. Наиболее чувствительны к фуразолидону возбудители дизентерии, брюшного тифа и паратифов. Применяют при дизентерии, паратифе, пищевых токсикоинфекциях, заболеваниях, вызванных трихомонадами, лямблиозе. Внутрь после еды. При дизентерии, паратифе, пищевых токсикоинфекциях по 0,1-0,15 г 4 раза в сутки в течение 5-10 дней. Дозы для детей уменьшаются соответственно возрасту. Длительность лечения зависит от тяжести инфекции. Не рекомендуется применять препарат более 10 дней подряд. При лямблиозе по 0,1 г 4 раза в сутки. Детям 10 мг/г в день (в 3-4 приема). При трихомонадных инфекциях по 0,1 г 3-4 раза в день в течение 7-14 дней проводят местное лечение: ежедневно вводят во влагалище 5-6 г порошка (фуразолидон и молочный сахар 1:400-1:500); per rectum суппозитории, содержащие 0,004-0,005 г фуразолидона. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,2 г, суточная 0,8 г. Возможны тошнота, рвота, снижение аппетита, аллергические реакции. Противопоказан при повышенной чувствительности к производным нитрофурана; необходима осторожность при нарушении функции почек.

ФУРАПЛАСТ (с перхлорвинилом) (Furaplastum cum perchlorvinilo). Состав: фурацилина 0,25 г, диметилфталата 25 г, перхлорвиниловой смолы 100 г, ацетона 400 мл, хлороформа 475 мл. Обладает противомикробной активностью. Применяют при мелких травмах кожи (ссадинах, царапинах, трещинах, порезах и т.д.). Наносят тонким слоем на поврежденный участок кожи. Препарат быстро высыхает и образует плотную эластичную пленку, которая не смывается водой и держится 1-3 сут. При повреждениях пленки фурапласт наносят повторно. Противопоказан при нагноившихся и воспаленных ранах, пиодермии, кровотечениях.

ФУРАЦИЛИН (Furacilinum). Синонимы: Chemofuran, Furacin, Nitrofuran. Обладает противомикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Применяют при гнойно-воспалительных процессах, раневой инфекции, бактериальной дизентерии. При гнойно-воспалительных процессах наружно в виде водного раствора (1:5000), спиртового раствора (1:1500) и 0,2% мази. При острой бактериальной дизентерии внутрь после еды по 0,1 г 4-5 раз в сутки в течение 5-6 дней. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,1 г, суточная 0,5 г. В отдельных случаях возможны дерматиты, при при-

...еме внутрь потеря аппетита, [illegible], рвота, головокружение, [illegible] сыпи; длительное применение [illegible] вызвать невриты. Противопоказан [illegible] при повышенной чувствительности [illegible] водным нитрофурана. [illegible] ют с осторожностью [illegible] функции почек.

ФУРОСЕМИД ([illegible]). Синоним: Lasix, Furanthril, [illegible]. [illegible] ствующий диуретик (салуретик). Применяют внутрь, в/м или в/в при [illegible] явлениях в малом и большом кругах кровообращения, связанных с сердечной недостаточностью; циррозом печени с портальной гипертензией, хронической и острой почечной недостаточности, отеке легких и мозга, отравлениях барбитуратами, эклампсии. Фуросемид показан больным с тяжелыми формами артериальной гипертонии, при которых другие салуретические препараты не эффективны, а также для купирования тяжелых гипертонических кризов. Внутрь принимают обычно по 40 мг 1 раз в день (утром). При необходимости суточную дозу можно увеличить до 80-160 мг; в этом случае препарат принимают 1-2 раза в день с интервалом 6 ч. При тяжелой почечной недостаточности доза может быть увеличена до 240-320 мг/сут. После уменьшения отеков дозу постепенно снижают до минимально эффективной, а ...

тервалы между приемами увеличивают до 1-2 дней. При гипертонической болезни фуросемид назначают по 20-40 мг 1 раз в сутки, при сочетании с сердечной недостаточностью суточную дозу можно увеличить до 80 мг. При невозможности или нецелесообразности назначения фуросемида внутрь препарат вводят в/м или в/в (медленно струйно) по 20-60 мг 1-2 раза в сутки, в случае необходимости доза может быть увеличена до 120 мг. Препарат вводят в течение 7-10 дней и более. Затем переходят на прием препарата внутрь. Возможны тошнота, понос, гиперемия кожи, зуд, гипотония, обратимое ухудшение слуха, интерстициальный нефрит. Вследсвие усиленного диуреза наблюдатюся головокружения, депрессия, мышечная слабость, жажда. Возможно развитие гипокалиемии, гиперурикемии, урикозурии, гипергликемии. При появлении побочных реакций следует уменьшить дозу или прекратить применение препарата. Нецелесообразно сочетать фуросемид с цефалоспоринами, гентамицином и другими препаратами, оказывающими нефротическое действие. Лечение фуросемидом должно проводиться на фоне диеты, богатой калием, или с применением солей калия. Противопоказан в первой половине беременности, при гипокалиемии, печеночной коме, терминальной стадии почечной недостаточности, при механической непроходимости мочевых путей.

ХВОЩА ПОЛЕВОГО ТРАВА (Herba Equiseti arvensis). Содержит сапонины, кремниевую кислоту, органические кислоты, дубильные вещества, флавоновые гликозиды (изокверцитрин, 5-гликозидлютеолин, эквицетрин). Применяют как мочегонное средство при заболеваниях сердца и других болезнях, сопровождающихся застойными явлениями, в виде настоя (20,0-200,0) или чая по 1/4 стакана 3-4 раза в день. Противопоказан при нефритах и нефрозонефритах.

ХИМОПСИН (Chymopsinum). Препарат поджелудочной железы убойного скота (смесь а-химотрипсина и трипсина). По биологическим свойствам сходен с а-химотрипсином и трипсином. Применяют при гнойных ранах, ожогах III степени, язвах роговицы, кератитах, воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и легких. Наружно (25-50 мг препарата растворяют в 10-50 мл 0,25% раствора новокаина); в офтальмологии ванночки с 0,2% раствором или капли (0,25% раствор) 3-4 раза в день; ингаляции 25-30 мг в 5 мл изотонического раствора хлорида натрия или воды для инъекций. Возможны аллергические реакции; иногда охриплость голоса после ингаляций; кратковременное повышение температуры до субфебрильных цифр; раздражение и отечность тканей

глаза. Противопоказания те же, что и для трипсина.

ХИМОТРИПСИН КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (*Chymotrypsinum crystallisatum*). Протеолитический фермент, получаемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота. Показания к применению, способ применения, побочное действие, противопоказания и условия хранения те же, что и для трипсина кристаллического.

ХИНИДИНА СУЛЬФАТ (*Chinidini sulfas*). Антиаритмическое средство. Применяют при пароксизмальной тахикардии, пароксизме мерцательной аритмии, стойкой мерцательной аритмии, экстрасистолии. Внутрь по 0,1 г 4-5 раз в день, при необходимости дозу увеличивают до 0,8-1,6 г/сут. При передозировке и повышенной индивидуальной чувствительности угнетение сердечной деятельности, тошнота, рвота, понос, аллергические реакции, в отдельных случаях фибрилляция предсердий. Противопоказан при идиосинкразии к препарату, декомпенсации сердечно-сосудистой системы, беременности.

ХИНИНА ДИГИДРОХЛОРИД (*Chinini dihydrochloridum*). Оказывает антипротозойное действие на бесполые эритроцитарные формы всех видов плазмодиев малярии. Применяют при маля-

рийной коме. Глубоко в подкожную клетчатку вводят по 2 мл 50% раствора двукратно с перерывом между инъекциями 6-8 ч или в/в (медленно) 1 мл в 20 мл 40% раствора глюкозы или изотонического раствора натрия хлорида, затем 1 мл глубоко в подкожную клетчатку и через 6-8 ч еще 2 мл подкожно. Побочные: шум в ушах, головокружение, рвота, сердцебиение, дрожание рук, бессонница. При идиосинкразии к хинину: эритема, крапивница, повышение температуры тела, маточные кровотечения, гемоглобинурийная лихорадка. Противопоказан при повышенной чувствительности к хинину, заболевания среднего и внутреннего уха, гемоглобинурийной лихорадке, декомпенсации сердечной деятельности, в поздние месяцы беременности.

ХИНИОФОН (Chiniofonum). Синонимы: ятрен, Abitrene, Avlochin. Оказывает антипротозойное действие на дизентерийную амебу, а также антимикробное и антигрибковое действие. Применяют при амебной дизентерии, язвенном колите, кишечных инфекциях. При амебной дизентерии и язвенном колите внутрь взрослым по 0,5 г 3 раза в день, в течение 8-10 дней. Повторный курс через 10 дней. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 1 г, суточная 3 г. Детям дозы устанавливают в соответствии с возрастом.

Противопоказан при повышенной чувствительности к йоду.

ХИНОЗОЛ (Chinosolum). Синонимы: Cryptonol, Oxiguinol. Оказывает антисептическое и сперматоцидное действие. Малотоксичен. Применяют для промывания ран, язв, дезинфекции рук, спринцеваний.Наружно в виде растворов (1:1000-1:2000), присыпок (1-2%) и мазей 5-10%).

ХИНОКСИДИН (Chinoxydinum). Обладает антимикробным свойством в отношении вульгарного протея, синегнойной палочки, палочки Фридлендера, эшерихий, шигелл, сальмонелл, стафилококков, стрептококков, возбудителей газовой гангрены. Действует на штаммы, устойчивые к антибиотикам и другим химиотерапевтическим препаратам. Применяют при тяжелых формах гнойных воспалительных заболеваний (пиелит, пиелоцистит, холецистит, холангит, абсцесс легких, эмпиема плевры, кишечные дисбактериозы, тяжелые септические заболевания); инфекциях, вызванных синегнойной палочкой, протеем. Назначают только взрослым по 0,25 г 3 раза в день после еды. Курс 7-14 дней. При хорошей переносимости можно назначать по 0,25 г 4 раза в день. Максимальная суточная доза 1 г. Повторные курсы назначают с перерывом не менее 1 мес.

...азан при повышенной чувст-
...и к йоду.

...ОЗОЛ (Chinosolum). Синони-
...ol, Oxiguinol. Оказывает ан-
...ое и сперматоцидное дейст-
...оксисен. Применяют для про-
...ран, язв, дезинфекции рук,
...ний. Наружно в виде растворов
...2000), присыпок (1-2%) и ма-
...).

...КСИДИН (Chinoxydinum).
...тимикробным свойством в от-
...льгарного протея, синегной-
...и, палочки Фридлендера,
...игелл, сальмонелл, стафи-
...рептококков, возбудителей
...ены. Действует на штаммы,
...антибиотикам и другим хи-
...еским препаратам. При
...тяжелых формах гнойных
...х заболеваний (пиелит,
... холецистит, холангит,
... эмпиема плевры, кишеч-
...озы, тяжелые септиче-
...я); инфекциях, вызван-
...й палочкой, протеем. На-
...зрослым по 0,25 г 3 раза
... Курс 7-14 дней. При
...симости можно назна-
...аза в день. Максималь-
... 1 г. Повторные курсы
...ывом не менее 1 мес.

Возможны диспептические явления, головокружение, головная боль, аллергическая сыпь, судорожные сокращения мышц. Для предупреждения и снятия побочных реакций назначают антигистаминные препараты и препараты кальция, а также внутрь кофеин или 20-30 мл 0,25% раствора новокаина. При сильном побочном действии дозу препарата снижают или прекращают его дальнейшее применение. При длительном назначении может развиться кандидоз. Противопоказан при индивидуальной непереносимости.

ХИНОТИЛИН (Chinotilinum). Обладает выраженной антихолинэстеразной активностью и прекращает антидеполяризующую нервно-мышечную блокаду, вызванную периферическими миорелаксантами. Применяют для снятия остаточного антидеполяризующего блока нервно-мышечной передачи. В/в в дозе 2-4 мг (4-8 мл 0,05% раствора или 1-2 мл 0,2% раствора). Предварительно вводят в вену атропин (0,5-2 мг). Для продления эффекта хинотилина препарат можно комбинировать с небольшими дозами (0,5 мг) прозерина. Возможны побочные явления, связанные с перевозбуждением холинорецепторов: гиперсаливация, боль и урчание в животе в связи с усиленной перистальтикой кишечника, миоз, тошнота, понос, частое мочеиспускание, по-

дергивание мышц языка и скелетной мускулатуры. Эти явления менее выражены, чем при применении прозерина, и предотвращаются введением атропина и других м-холинолитических препаратов. Противопоказан при эпилепсии, гиперкинезах, бронхиальной астме, стенокардии, атеросклерозе.

ХИНОЦИД (Chinocidum). Синоним: Quinocidum. Действует на параэритроцитарные тканевые формы малярийного паразита, которые обусловливают отдаленные рецидивы. Применяют для предупреждения отдаленных рецидивов трехдневной и четырехдневной малярии. Препарат оказывает гамотропное действие в отношении половых форм всех видов плазмодиев. При тропической малярии назначают после окончания лечения препаратами, не действующими на гамонты, для предупреждения распространения малярии через комара. Доза на курс лечения для взрослых 0,3 или 0,28 г. При курсовой дозе 0,3 г назначают по 0,03 г в день в течение 10 дней подряд (схема 1). При курсовой дозе 0,28 г назначают по 0,02 г в день в течение 14 дней (схема 2). Высшие дозы для взрослых внутрь: розовая и суточная 0,03 г. Детям хиноцид назначают в следующих дозах: до 1 года 0,0025г (в течение 10 дней), 0,0015 г (в течение 14 дней), от 1 года до 2 лет 0,005 г (в течение 10 дней),

0,0025 г (в течение 14 дней), от 2 до 4 лет 0,0075 г (в течение 10 дней), 0,005 г (в течение 14 дней), от 4 до 7 лет 0,01 г (в течение 10 дней), 0,0075 г (в течение 14 дней), от 7 до 12 лет 0,015 г (в течение 10 дней), 0,01 г (в [illegible] дней), от 12 до 15 лет 0,02 г (в [illegible] дней), 0,015 г (в течение 14 дн[illegible] лет 0,03 г (в течение 10 [illegible], 0,02 г (в течение 14 дней). На[illegible] препарат в 1-2 приема после еды [illegible] тошнота, головная боль, циано[illegible] легтевого ложа, раздражение почек и мочевого пузыря, лекарственная лихорадка, небольшой гемолиз, лейкопения или лейкоцитоз. Противопоказан при заболеваниях крови и органов кроветворения, заболеваниях почек, стенокардии. Нельзя назначать одновременно с другими противомалярийными препаратами; соблюдать осторожность при назначении лицам пожилого возраста и ослабленным больным.

ХЛОДИТАН (Chloditanum). Ингибитор функции коры надпочечников. Подавляет секрецию кортикостероидов, блокирует стероидогенное действие АКТГ и может вызвать деструктивные изменения нормальной и опухолевой ткани надпочечников. Применяют при болезни Иценко - Кушинга, неоперабельных опухолях коры надпочечников с клиникой синдрома Иценко - Кушинга; с

целью профилактики после удаления кортикостером (без видимых метастазов и при сохранении высокого уровня глюкокортикоидов в организме. Внутрь (самостоятельно и в сочетании с хирургическим лечением) из расчета 0,1 г/(кг.сут) 6 - 10 г в 3 приема через 15-20 мин после еды. На курс 200-300 г. Высшая разовая доза 5 г, суточная 15 г. Лечение проводят под контролем содержания кортикостероидов в крови или моче. Возможны понижение аппетита, головная боль, сонливость, диспептические явления,

ХЛОЗЕПИД (*Chlozepidum*). Синонимы: Timazin, Elenium, Librium и др. Оказывает успокаивающее действие на ЦНС, вызывает миорелаксацию, дает слабый противосудорожный эффект, потенцирует действие алкоголя, снотворных и анальгетиков. Применяют при невротических состояниях, сопровождающихся тревогой, возбуждением, повышенной раздражительностью, бессонницей; неврозо- и психопатоподобных расстройствах у больных с атеросклерозом сосудов мозга, органическим поражением головного мозга; при абстиненции у больных алкоголизмом и наркоманией, вегетососудистых дисфункциях у больных неврозами, психопатиями и при патологическом развитии личности; в психиатрии - при шизофрении с неврозоподобной симптоматикой. Дозы подбира-

...актики после удаления
(без видимых метастазов
...ии высокого уровня глю-
...в организме. Внутрь (са-
сочетании с хирургиче-
...из расчета 0,1 г/(кг.сут)
...ема через 15-20 мин по-
200-300 г. Высшая раз-
...чная 15 г. Лечение про-
...ем содержания корти-
...и или моче. Возможны
...та, головная боль, сон-
...еские явления,

...(*Chlozepidum*). Сино-
...*enium*, *Librium* и др.
...зающее действие на
...иорелаксацию, дает
...рожный эффект, по-
... алкоголя, снотвор-
... Применяют при не-
...иях, сопровождаю-
...буждением, повы-
...здражительностью,
...и психопатоподоб-
...ольных с атероск-
... органическим по-
...зга; при абстинен-
...измом и наркома-
... дисфункциях у
...хопатиями и при
...ии личности; в
...рении с неврозо-
... Дозы подбира-

ют индивидуально. Обычно назначают взрослым внутрь, постепенно повышая дозу до получения терапевтического эффекта. Разовая доза составляет 0,005-0,01 г (5-10 мг), для детей - 0,0025-0,005 г (2,5-5 мг). Средняя суточная доза для взрослых 0,02-0,03 г (20-30 мг). Постепенно суточную дозу можно довести до 0,045-0,06 г, распределяя ее на 3-4 приема. Высшая разовая доза для взрослых 0,015 г, высшая суточная 0,0[illegible]. Препарат отменяют постепенно, снижая дозу. Курс не должен превышать 75 дней. Повторный курс можно проводить через 3 нед. Возможны сонливость, вялость, тошнота, атаксия, кожный зуд, шелушение кожи, нарушение менструального цикла, понижение либидо. Противопоказан при тяжелой форме миастении, острых заболеваниях печени и почек, беременности; работе требующей быстрой психической и двигательной реакции.

ХЛОКСИЛ (Chloxylum). Антигельминтное средство. Применяют при гельминтозах печени (описторхоз, фасциолез, клонорхоз). Внутрь по 5-10 г в день (2 г через каждые 10 мин). Курс 2-5 дней. На курс 10-20 г препарата. Возможны боль в области печени, головокружение, сонливость, аллергические реакции. Противопоказан при заболеваниях печени, поражениях миокарда, беременности.

ХЛОРАКОН (Chloraconum). Синоним: Beclamidum. Оказывает выраженное противосудорожное действие. Применяют при эпилепсии (преимущественно с большими судорожными припадками); психомоторном возбуждении эпилептической этиологии; частых судорожных припадках (в сочетании с другими противосудорожными средствами). Можно назначать больным эпилепсией во время беременности и перенесшим болезни печени. Внутрь по 0,5 г 3-4 раза в день, при необходимости до 4 г/сут; детям по 0,025-0,5 г 2-4 раза в день (в зависимости от возраста). Возможно раздражающее действие на слизистую оболочку желудка у больных, перенесших желудочно-кишечные заболевания; при длительном лечении необходимо следить за функцией печени, почек, картиной крови.

ХЛОРАЛГИДРАТ (Chlorali hydras). Способен вызывать легкую анальгезию, дает седативный, снотворный и в больших дозах наркотический эффект. Применяют как успокаивающее, аналгезирующее, снотворное и противосудорожное средство (спазмофилия, столбняк, эклампсия). Внутрь с обволакивающими веществами по 0,2-1 г на прием, а также в клизмах. Высшие дозы: разовая 2 г, суточная 6 г. При передозировке возможны рвота, падение АД, при длительном применении - привыкание. Противопоказан

при выраженных нарушениях функции печени и почек, заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

ХЛОРБУТИН (Chlorbutinum). Синонимы: Chlorambucilum, Leukeran. Обладает противоопухолевой активностью и угнетает кроветворение, подавляя преимущественно лимфопоэз. Применяют при хроническом лимфолейкозе (преимущественно лейкемическая форма), лимфогранулематозе. Внутрь при хроническом лимфолейкозе 0,002-0,01 г в зависимости от числа лейкоцитов. Курс 3-6 нед, общая доза 0,2-0,4 г. При уменьшении числа лейкоцитов до 25.10 9/л-20.10 9/л препарат дают в поддерживающих дозах (0,002 г через день или 2 раза в неделю). При лимфогранулематозе ежедневно назначают по 0,2 г, к концу курса дозу уменьшают до 0,01 г. На курс 0,4-0,5 г. Применять препарат после лечения другими цитостатическими препаратами или лучевой терапии можно не ранее чем через 1 1/2-2 мес. Возможны лейкопения (при передозировке значительная, вплоть до панцитопении), анемия, тромбоцитопения, боль в эпигастральной области, иногда тошнота, рвота. Противопоказан при тяжелых заболеваниях печени и почек, острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта; в период непосредственно после рентгенотерапии и применения других цитостатических препара-

тов; при лейкопении и тромбоцитопении, анемии.

ХЛОРГЕКСИДИН БИГЛЮКОНАТ (Chlorhexidini bigluconas). Синоним: Hibitane. Бактерицидное и антисептическое средство, эффективное в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий. Обладает фунгистатической активностью (in vitro) против грибов рода Candida, дерматофитов и трихофитонов. Применяют для обработки операционного поля и рук оперирующего персонала, стерилизации хирургического инструментария, а также для промывания мочевого пузыря при циститах. В виде 0,5% спиртового раствора (20% водный раствор разводят 70% этиловым спиртом в отношении 1:40) для обработки операционного поля (2 раза с интервалом 2 мин), мытья рук (2-3 мин) и быстрой (2 мин) стерилизации инструментов; для медленной стерилизации 0,02% водный раствор (30 мин). Для промывания мочевого пузыря 0,02% водный раствор (простерилизованный в автоклаве в течение 30 мин) 1 раз в день от 4 до 12 процедур (300-400 мл раствора на процедуру). Возможны проходящие сухость и зуд кожи, дерматит. Противопоказан при аллергических заболеваниях, дерматитах.

ХЛОРИДИН (Chloridinum). Синонимы: Daraprim, Tindurin. Эффективен в

отношении эритроцитарных (шизонты и гамонты) форм всех видов возбудителей малярии. Оказывает химиотерапевтическое действие при токсоплазмозе. Применяют при малярии (в сочетании с хингамином, или делагином, и сульфаниламидами), токсоплазмоз (в сочетании с сульфадимезином). Для лечения малярии взрослым внутрь по 0,05 г/сут в 2-3 приема в течение 3 дней. Для химиопрофилактики по 0,025 г 1 раз в неделю в течение эпидемического периода. Детям в меньших дозах в соответствии с возрастом. При остром токсоплазмозе взрослым по 0,025 г 2-3 раза в сутки, детям по 0,5-1 мг/кг массы тела в сутки. Одновременно назначают сульфадимезин. Проводят 3 курса лечения по 5-7 дней с интервалом 7-10 дней. При хронических формах токсоплазмоза назначают один курс комбинированного лечения с последующей вакцинотерапией. Возможны головная боль, головокружение, боль в области сердца, диспептические явления, анемия, лейкопения. Противопоказан при заболеваниях кроветворных органов и почек.

ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА РАЗВЕДЕННАЯ (Acidum hydrochloricum dilutum). Синоним: Acidum muriaticum dilutum. Применяют при заболеваниях желудка, сопровожда-

ющихся пониженной кислотностью. Назначают внутрь по 10-15 капель в 1/2 стакана воды 2-4 раза в день во время еды. При гипохромных анемиях применяют в комплексе с препаратами железа.

ХЛОРОФИЛЛИПТ (Chlorophylliptum). Препарат из листьев эвкалипта шарикового, содержащий смесь хлорофиллов А и В. Обладает антибактериальной активностью в отношении антибиотикоустойчивых стафилококков. Применяют при стафилококковом сепсисе, перитоните, плеврите, пневмонии, ожогах, флегмонах, трофических язвах, эрозиях шейки матки, фаринголаринготрахеите; санации при носительстве стафилококка. При носительстве стафилококка в кишечнике 5 мл 10% спиртового раствора разводят в 30 мл воды и применяют внутрь по 25 капель 3 раза в день за 40 мин до еды ежедневно; в клизмах 20 мл 1% спиртового раствора в 1000 мл воды (доза одной клизмы). При септических состояниях вводят в/в (медленно) 2 мл 0,25% спиртового раствора в 38 мл изотонического раствора натрия хлорида 4 раза в сутки в течение 4-5 дней. Наружно применяют 1% спиртовой раствор с 0,25% раствором новокаина в разведении 1:5; при эрозиях шейки матки местно тампоны с 1% спиртовым или 2% масляным раствором. Возможны аллергиче-

ские реакции. Противопоказан при идиосинкразии к препарату.

ХЛОРОФОРМ (Chloroformium). Применяют наружно в смеси для растираний, а также для лабораторных целей. При рвоте, боли в животе и икоте назначают внутрь по 3-5 капель на [illegible].

ХЛОРПРОПАМИД ([illegible]propamidum). Синонимы: Catamil, [illegible]. Оказывает сахаропонижающее [illegible], аналогично бутамиду, но более [illegible]. Применяют при сахарном диабете [illegible]ая форма и средней тяжести), [illegible] вместе с инсулином для усиления [illegible] последнего. Внутрь до или во время завтрака 1 раз в день по 0,25-0,5 г, затем дозу понижают до 0,25-0,1 г в день. При плохой переносимости препарат применяют после еды. Высшая суточная доза 1 г. Возможны аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, диарея, временная холестатическая желтуха. Противопоказания те же, что и для бутамида. Не назначать при желтухе и нарушении функций печени.

ХЛОРПРОТИКСЕН (Chlorprothixen). Синонимы: Труксал, Tarasan, Vetacalm. Транквилизирующее и антипсихотическое средство; усиливает действие снотворных и анальгетических

средств. Применяют при психозах с тревогой и страхом, невротических состояниях с чувством страха, беспокойством, агрессивностью, нарушениями сна: соматических заболеваниях с неврозоподобными расстройствами; кожном зуде. Внутрь по 0,025-0,05 г 3-4 раза в день, при необходимости 0,6 г/сут с последующим постепенным уменьшением дозы. Возможны сонливость, тахикардия, гипотония, сухость во рту, в отдельных случаях экстрапирамидные расстройства. Противопоказан при отравлении алкоголем и барбитуратами, склонности к коллапсу, эпилепсии, паркинсонизме, нарушении кроветворения; работе, требующей напряженного внимания (водители транспорта и др.).

ХЛОРТРИАНИЗЕН (Chlortrianisenum). Синонимы: Chlortrionisoestrolum, Trianisoestrol. Синтетический эстроген. При введении внутрь оказывает более длительное действие, чем другие эстрогены; обладает минимальными феминизирующими свойствами. Применяют при раке предстательной железы. Внутрь по 0,012 г 2-3 раза в день. Лечение длительное. При метастазах дополнительно назначают преднизолон. Иногда возможны набухание и боль в молочной железе, которые быстро исчезают.

"ХЛОСОЛЬ"- солевой раствор для инъекций ("Chlosolum" solutio pro

…низен (Chlortria-…) …имы: Chlortrianisoes-…ol. Синтетический эст… …ии внутрь оказывает …действие, чем другие … минимальными фе… …войствами. Применя… …стательной железы. … раза в день. Лечение …тастазах дополни… …елинизалон. Иногда … и боль в молочной …о исчезают.

…acetatis). Состав: натрия ацетата 3 [illegible] натрия хлорида 4,75 г, калия хлорида [illegible] г, воды для инъекций до 1 л. [illegible]

[illegible]

…можно ограничиться капельным введением препарата. Неотложная регидратационная терапия для выведения больных из состояния гиповолемического шока заключается в 1-3 часовом струйном введении раствора, подогретого до 38-40° С. В течение 1-го часа вводят раствор в количестве, соответствующем 7-10% массы тела больного. В дальнейшем струйное введение раствора заменяют капельным. Капельный раствор вводят в течение 24-48 ч со скоростью 40-120 капель в 1 мин. Препарат

применяют под контролем лабораторных исследований. Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему жидкости, потерянной с рвотными массами, калом, мочой и потом. Баланс введенной и потерянной жидкости определяют каждые 6 ч. При развитии гипокалиемии и ее последствий "Хлосоль" заменяют временно раствором "Дисоль" до нормализации электролитного баланса.

ХОЛАГОЛ (Cholagolum). **Состав:** красящего вещества корня куркумы 0,0225 г, эмодина из крушины 0,009 г, магния салицилата 0,18 г, эфирных масел 5,535 г, спирта 0,8г, масла оливкового до 10 г. Применяют как желчегонное и спазмолитическое средство при гепатохолециститах, холециститах и желчнокаменной болезни по 5 капель (на сахаре) 3 раза в день за 30 мин до еды; при приступах желчной колики 20 капель на прием.

ХОЛЕНЗИМ (Cholenzymum). Препарат из желчи и ферментов поджелудочной железы и кишечника убойного скота. Применяют как желчегонное средство при гепатитах и холециститах, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта по 1 табл. 1-3 раза в день.

под контролем лабораторных
й. Общее количество вводи-
ра должно соответствовать
кости, потерянной с рвотны-
, калом, мочой и потом.
еденной и потерянной
пределяют каждые 6 ч.
ии гипокалиемии и ее
"Хлосоль" заменяют
аствором "Дисоль" до
и электролитного ба-

(Cholagolum). Состав:
щества корня куркумы
на из крушины 0,009 г,
ата 0,18 г, эфирных ма-
та 0,8г, масла оливкового
яют как желчегонное и
е средство при гепато-
олециститах и желчно-
по 5 капель (на саха-
за 30 мин до еды; при
ой колики 20 капель

(Cholenzymum). Пре-
ферментов поджелу-
кишечника убойного
к желчегонное сред-
и холециститах, а
аниях желудочно-
по 1 табл. 1-3

ХОЛЕСТИРАМИН (Cholest[illegible] [illegible]). Синонимы: Colestyraminum, [illegible] Cuemiran. Применяют при зуде, вызван[illegible] застоем желчи в результате заболеван[illegible] печени (желчнокаменная болезни, [illegible]матические послеоперационные [illegible] желчных путей, карцинома и др.), [illegible]холестеринемии, отравлениях препара[illegible] наперстянки. Внутрь по 1 ч. [illegible] раза в день. Суточная доза может быть [illegible] до 16 г (в 4 приема). [illegible] назначить per os другие препараты, [illegible] после приема холестирамина [illegible] не менее 4 ч. Возможны [illegible], понос или запоры. Лечение проводят под контролем протромбинового индекса.

ХОЛИНА ХЛОРИД (Cholini chloridum). Синонимы: Bilineurine, [illegible]uridine. Входит в состав фосфолипида лецитина. Играет существенную роль в синтезе фосфолипидов и в обмене их в печени. Применяют при жировой дистрофии печени, циррозе печени; гипотиреозе, цистинурии, атеросклерозе, хроническом алкоголизме. Внутрь 20% раствор по 1 ч.л. (5 мл) 3-5 раз в день в течение 2-3 нед; в/в (капельно) 1% раствор на изотоническом растворе хлорида натрия или 5-10% растворе глюкозы. При приеме внутрь возможны диспептические явления; при в/в введении ощущение жара, тошнота, рвота, брадикардия, падение АД; возможен коллапс.

ХОЛОСАС (Cholosasum). Сироп, приготовленный из сгущенного водного экстракта плодов шиповника и сахара. Применяют при холецистите и гепатите по 1 ч.л. (детям по 1/4-1/2) 2-3 раза в день.

ХОНСУРИД (Chonsuridum). Препарат, получаемый из гиалиновых хрящей убойного скота. Участвует в построении основного вещества соединительной ткани. Применяют при длительно не заживающих, вяло гранулирующих и медленно эпителизирующихся ранах после травм и оперативных вмешательств; трофических язвах; пролежнях (в стадии гранулирования). Наружно: 0,05 г препарата разводят в 5 мл 0,5% раствора новокаина или изотонического раствора натрия хлорида; содержимое флакона тщательно взбалтывают и образующийся при этом вязкий раствор равномерно распределяют на поверхности стерильной марлевой салфетки. Повязки меняют 1 раз в 2-3 дня. Противопоказан при острых воспалительных процессах в области раны, распространенном некрозе тканей, избыточных грануляциях.

ЦЕЛАНИД (Celanidum). Синоним: изоланид. Гликозид, полученный из листьев наперстянки шерстистой (Digitalis lanata Ehrh.). Действует на сердце подобно другим гликозидам наперстянки, дает быстрый эффект и мало кумулирует.

Применяют при острой и хронической недостаточности кровообращения I, II и III стадии, тахиаритмической форме мерцания предсердий, пароксизмальной тахикардии. Внутрь по 1 табл. (0,25 мг) 2-3 раза в день; в/в по 1-2 мл 0,02% раствора 1-2 раза в сутки. Побочное действие и противопоказания те же, что и для других гликозидов наперстянки

ЦЕЛИАЗА (Celyasa). Препарат, содержащий фермент стрептокиназу. Получают из культуры β-гемолитического стрептококка группы "С". Активирует содержащийся в крови фибринолитический профермент - плазминоген, который превращается в плазмин. Способна проникать внутрь тромба и вызывает его растворение. Применяют при системных и локальных артериальных и венозных тромбозах (наиболее эффективен при его применении в первые 7 дней заболевания). В/в капельно или внутриартериально. В качестве растворителя используют реополиглюкин, изотонический раствор хлорида натрия, 5% раствор глюкозы. Лечение целиазой проводят по специальной схеме только в стационарных условиях. Возможны резорбтивная лихорадка, связанная с поступлением в кровоток продуктов распада тромба; реакции в виде гипертермии, озноба, головной боли, боли в области поясницы, тошнота, обусловленные наличием в пре-

парате гетерогенного белка. Противопоказан при заболеваниях и состояниях, предрасполагающих к кровотечениям (геморрагические диатезы, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, тяжелые формы сепсиса, геморрагический инсульт, туберкулез легких с кавернозным процессом); активном ревматическом процессе и других инфекциях стрептококковой этиологии; острой алкогольной интоксикации, в ранний (до 3 сут) послеоперационный, послеродовой период, при беременности, стойкой артериальной гипертонии; при тяжелых формах сахарного диабета применение целиазы возможно только по жизненным показаниям.

ЦЕРЕБРОЛИЗИН (*Cerebrolysinum*). Гидролизат мозгового вещества, содержащий 18 аминокислот. Способствует улучшению обмена веществ в мозговой ткани. Применяют при заболеваниях, сопровождающихся нарушением функций ЦНС (энцефалит, операции на головном мозге, отсталость умственного развития у детей, психические заболевания, сопровождающиеся рассеянностью, ослаблением памяти; травмы мозга и др.). В/м по 1-2 мл через 2-3 дня. Курс 20-40 инъекций.

ЦЕРИГЕЛЬ (*Cerigelum*). Состав: поливинилбутираля 4 г, цетилпиридиния

...рида 0,2 г, спирта [illegible]

Антисептик, приме[illegible] ботки рук перед [illegible] ческими манипуляци[illegible] готовке крови в ст[illegible] ых условиях, при [illegible] ельных препаратов и [illegible]. На сухую кожу рук нан[illegible] рата и в течение 8-10 с [illegible] рают ладонные и тыльн[illegible] рук, сги[illegible], межпальцевые промежутк[illegible] нижнюю треть предплечий. По высыхании на коже рук образуется пленка, которую по окончании операции снимают этиловым спиртом.

ЦЕРНИЛТОН (Cernilton). Состав: 60 мг цернитина (экстракта сухой пыльцы) и 3 мг цернитина GB XI (экстракта пыльцы диализ). Цернилтон обладает общетонизирующим эффектом, способен повышать устойчивость организма к инфекциям и воспалениям. Может применяться в лечении частых рецидивов инфекций и воспалений, а также в качестве дополнения к антибиотикам и химиотерапевтическим средствам, но не заменяет их. Применяют при частых рецидивах инфекций и воспалений, например хроническом простатите и рецидивах заболевания неспецифическим уретритом, хроническим бронхитом, других рецидивах воспаления верхних дыхательных путей - для профилактики. По 2-4 табл. ежедневно. Детям назначается полдозы.

При необходимости можно применять двойное количество.

ЦЕРУКАЛ (Cerucalum). Синонимы: метоклопропамид, реглан. Регулирует моторную функцию желудочно-кишечного тракта, оказывает противорвотное действие. Применяют при нарушениях моторной функции, атонии и гипотонии (после резекции желудка) желудочно-кишечного тракта, для облегчения диагностики (рентгеноскопия, зондирование желудка и двенадцатиперстной кишки), при тошноте и рвоте различной этиологии (неукротимая рвота беременных, уремия, непереносимость препаратов наперстянки, противотуберкулезных, цитостатических и др.). Внутрь до еды по 1-2 табл. 2-3 раз в день, в/м или в/в - 2-6 мл/сут. Детям дозы уменьшают соответственно возрасту. У детей до 14 лет в отдельных случаях кинетический дистонический синдром (область плеч, шеи и головы), иногда двигательное беспокойство.

ЦЕФАЛЕКСИН (Cephalexinum). Синонимы: Cepolex, Ceflon, Keflex и др. Антибиотик широкого спектра действия. Оказывает бактерицидное действие на многие виды грамположительных и грамотрицательных микробов. Действует на пенициллиноустойчивые пенициллиназообразующие штаммы стафилококков

штаммы не чувствительны к метициллину, обычно не чувствительны и к цефалексину). Действует на стрептококки, пневмококки, палочки дифтерии, менингококки, гонококки, эшерихии, шигеллы и сальмонеллы. Малоэффективен в отношении протея, микобактерий туберкулеза, синегнойной палочки. Применяют при заболеваниях мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, простатит, эндометрит); инфекциях легких и верхних дыхательных путей (пневмония, бронхопневмония, эмпиема и абсцесс легких, тонзиллит, фарингит, отит, синусит и др.); гнойных инфекциях кожи и мягких тканей (фурункулез, абсцессы, лимфоаденит и др.); остром и хроническом остеомиелите; гонорее и других болезнях, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами. Внутрь разовая доза для взрослых 0,25-0,5г, суточная 1-2 г. Детям назначают из расчета 25-30 мг/(кг.сут). При тяжелом течении болезни дозу взрослым увеличивают до 4 г/сут (максимально), детям - до 100 мг/кг. Продолжительность лечения 7-14 дней. Иногда отмечаются тошнота, рвота, боль в животе, редко - понос; возможны аллергические реакции (сыпь, крапивница, ангионевротический отек), дисбактериоз и суперинфекция (кандидоз); ложная положительная реакция на сахар в моче при использовании медесодержащих ре-

активов. При длительном лечении наблюдается обратимая нейтропения. Противопоказан при повышенной чувствительности к антибиотикам группы цефалоспоринов.

ЦЕФАЛОТИН (Cephalotinum). Антибиотик из группы цефалоспоринов. Синоним: кефлин. Обладает широким спектром антимикробного действия. Активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (индолположительные штаммы протея устойчивы к цефалотину). Применяют при гнойно-воспалительных заболеваниях, вызываемых чувствительными к его действию микроорганизмами (сепсис, перитонит, эндокардит, пневмония, эмпиема плевры, абсцесс легкого, бронхиты, ангина и др.), инфекциях мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, простатит, эндометрит, вульвовагинит и др.), гнойных инфекциях кожи, мягких тканей и костей (фурункулез, абсцессы лимфоаденит, инфицированные ожоги, остеомиелит и др.), а также для профилактики послеоперационных гнойных осложнений. Вводят в/м или в/в (капельно или струйно). Разовая доза препарата для взрослых 0,5-1 г, суточная 2-6 г (делят на 4-6 введений). При тяжелом течении гнойно-воспалительных процессов разовую дозу увеличивают до 2 г (только в/в) с интер-

валом между введениями 4 ч. Максимальная суточная доза 12 г. Детям препарат назначают в суточной дозе 100 мг/кг. Новорожденным цефалотин вводят с интервалом 8 ч (только в/в); детям всех остальных возрастных групп (в/в или в/м) с интервалом 6 ч. При почечной недостаточности дозы уменьшают. Начальная доза взрослых составляет 0,5-1 г, при тяжелом течении инфекции 2 г/сут, последующие дозы назначают с учетом степени нарушения выделительной функции почек и тяжести инфекционного процесса. Длительность лечения 7-10 дней и более. Возможны аллергические реакции, проявляющиеся в виде кожной сыпи и зуда, эозинофилии, тромбоцитопении, нейтропении, редко - гемолитической анемии. В этих случаях прекращают введение препарата и проводят десенсибилизирующую терапию. Может оказывать нефротоксическое действие (повышение содержания азота мочевины и креатинина в сыворотке крови), как правило, у больных с предшествующими изменениями функции почек. Препарат в таких случаях рекомендуется применять под контролем функции почек (не реже 1 раза в неделю). Возможно транзиторное повышение активности аминотрансфераз и щелочной фосфатазы в крови больного. При в/в введении больших доз препарата (более 6 г) могут наблюдаться флебиты и пе-

рифлебиты, при в/м - болезненность и образование инфильтратов в области введения. При назначении цефалотина в дозе 12 г/сут возможна гипернатриемия. Противопоказан при повышенной чувствительности больного к препаратам группы цефалоспоринов.

"ЦЕФЕКОН" СУППОЗИТОРИИ (Suppositoria "Cefeconum"). Состав: салициламида 0,6 г, амидопирина и фенацетина по 0,2 г, кофеина или кофеин-бензоата натрия 0,05 г. Жаропонижающее, анальгетическое, противовоспалительное средство, применяемое в качестве болеутоляющего, жаропонижающего, противовоспалительного средства при невозможности введения внутрь средств, входящих в состав суппозиториев, по 1 суппозиторию 1-3 раза в день. Возможны зуд и боль в прямой кишке, головокружение; при длительном применении - гранулоцитопения и агранулоцитоз, аллергические реакции, возбуждение. Противопоказан при повышенной возбудимости, бессонницу, гипертонической болезни II-III стадии, органических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в старческом возрасте, при глаукоме.

ЦЕФОБИД (Cefobid). Активен в отношении большого числа грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, анаэробов. В то же время про-

вляет резистентность к разрушающему действию на него многих β-лактамазов. Применяют при инфекционных заболеваниях, вызываемых чувствительными к данному препарату микроорганизмами: инфекциях верхней и нижней части дыхательного тракта; инфекциях верхней и нижней части мочевого тракта; перитонитах, холециститах, холангитах, других внутрибрюшных инфекциях; септицемии; менингитах, инфекциях кожных покровов и мягких тканей; костных и суставных инфекциях, воспалительных заболеваниях тазовых органов, эндометрите, гонорее и других инфекционных заболеваниях полового тракта. Обычная суточная доза для взрослых колеблется в пределах от 2 до 4 г и делится на равные части, которые вводятся через каждые 12 ч. При тяжело протекающих инфекциях ежедневную дозу увеличивают до 8 г, и равные части этой дозы вводятся через каждые 12 ч. При неосложненном гонококковом уретрите рекомендуется одноразовое в/м впрыскивании 500 мг препарата. Больным с почечными поражениями обычная суточная доза (2-4 г) может быть назначена без корректировки. У больных со скоростью фильтрации почечного клубочка ниже 18 мл/мин или с серозным уровнем креатинина выше 3,5 мг/дцл суточная доза не должна превышать 4 г. При лечении детей суточная доза - от 50

до 200 мг на 1 кг массы тела, она вводится в два приема каждые 12 ч. Новорожденным (моложе 8 дней) лекарство надо вводить через каждые 12 ч. С осторожностью назначать больным со склонностью к различным аллергическим реакциям, кормящим матерям, пациентам с нарушенной функцией печени и сопутствующим повреждением почек. Не смешивать с растворами аминогликозида. Во время лечения возможны внезапный прилив крови к лицу, потливость, головная боль и тахикардия, вызванные алкогольными напитками, принятыми одновременно с введением препарата или самое позднее - на пятый день после. Противопоказан при повышенной чувствительности к цефалоспоринам..

ЦИАНОКОБАЛАМИН (Cyanocobalaminum). Синоним:витамин В12. Обладает высокой биологической активностью. Необходим для нормального кроветворения (способствует созреванию эритроцитов). Применяют при анемии Аддисона - Бирмера; алиментарной макроцитарной анемии; железодефицитной, постгеморрагической, апластической анемии, анемиях, вызванных токсическими веществами и лекарственными препаратами; заболеваниях печени; фуникулярном миелозе; полиневритах, радикулитах, невралгиях, невралгии трой-

...ы тела, она вводится
... 12 ч. Новорожден-
...) лекарство надо вво-
... 12 ч. С осторожно-
...ным со склонностью
...ическим реакциям,
... пациентам с нару-
... печени и сопутствую-
...м почек. Не смешивать
...ногликозида. Во время
...ны внезапный при-
...ну, потливость, голо-
...хикардия, вызванные
...напитками, приняты-
...о с введением препа-
... позднее - на пятый
...тивопоказан при по-
...вительности к цефа-

...ЛАМИН (Cyano-
...ноним: витамин B12-
...биологической актив-
...для нормального кро-
...бствует созреванию
...меняют при анемии.
... алиментарной мак-
... железодефицитной,
... апластической
...вызванных токсиче-
...и лекарственными
...аниях печени; фу-
...полиневритах, ра-
...х, невралгии трой-

...чного нерва; боковом [illegible] ...ом склерозе; и детском церебральном [illegible] параличе, болезни Дауна и [illegible] ...деваниях; травмах периферических [illegible] ...вов. Вводят преимущественно [illegible] ...рально, так как при приеме [illegible] всасывается. При анемии [illegible] мера по 100-200 мкг через [illegible] ...мии Аддисона Бирмера с [illegible] ...никулярного миелоза и при [illegible] ...ных анемиях с нарушением [illegible] ...темы 400-500 мкг на инъекцию [illegible] ремиссии поддерживающая [illegible] 100 мкг 2 раза в неделю. При железоде-фицитных и острых геморрагических анемиях 30-100 мкг 2-3 раза в неделю. При апластических анемиях (особенно у детей) по 100 мкг до наступления улучшения. При алиментарной анемии у детей в раннем возрасте и у недоношенных по 30 мкг в день в течение 15 дней. При нарушениях нервной системы по 200-400 мкг 2-4 раза в месяц. При заболеваниях ЦНС и ПНС по 200-500 мкг на инъекцию. Курс 2 нед. При травмах ПНС по 200-400 мкг через день в течение 40-45 дней. При гепатитах и циррозах печени 30-60 мкг в день или 100 мкг через день в течение 25-40 дней. При дистрофиях у детей раннего возраста, болезни Дауна и детском церебральном параличе 15-30 мкг через день. При фуникулярном миелозе, боковом амиотрофическом склеро-

зе, рассеянном склерозе нередко вводят в спинномозговой канал по 15-30 мкг (увеличивая постепенно дозу до 200-250 мкг на инъекцию). Аллергические реакции, нервное возбуждение, боль в области сердца и тахикардия требуют прекращения лечения и в дальнейшем применения меньших доз (15-30 мкг). Противопоказан при тромбоэмболии, стенокардии. Нельзя вводить в одном шприце растворы цианокобаламина, тиамина бромида и рибофлавина, так как кобальт разрушает другие витамины.

ЦИГЕРОЛ (Cygerolum). Оказывает антисептическое и ранозаживляющее действие. Применяют при гранулирующих и некротических ранах, трофических язвах, ожогах и др. Наружно (наносят на раневую поверхность или смачивают салфетки) per se, при больших раневых поверхностях в смеси со стерильным растительным маслом (1:5). Возможно ощущение жжения при больших раневых поверхностях.

ЦИКВАЛОН (Cycvalonum). Желчегонное и противовоспалительное средство, применяемое при хронических холециститах, холангитах, желчегонной болезни и др. Внутрь по 0,1 г 3-4 раза в день в течение 3-4 нед. Курс при необходимости повторяют через месяц. Возможны чувство тяжести в области печени, горечь

...нередко вводят в
...по 15-30 мкг (уве-
...дозу до 200-250 мкг
...ргические реакции,
...боль в области сер-
...требуют прекращения
...ейшем применения
...0 мкг). Противопока-
...ии, стенокардии.
...ном шприце растворы
...тиамина бромида и
...к кобальт разрушает

...tonum). Оказывает
...ранозаживляющее
...при гранулирую-
...ранах, трофиче-
...р. Наружно (нано-
...сть или смачива-
...при больших ране-
...со стерильным
...1:5). Возможно
...больших раневых

...lonum). Желче-
...тельное средст-
...нических холе-
...желчегонной бо-
...3-4 раза в день
...ри необходимо-
...иц. Возможны
...печени, горечь

...во рту. Противопоказан [illegible] желчных проток[illegible]

ЦИКЛОДОЛ (Cyc[illegible]. Ariane, Parkopan, Ro[illegible] ...ет выраженное цен[illegible] ...ическое холинолитич[illegible] Применяют при паркин[illegible] ной этиологии и дру[illegible] экстрапирамидной сист[illegible] дающихся повышени[illegible] са и гиперкинезами: [illegible] 0,001-0,002 г в день; в зави[illegible] симости препарата до[illegible] повышают до 0,002-0,00[illegible] раза в день. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,01 г, суточная 0,02 [illegible] Возможны сухость во рту, нарушения аккомодации, учащение пульса, при передозировке головокружение. Противопоказан при глаукоме, фибрилляции предсердий; необходима осторожность при заболеваниях печени и почек, гипертонической болезни, выраженном атеросклерозе.

ЦИКЛОМЕТИАЗИД (Cyclomethiazidum). Синонимы: Cyclopenthiazidum, Navidrex. По составу и действию на организм близок к дихлотиазиду (гипотиазид), и применяется в тех же случаях. Внутрь по 0,00025-0,0005 г в день (в тяжелых случаях дозу увеличивают до 0,002 г) в течение 3-7 дней. Длитель-

ность лечения зависит от состояния больного.

ЦИКЛОФОСФАН (Cyclophosphanum). Синонимы: Endoxan, Cyclophosphamide. Цитостатический препарат, оказывает терапевтическое действие при опухолевых процессах. Подобно другим производным ди(2-хлорэтил)амина угнетает кроветворение. Применяют при раке яичников, раке молочной железы, раке легкого, лимфогранулематозе, лимфосаркоме, ретикулосаркоме, множественной миеломе, хроническом лимфолейкозе, остром лейкозе. В/в, в/м, внутриплеврально и внутрибрюшинно (в зависимости от показаний). В/в или в/м по 0,2 г ежедневно, 0,4 г через день или 0,6 г через 2 дня. Ослабленным больным при ухудшении показателей крови или плохой переносимости дневную дозу уменьшают до 0,2 г. На курс лечения 8-14 г, затем препарат назначают в поддерживающих дозах; в/в или в/м по 0,1-0,2 г 2 раза в неделю. Во время лечения исследуют кровь 2 раза в неделю. Возможны лейкопения, тромбоцитопения, тошнота, рвота, алопеция; иногда боль в мышцах и костях, головная боль; в редких случаях токсический гепатит, цистит. Противопоказан при кахексии с резкой анемией, лейкопении, тромбоцитопении, сердечной недостаточности и тяжелых заболеваниях печени и почек.

ЦИМЕЗОЛЬ (Cimesolum). В состав препарата входят: тримекаин 4 г, циминаль 0,1 г, порошок окисленной целлюлозы 2,5г, препарат ОС-20 1,5 г, первичные синтетические жирные спирты 1,5 г, диметилсульфоксид 1,5 г, пропиленгликоль 20 г, вода дистиллированная 18,9 г, дихлордифторметан (хладон-12) 10 г, заключенные в аэрозольный баллон. Оказывает бактерицидное действие на стафилококк, эшерихии, протей, палочку сине-зеленого гноя в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая микрофлору, нечувствительную к антибиотикам. Обладает кровоостанавливающими и анестезирующими свойствами. Применяют для лечения и профилактики гнойных осложнений, для анестезии и остановки капиллярных кровотечений при открытых повреждений мягких тканей, гнойных ранах, пролежнях, трофических язвах, одонтогенных воспалительных процессах, для лечения ран после хирургической обработки острогнойных очагов (флегмоны, абсцессы, панариции, гайморитьі), при ожогах I и II степени. Препарат наносят на раневую поверхность из аэрозольного баллона. В течение 1-2 с выделяется 20-40 куб. см пены, что соответствует 2-4 г препарата. Количество препарата, необходимое для одноразового применения, зависит от площади раневой поверхности, так как

рана должна полностью покрываться пеной. Перевязка ран производится через 2-3 сут до тех пор, пока не появится грануляция.

ЦИМИНАЛЬ (Ciminalum). Антисептическое средство. Способствует эпителизации и заживлению ран. Применяют при пиодермии, инфицированных ранах и трофических язвах, ожогах II степени. Наружно в виде присыпки (5 мг на 1 кв. см поврежденной поверхности). При длительном применении возможны дерматиты, чувство жжения и зуд. Противопоказан при глубоких ожогах и экземах.

ЦИНК-КОРТИКОТРОПИН СУСПЕНЗИЯ (Suspensio Zinc-corticotropini). Содержит в 1 мл 20 ЕД кортикотропина. Физиологический стимулятор коры надпочечников, повышает биосинтез и выделение в ток крови кортикостероидных гормонов, в основном глюкокортикоидов. Одновременно уменьшает содержание в надпочечниках аскорбиновой кислоты и холестерина. Применяют при вторичной гипофункции коры надпочечников, для предупреждения атрофии надпочечников и предупреждения "синдрома отмены" после длительного лечения кортикостероидными препаратами, а также для лечения ревматизма, инфекционных неспецифических полиартритов, бронхиаль-

лностью покрываться пе-
ран производится через
р, пока не появится гра-

ь (Ciminalum). Антисеп-
о. Способствует эпите-
злению ран. Применяют
инфицированных ранах
вах, ожогах II степени.
рисыпки (5 мг на 1 кв.
й поверхности). При
енении возможны де-
жжения и зуд. Про-
глубоких ожогах и

КОТРОПИН СУС-
io Zinc-corticotropini).
ЕД кортикотропина.
тимулятор коры над-
ет биосинтез и выде-
кортикостероидных
и глюкокортикоидов.
шает содержание в
обиновой кислоты и
яют при вторичной
надпочечников, для
фии надпочечников
синдрома отмены
ения кортикостеро-
а также для лече-
екционных неспе-
итов, бронхиаль-

астмы, острого лимфобластного и миелобластного лейкоза, нейродермита, экземы, различных аллергических и других заболеваний. В/м по 10, 20 или 40 ЕД (0,5, 1 или 2 мл) 1 раз в сутки. Для поддерживающей терапии назначают 2-3 раза в неделю в дозе, не превышающей 20 ЕД (для взрослого). Возможны отеки, повышение АД, тахикардия. Противопоказан при тяжелой форме гипертонической болезни и болезни Иценко-Кушинга, беременности, недостаточности кровообращения III стадии, остром эндокардите, психозах, нефрите, остеопорозе, язвенной болезни желудка, сифилисе, активной форме туберкулеза, сахарном диабете, аллергических реакциях.

ЦИНКОВАЯ МАЗЬ (Unguentum Zinci). Состав: окиси цинка 1 часть, вазелина 9 частей. Применяют в качестве антисептического, вяжущего и подсушивающего средства при кожных заболеваниях.

ЦИНКОВАЯ ПАСТА (Pasta Zinci). Состав: окиси цинка 25 г, крахмала 25 г, вазелина 50 г. Применяют в качестве антисептического, вяжущего и подсушивающего средства при кожных заболеваниях.

ЦИНКА СУЛЬФАТ (Zinci sulfas). Применяют в качестве антисептического

и вяжущего средства при конъюнктивитах, хроническом катаральном ларингите, уретритах, вагинитах наружно в виде 0,1 %, 0,25% и 0,5% растворов; в качестве рвотного средства внутрь по 0,1-0,3 г на прием (высшая разовая доза 1 г).

"ЦИНКУНДАН" ("Zincundanum"). Состав: цинка ундециленово-кислого 10 г, ундециленовой кислоты 10 г, анилида салициловой кислоты 10 г, этилцеллозольва 5 г, эмульгатора N 1 6 г, метилцеллюлозы 1,2 г, воды 57,8 г. Обладает противогрибковой активностью. Показания к применению и способ применения те же, что и для ундецина.

ЦИННАРИЗИН (Cinnarizinum). Синоним: стугерон, Stugeron. Избирательно улучшает мозговое кровообращение, расслабляет гладкую мускулатуру сосудов. Является антагонистом кальция. Применяют при ишемических нарушениях мозгового кровообращения., связанных с гипертонической болезнью и церебральным атеросклерозом; мигрени; климактерических сосудистых расстройствах; нарушениях периферического кровообращения (перемежающаяся хромота). Внутрь по 0,025-0,05 г 2-3 раза в день в качестве сосудорасширяющего и спазмолитического средства.

ЦИПРИНОЛ (Ciprinol). Производное хинолина, обладающее ингибирую-

щим воздействием на бактериальную ДНК-гиразу. Эффективен в отношении многочисленных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая микроорганизмы, резистентные к действию других антибиотиков. Применяют при инфекциях, вызванных чувствительными к ципрофлоксацину микроорганизмами: инфеции мочевых и дыхательных путей, уха, горла, носа, инфекции в гинекологии, брюшной полости, печени и желчных путей, костей и суставов, кожи, септикемия. Проглатывают таблетки, не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости, лучше - натощак. В/в вливание (в течение около 30 мин) - наилучший способ в/в введения препарата. В случае осложненных и тяжелых инфекций надо руководствоваться специальной инструкцией. При лечении острой гонореи достаточно одноразового приема 25- мг через рот или 100 мг в/в. Для пожилых больных доза должна быть как можно более низкой. Больным с нарушениями функции почек доза препарата вводится 1 раз в день или дважды по 1/2 дозы. Следует соблюдать осторожность при приеме ципринола во время управления автотранспортом, либо работы на станках и машинах. Возможны тошнота, рвота, боль в желудке, метеоризм, анорексия, диарея (при тя-

желой диарее в ходе лечения необходима отмена терапии), головокружение, ощущение усталости, головная боль, сенсорные нарушения, возбуждение, ощущение беспокойства, редко - ухудшение зрения, судороги. Противопоказан при гиперчувствительности к препарату, беременности и кормлении грудью, в период полового созревания у детей.

ЦИСТАМИНА ДИГИДРОХЛОРИД (Cystamini dihydrochloridum). Предупреждает и уменьшает лучевую реакцию, возникающую при действии на организм больших доз рентгеновских лучей или γ-лучей. Защитный эффект продолжается до 5 ч. При развившейся лучевой болезни неэффективен. Оказывает также гипотензивное действие. Применяют для профилактики лучевой болезни при терапии злокачественных новообразований большими дозами радиации. Внутрь за 1 ч до облучения по 0,2-0,8 г ежедневно или через день на протяжении всего курса лучевой терапии. Возможны тошнота, ощущение жжения в пищеводе, изредка боль в подложечной области, которая не требует отмены препарата. В дозе 0,4-0,6 г препарат может вызвать значительное и длительное снижение АД. Противопоказан при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта; острой недоста-

точности сердечно-сосудистой системы и печени.

ЦИСТЕИН (Cysteinum). Аминокислота, принимающая участие в обмене веществ хрусталика глаза. Применяют при начальных формах катаракты в виде 5% раствора на дистиллированной воде (для электрофореза). Противопоказан при чашеобразной форме катаракты, повышении внутриглазного давления.

ЦИСТЕНАЛ (Cystenal). Состав: настойки корня марены красильной 0,0093 г, магния салицилата 0,14 г, эфирных масел 5,75 г, спирта этилового 0,8 г, оливкового масла до 10 мл. Спазмолитическое, противовоспалительное и диуретическое средство. Применяют при мочекаменной болезни. Внутрь за 30 мин до еды по 3-4 капли (при приступе 20 капель) на кусочке сахара; при частых приступах по 10 капель 3 раза в день. Противопоказан при гломерулонефрите, выраженном нарушении функции почек, язвенной болезни желудка.

ЦИТАРАБИН (Citarabinum). Синонимы: Cytosar, Cytarabine. Относится к группе антиметаболитов пиримидинового обмена и обладает противолейкозной активностью, угнетает костномозговое кроветворение. Применяют при острых лейкозах (преимущественно нелимфобласт-

ные формы) и бластных кризах хронического миелолейкоза. Вводят в/в (капельно или медленно струйно), подкожно или интратекально (интралюмбально). Суточная доза - 100 мг/кв. м, курсовая доза при всех путях введения - 500-1000 мг. Больным пожилого возраста или с пониженными резервами кроветворения назначают 50-75 мг/кв. м, растворив в изотоническом растворе хлорида натрия или воде для инъекций (для внутривенного введения в 400мл, для подкожного и интратекального в 1 мл). В/в суточную дозу (100 мг/кв. м) вводят в виде двух капельных трансфузий медленно (3 ч) с интервалом 10 ч. Суточную дозу препарата можно вводить в виде непрерывной в/в инфузии в течение 24 ч. Под кожу вводят по 20 мг/кв. м 2-3 раза в сутки. Назначают ежедневно в течение 4-7 дней (максимально 10 дней). Интратекально для профилактики нейролейкозов препарат вводят 1 раз в 3 дня в течение 15 дней в однократной дозе 20 мг/м2 (обычно в сочетании с метотрексатом в дозе 12,5 мг/кв. м). Для определения индивидуальной переносимости препарата в этих случаях можно постепенно повышать разовую дозу с 3 мг/кв. м до 20 мг/кв. м. Проводят 4-7 курсов. Интервалы между курсами 10-14 дней. Применяют самостоятельно или в комбинации с другими цитостатическими средствами (цикло-

фосфан, винкристин, L-аспарагиназа, рубомицин, карминомицин) и преднизолоном. Лечение проводят под контролем числа лейкоцитов в периферической крови (ежедневно или через день), функции костного мозга (до и после каждого курса терапии), печени (не реже одного раза в неделю), выделительной функции почек (до начала и после окончания курса терапии). Возможны: лейкопения, тромбоцитопения; анемия, мегалобластоз, тошнота, рвота, потеря аппетита, боли в животе, диарея, воспаление и изъязвление слизистой оболочки полости рта, тромбофлебиты, нарушение функции печени, реже - почек. В этом случае следут уменьшить дозу или отменить препарат. Противопоказан при индивидуальной непереносимости препарата, угнетении костного мозга, тяжелых нарушениях функции печени и почек, беременности.

ЦИТИТОН (Cytitonum) - 0,15% раствор алкалоида цитизина. Рефлекторно возбуждает дыхательный центр, стимулирует сосудодвигательный центр, симпатические ганглии и надпочечники, что приводит к повышению АД. Применяют при асфиксии (в том числе у новорожденных), шоке, коллапсе, остановке дыхания (при операциях, травмах и т.д.), угнетении дыхания и кровообращения при инфекционных болезнях и др. В связи с кратковременностью действия и по-

явлением специфических антагонистов опиатов и барбитуратов в настоящее время цититон имеет ограниченное применение при отравлениях. В/в и в/м 0,5-1 мл. Высшая разовая доза 1 мл, суточная 3 мл. Возможно замедление сердечного ритма, тошнота, рвота. Противопоказан при гипертонической болезни, атеросклерозе, отеке легких, внутренних кровотечениях и кровотечениях из крупных сосудов.

ЦИТОХРОМ-С (Cytochromum-C). Ферментный препарат, получаемый путем экстракции из ткани сердец крупного рогатого скота. Принимает участие в процессах тканевого дыхания, ускоряет окислительные процессы. Применяют для улучшения тканевого дыхания при асфиксии новорожденных, при астматических состояниях, хронической пневмонии, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, вирусном гепатите, старческой дегенерации сетчатки глаза, при интоксикациях и других состояниях, сопровождающихся нарушением окислительных процессов в организме. Внутрь, в/м и в/в. Перед применением инъекционной формы обязательно определяют индивидуальную чувствительность к препарату. Для этого внутрикожно вводят 0,1 мл (0,25 мг) препарата. Если в течение 30 мин не наступает реакция (покраснение лица, зуд

рапивница), то можно приступать к лечению. Вводят в/в или в/м по 4-8 мл (10-20 мг) 1-2 раза в день. Курс 10-14 дней. При заболеваниях сердца препарат в этой же дозе вводят в 200 мл изотонического раствора хлорида натрия или 5% раствора глюкозы в/в капельно (30-40 капель в минуту) в течение 6-8 ч. За [illegible] вводят 12-32 мл (30-80 мг). В послеоперационном периоде и при хронической коронарной недостаточности вводят [illegible] 2 раза в день по 4 мл (10 мг) на инъекцию. При тяжелом состоянии ([illegible], печеночная кома, отравление [illegible] окисью углерода) назначают в/в 20-40 мл (50-100 мг(. При асфиксии новорожденных вводят в пупочную вену на протяжении первых 2 мин после рождения в дозе 10 мг При бронхиальной астме назначают в/м 2 раза в день по 5-10 мг на инъекцию. Курс 14-25 дней в зависимости от фазы и стадии заболевания. Принимают внутрь для предупреждения и снятия побочных явлений, связанных с повышенными нагрузками на организм, а также при вирусном гепатите по 80 мг/сут (по 20 мг 4 раза в день). Курс 5-10 дней в зависимости от тяжести гипоксии. При значительных стрессовых нагрузках рекомендуется применять за 2 ч до нагрузки в дозе 60-100 мг одномоментно. При быстром в/в введении возможны озноб с повышением температуры тела. Противопоказан при индивидуальной непереносимости.

ЦИТРАЛЬ (Citalum). Алифатиссский непредельный альдегид (смесь цис- и транс-изомеров линоленной и терпинолен-ной форм). Применяют как противовоспалительное и болеутоляющее средство при конъюнктивитах и кератитах по 1-2 капли водно-спиртового раствора (1:10 000).

"ЦИТРАМОН" (Cireamonum). Состав: кислоты ацетилсалициловой 0,24 г, кофеина 0,03 г, фенацетина 0,18 г, порошка какао 0,03 г, лимонной кислоты 0,02 г, сахара 0,5 г. Применяют в качестве анальгезирующего средства при головной боли, невралгии и жаропонижающего при простудных заболеваниях по 1 табл. 2-3 раза в день.

ЦИТРОГЛЮКОФОСФАТ (Citroglucophosphatum). Состав: кислоты лимонной х.ч. в пересчете на 100% безводную кислоту 10 г, глюкозы безводной 30 г, натрия фосфата трехзамещенного ч.д.а. 7,5 г, раствора едкого натра 1 н. до pH 5,5-5,9, воды для инъекции - до 1 л. Применяют для консервирования донорской кровь. При заготовке крови в соответствии со специальными инструкциями донорскую крови помещают в простерилизованные флаконы, содержащие цитроглюкофосфат в соотношении 1:4.

ЦЭФЕДРИН (Cephedrinum). Обладает антидепрессивной активностью;

...иливает эффекты симпатомиметических веществ, снимает каталепсию, вызванную нейролептиками. Применяют при депрессивных состояниях различной этиологии; эндогенной депрессии в рамках маниакально-депрессивного психоза и циклотимии, депрессиях, ...ющих различные формы шизофрении, связанные с органическими заболеваниями головного мозга; психо... ...зах и особенно депрессиях, сопровождающихся моторной и идеаторной заторможенностью. Внутрь, начиная с 25 мг 2-3 раза в день, затем дозу постепенно повышают до 200-300 мг/сут (в отдельных случаях до 400-500 мг/сут). После достижения терапевтического эффекта дозу постепенно уменьшают и переходят на поддерживающую терапию 0,025-0,05 г (25-50 мг) в день. В амбулаторных условиях при нерезко выраженной депрессии назначают по 50-75 мг/сут (в 2-3 приема), доза не должна превышать 150 мг (0,15 г) в день. Длительность основного курса 3-6 нед. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,2 г (200 мг), суточная 0,5 г (500 мг). Возможны сухость во рту, склонность к запорам; неприятные ощущения в области желудка, нарушения аккомодации; при повышенной чувствительности к препарату - возбуждение, нарушение сна. Препарат не следует назначать перед сном. Противопоказан при

ажитированном состоянии; почечной и печеночной недостаточности, тяжелых заболеваниях сердца, беременности.

ЧАБРЕЦА ТРАВА (Herba Serpylli). Содержит эфирное масло 0,5-1%), в состав которого входит цимол, карвакрол, тимол; дубильные вещества. Применяют как отхаркивающее и бактерицидное средство при бронхитах и заболеваниях верхних дыхательных путей в виде настоя (15,0:200,0) по 1 ст.л. 2-3 раза в день или жидкого экстракта по 1 ч.л. 3-4 раза в день.

ЧАГА - БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ (Fungus Betulinus). Содержит 20% хромогенный полифенолкарбоновый комплекс, агарициновую кислоту, тритекрпеноид инотодиол, значительное количество марганца. Применяют как симптоматическое средство при хронических гастритах, злокачественных новообразованиях различной локализации (иноперабельные случаи) в виде настоя (20,0:100,0). Измельченный гриб заливают кипяченой водой (температура 50-60° С) на 48 ч. Затем жидкость сливают, а остаток отжимают через несколько слоев марли. Принимают по стакану 1-3 раза в день по назначению врача. При приеме настоя чаги рекомендуется преимущественно молочно-растительная диета. Противопоказан при применении пенициллина, одновременном введении глюкозы.

ЧЕРЕДЫ ТРАВА (Herba Bidentis). Содержит флавоноиды, каротиноиды, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту. Применяют как противовоспалительное и противоаллергическое средство при различных диатезах и гнойничковых заболеваниях кожи в виде настоя (10,0:200,0) внутрь по 1 ст.л. 2-3 раза в день; наружное обмывание.

ЧЕРЕМУХИ ПЛОДЫ (Fructus Pruni racemosae). Содержат дубильные вещества пирокатехиновой группы, органические кислоты, сахар, аскорбиновую кислоту; в семенах гликозид амигдалин. Применяют как вяжущее средство при поносах в виде настоя или отвара (1 ст.л. плодов на стакан кипящей воды) по 1/4 стакана 2-3 раза в день.

ЧЕРНИКИ ПЛОДЫ (Fructus Myrtilli). Содержит дубильные вещества пирокатехиновой группы (5-7%), сахар (5-20%), антоцианы, пектиновые вещества, органические кислоты, витамин B2, гликозид миртиллин. Применяют как вяжущее средство при поносах в виде настоя (1-2 ч.л. на стакан кипятка) по 1/2 стакана 2-3 раза в день или в виде киселя.

ЧИЛИБУХИ НАСТОЙКА (Tinctura Strychni). Синоним: Tinctura nucis vomicae. Применяют как общетонизирующее средство и как горечь для возбуж-

дения аппетита по 3-10 капель на прием. Высшая разовая доза для взрослых 15 капель, суточная 30 капель.

ЧИСТЕЦА БУКВИЦЕЦВЕТНОГО ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (Extractum Stachydis betonicae florae fluidum). Спиртовое извлечение 1:1 на 40% спиртек из надземных частей чистеца буквицецветного. Усиливает сокращение матки. Применяют при субинволюции матки после родов и абортов, при функциональных маточных кровотечениях (воспалительного характера), кровотечениях на почве фибромиом по 20-30 капель 3-4 раза в день. Противопоказан при беременности.

ШАЛФЕЯ ЛИСТЬЯ (Folium Salviae). Содержит эфирное масло (0,5-2%), дубильные вещества, урсоловую и олеаноловую кислоты. Применяют как вяжущее и противовоспалительное средство при заболеваниях полости рта, зева, глотки и гортани для полосканий в виде настоя (10,0:200,0).

ШИПОВНИКА ПЛОДЫ (Fructus Rosae). Содержат аскорбиновую кислоту (до 6%), витамины В2, К, Е (в семенах), флавоноиды с Р-витаминной активностью, каротиноиды, дубильные и пектиновую кислоты, лимонную кислоту, сахар. Применяют как средство, содержащее аскорбиновую кислоту, в виде настоя

(10,0:200,0) из плодов 2 раза в день по 1/4-1/2 стакана для взрослых, по 1/8-1/4 стакана для детей; для профилактических целей в виде витаминного сиропа из плодов по 1 ч. л. 1 раз в день (сироп следует запивать водой); для лечебных целей 2-3 раза в день.

ШИПОВНИКА МАСЛО (Oleum Rosae pingue). Маслянистая жидкость, в состав которой входят насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, а также каротиноиды, токоферолы. Применяют наружно при трещинах и ссадинах сосков у кормящих женщин, при пролежнях, трофических язвах голени, дерматозах, озене; клизмы при неспецифическом язвенном колите.

ЭВКАЛИПТА ЛИСТ (Folium Eucalypti). Содержит эфирное масло (1-3%), дубильные вещества, органические кислоты и др., антисептическое, противовоспалительное и успокаивающее средство, применяемое при заболеваниях верхних дыхательных путей, ларингитах, трахеитах, свежих инфицированных ранах, воспалительных заболеваниях женских половых органов. Для полосканий и ингаляций назначают 1 ст. л. отвара из листьев (10,0:200,0) на стакан воды, масло и настойку (10-20 капель на стакан воды), внутрь - настойку 15-20 капель на прием (как успокаивающее средство).

"ЭВКАТОЛ" КАПЛИ (Guttae "Eucatolum"). Состав: ментола 0,15 г, настойки эвкалипта 20 мл, спирта этилового 90% до 40 мл. Обладает противовоспалительным и слабым антисептическим свойством. Применяют при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. По 5-10 капель на стакан воды для полосканий.

ЭГЛОНИЛ (Eglonyl). Синонимы: Sulpirid, Dogmatil. Оказывает регулирующее действие на функции вегетативной нервной системы, воздействуя на бульбарные центры, сетчатое образорвание и ядра подбугорья, способствует значительному улучшению микроциркуляции в области пищеварительного тракта, ускоряет заживление язвы и улучшает перистальтику кишечника. Нейролептик с незначительным антипсихотическим и противорвотным действием. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; депрессивных состояниях, состояниях невротического торможения, инволюционных старческих психозах, острых психозах, шизофрении, маниакально-депрессивных психозах, тяжелых психозах у детей и подростков. Назначают внутрь и в/м. Дозы подбирают в зависимости от показаний и тяжести заболевания.

ЭЗЕРИНА САЛИЦИЛАТ (Eserini salicylas). Синоним: Physostigmini

salicylas. Препарат антихолинэстеразного действия. Применяют для сужения зрачка и понижения внутриглазного давления при глаукоме; при нервно-мышечных заболеваниях, парезе кишечника. В конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 0,25-1% раствора 1-6 раз в день; подкожно по 0,5-1 мл 0,1% раствора.

ЭКДИСТЕН (Ecdistenum). Природное соединение стероидной структуры. Оказывает тонизирующее действие, способствует усилению биосинтеза белка в организме. Препарат ослабляет действие снотворных, повышает физическую работоспособность. Применяют как тонизирующее средство при астенических и астенодепрессивных состояниях, связанных с ослаблением белоксинтезирующих процессов, при длительных интоксикациях, инфекциях, неврастении, неврозах, гипотонии, у спортсменов во время интенсивных тренировок при дисфункциях сердечно-сосудистой системы, особенно с выраженными признаками перенапряжения миокарда и усилением белкового катаболизма, а также как средство, повышающее скоростно-силовые качества в период подготовки к соревнованиям. Внутрь до еды по 0,005-0,01 г 3 раза в день. Курс (15-20 дней) при необходимости повторяют после 1-2- недельного перерыва. В спортивной медицине применяют по 0,01-0,02 г 3 раза в день, в тече-

ние 2-3 нед. Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0,025 г (25 мг), суточная 0,1 г (100 мг). Для достижения эффекта одновременно с применением экдистена больной должен получать с пищей адекватные количества белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. У больных с лабильной нервной системой возможны бессонница, повышение АД. В этих случаях уменьшают дозу или прекращают прием препарата вечером. Противопоказан при нервном возбуждении, бессоннице, гипертонической болезни, эпилепсии и гиперкинезах.

ЭКТЕРИЦИД (Ectericidum). Получают из рыбьего жира. Содержит альдегиды, жирные кислоты и перекиси. Антибактериальный препарат. Активен в отношении пиогенной микрофлоры (протей, стафилококки, синегнойная палочка, эшерихии). Применяют при ранах, осложненных пиогенной флорой, фурункулах, карбункулах, ожогах, нагноившихся трофических язвах; для санации при носительстве менингококка. Наружно (орошения раневой поверхности, повязки). Повязки меняют через 3-4 дня; при ожогах препарат применяют с 0,5% раствором новокаина (10 мл новокаина на 50 мл эктерицида). При носительстве менингококка орошают носоглотку (25-30 мл препарата), закапывают

...сл. Высшие дозы для взрослых
...зовая 0,025 г (25 мг), суточная
...мг). Для достижения эффекта
...но с применением экдистена
...жен получать с пищей адек-
...чества белков, жиров, угле-
...минов и минеральных ве-
...ьных с лабильной нервной
...можны бессонница, повы-
...этих случаях уменьшают
...кращают прием препара-
...ротивопоказан при нерв-
...ии, бессоннице, гипер-
...езни, эпилепсии и ги-

...Д (*Ectericidum*). *Получа-*
...*ра. Содержит альдеги-*
...*оты и перекиси. Анти-*
...*епарат. Активен в от-*
...*й микрофлоры (про-*
...*кки, синегнойная*
...*. Применяют при ра-*
...*пиогенной флорой,*
...*кулах, ожогах, на-*
...*ких язвах; для са-*
...*тве менингококка.*
...*раневой поверхно-*
...*меняют через 3-4*
...*рат применяют с*
...*на (10 мл ново-*
...*ида). При носи-*
...*орошают носо-*
...*а), закапывают*

...по 4-5 капель и закладывают турун-
... в каждую половину носа на 20-25
... Санацию проводят под бактериоло-
...гическим контролем.

ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ (*Extractum* [illegible] *fluidum*). В медицинской практике ис-
пользуют корни, которые [illegible] про-
изводные кумарина. Сти[illegible] ЦНС.
Применяют как общеукре[illegible] и то-
низирующее средство, повы[illegible] фи-
зическую и умственную [illegible]способ-
ность, ежедневно внутрь в виде спиртово-
го экстракта по 20-40 капель за 30 мин до
еды в течение 25-30 дней. Противопока-
зан при лихорадочных состояниях, ост-
рых инфекционных болезнях.

ЭМЕТИНА ГИДРОХЛОРИД (*Emetini hydrochloridum*). Эффективен в отношении возбудителя амебной дизенте-
рии и некоторых трематод. Применяют
при амебной дизентерии. Парентерально
(под кожу или в мышцу) взрослым по 1,5
мл 1% раствора 2 раза в сутки ежедневно
в течение 6-8 дней. Высшие дозы для
взрослых: разовая 0,05 г (5 мл 1% рас-
твора), суточная 0,1 г (10 мл 1% раство-
ра). Дозы для детей уменьшают в соот-
ветствии с возрастом. В острый период
заболевания проводят 1-2 цикла лечения
с интервалом 7-10 дней. Возможны тош-
нота, рвота, боль в мышцах конечностей,

сердечная слабость, полиневриты. Детям до 6 мес не назначают.

ЭНАП (Enap). Состав: 1 табл. содержит 10 мг эналаприлмалеата и 25 мг гидрохлортиазида. Снижает концентрацию ангиотензина II в плазме и уменьшает выделение альдостерона. Одновременно незначительно повышает содержание калия в сыворотке. Вследствие тормозящего действия на ренин-ангиотензин-альдестероновую систему снижает повышенное кровяное давление у больных с низкой концентрацией ренина. Обладает диуретическими и антигипертоническими свойствами; увеличивает выделение ренина. Применяют при эссенциальной гипертензии любой степени тяжести, где есть необходимость в комбинированном лечении. Обычная дозировка - 1, максимум 2 табл. 1 раз в день в зависимости от восприимчивости индивидуального больного. Больным, которые принимают диуретик, рекомендуется прекращать лечение и снижение дозы за 3 дня до начала терапии энапом, чтобы предупредить быстрое падение давления. Предварительно необходимо контролировать функцию почек. Не следует начинать лечение с назначения фиксированной комбинации; оно не зависит от продолжительности приема. Осторожность требуется в отношении больных с ослабленной функцией почек (клиренс креатинина от 30 до 80

полиневриты. Детям
т.

остав: 1 табл. содер-
малеата и 25 мг гид-
кает концентрацию
лазме и уменьшает
она. Одновременно
ает содержание ка-
ствие тормозящего
нгиотензин-альде-
нижает повышен-
у больных с низ-
ина. Обладает ди-
гипертоническими
ет выделение ре-
ссенциальной ги-
ни тяжести, где
омбинированном
вка - 1, макси-
в зависимости от
дуального боль-
ринимают диу-
екращать лече-
3 дня до начала
едупредить бы-
Предварительно
ать функцию
ь лечение с на-
комбинации;
олжительности
буется в отно-
ой функцией
от 30 до 80

мл/мин) и больных, которые лечатся препаратами, уменьшающими иммуно-логическую реакцию (аллопуринол или комбинации с ним), а также при инсулин-независимом сахарном диабете. В случае резкого падения давления больного надо положить строго горизонтально и произвести коррекцию объема плазмы: дать перорально раствор поваренной соли либо в/в ввести физиологический раствор. Когда нормальное давление будет восстановлено, можно продолжить прием энапа. К снижению кровяного давления приводит одновременный прием других антигипертензивных препаратов, барбитуратов, трициклических антидепрессантов, лития, фенотиазинов, алкоголя. Комбинированный прием энапа с калиесберегающими препаратами (амилорид) может увеличить концентрацию калия в крови. Анальгетики, антифлогистики и большое содержание соли в крови уменьшают действие энапа. Одновременный прием цитостатиков, иммунодепрессантов и системных кортикостероидов может привести к пониженному содержанию лейкоцитов. Осторожность необходима и при приеме дигиталиса. Отмечаются нарушения пищеварения, головокружение, головная боль, мышечные спазмы, кашель и кожные высыпания. При идиосинкразии (ангиоотеке с отеком языка и горла) лечение прекращается и по необходимости

вводится субкутанно раствор норадреналина 1:1000 (0,3 - 0,5 мл). Если увеличивается содержание мочевины в крови и сыворотке, лечение прерывается до появления стабилизации, тогда терапию можно продолжать при условии систематического лабораторного контроля. Противопоказан при повышенной чувствительности к одной из составных частей препарата: стеноз почечной артерии (в результате может нарушиться функция почек), клиренс креатинина ниже 30 мл/мин или сывороточный креатинин выше 1,8 мг/100 мл, острый гломерулонефрит, нарушенная функция печени, патология митральных клапанов и клапанов аорты, беременность и лактация, первичный гиперальдостеронизм.

ЭНТЕРОДЕЗ (Enterodesum). Низкомолекулярный (молекулярная масса 12600+2700) поливинилпирролидон. Обладает дезинтоксикационными свойствами, связывает токсины, образующиеся в организме или поступающие в желудочно-кишечный тракт, и выводит их через кишечник. Лечебный эффект развивается через 15-20 мин после приема препарата. Применяют для дезинтоксикации у взрослых при токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллёзы и др,), пищевой токсикоинфек-

ях, интоксикациях другого происхождения, обострениях хронических энтероколита и энтерита, печеночной недостаточности. Внутрь. Перед употреблением 5 г порошка (1 ч.л.) растворяют в 100 мл кипяченой воды. Для улучшения вкусовых качеств в раствор добавляют сахар или фруктовый сок. Принимают внутрь по 100 мл приготовленного раствора 1-3 раза в сутки в течение 2-7 дней (до исчезновения симптомов интоксикации). Возможны быстро проходящие тошнота и рвота.

ЭПИЛИНОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ (Emplastrum Epilini). Состав: эпилина (пара-β-диэтиламино-этокси)-фенифенетилкетона цитрата 4 г, пластыря свинцового простого 54 г, воска 5 г, ланолина безводного 22 г, воды 15 г. Оказывает эпилирующее действие. Применяют наружно для удаления волос при лечении грибковых заболеваний волосистой части головы. Пластырь накладывают дважды на 10 дней. Дозу на одну процедуру определяют расчета 0,2 г пластыря на 1 кг массы тела. Возможны фолликулярный гиперкератоз, подострый конъюнктивит, сухость красной каймы губ, головная боль, тошнота в редких случаях, следы белка в моче. Противопоказан при заболеваниях почек, суставов, лихорадочном состоянии, желудочно-кишечных расстройствах, гипертиреозе, головной боли,

спазмофлии, заболеваниях нервной системы. Не следует применять детям в возрасте до 1 года.

ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (Ergocalciferolum). Синонимы: витамин D2, кальциферол. Регулирует обмен фосфата и кальция в организме, всасывание их в кишечнике и отложение в костях. Применяют для профилактики и лечения рахита (авитаминоза D), при нарушении функции околощитовидных желез; тетании; остеомаляции, остеопорозе, туберкулезе костей, туберкулезной волчанке. Внутрь для профилактики рахита по 0,0125 мкг (500 МЕ), для лечения 10 000-15 000 МЕ в день в течение 30-60 дней (на курс лечения 500 000-600 000 МЕ). При тяжелой форме рахита до 1 000 000 МЕ в течение 45-60 дней, при стертых формах рахитиа 2000-3000 МЕ в день. При волчанке кожи и слизистых оболочек назначают по 100 000 МЕ/сут. Детям до 16 лет по 25 000-75 000 МЕ/сут в зависимости от возраста. При лечении большими дозами рекомендуется одновременно назначать ретинола ацетат 10 000-15 000 МЕ/сут, токоферола ацетат, аскорбиновую кислоту и витамины группы В. При применении больших доз возможен гипервитаминоз D, сопровождающийся потерей аппетита, тошнотой, головной болью, общей слабостью, повышением температуры, появлением в моче белка,

цилиндров, лейкоцитов, а также повышением содержания кальция в крови и выделение его с мочой, отложением кальция в почках, легких и кровеносных сосудах. Необходима осторожность при назначении лицам пожилого возраста и больным, находящимся на постельном режиме. Эргокальциферол может способствовать развитию атеросклероза, способен накапливаться в организме.

ЭРГОМЕТРИНА МАЛЕАТ (Ergometrini maleas). Синонимы: Ergotrate maleate, Panergal. Повышает тонус и увеличивает частоту сокращений матки. Применяют при маточных кровотечениях (после ручного отделения последа, непосредственно после родов и в послеродовом периоде, после кесарева сечения, аборта и др.). Внутрь по 0,0002-0,0004 г; парентерально (в/м и в/в) по 0,5-1 мл 0,02% раствора). Противопоказан при беременности в I и II периоде родов.

ЭРГОТАЛ (Ergotalum). Смесь фосфатов алкалоидов спорыньи. Повышает тонус мускулатуры матки и увеличивает частоту ее сокращений. Применяют при маточных кровотечениях, вызванных атонией матки, для ускорения обратного развития матки в послеродовом периоде. Внутрь по 0,0005-0,001 г 2-3 раза в день

подкожно и в/м по 0,5-1 мл 0,05% раствора. Противопоказан при беременности, в I и II периоде родов.

ЭРГОТАМИН (Ergotamin). Алкалоид спорыньи Secale cornutum. Увеличивает частоту и амплитуду сокращения матки, а также обладает симпатолитическими и седативными свойствами. Применяют при маточных кровотечениях, атонии матки, неполном аборте, мигрени. Внутрь по 10-20 капель или по 1 драже (0.0001 г) 2-3 раза в день; подкожно или в/м по 0.5-1 мл 0.05% раствора. Возможны диспептические явления; при повышенной нервной возбудимости побледнение лица, похолодание конечностей, парестезии. Противопоказан при беременности, в I и II периоде родов, при заболеваниях печени, почек, сепсисе, выраженном атеросклерозе.

ЭРИНИТ (Erynitum). Синонимы: Nitropenton, Pentril. Оказывает коронарорасширяющее действие; сравнительно с нитроглицерином медленнее всасывается. Применяют при хронической коронарной недостаточности (для предупреждения приступов) .Внутрь или сублингвально по 0.01-0.02 г 2-3 раза в день. Иногда возможен понос, очень редко - головная боль, шум в ушах, головокружение. Противопоказания те же, что и при назначении нитроглицерина.

ЭРИТРОМИЦИН (Erythromycinum). Синонимы: Erythrocyn, Pantomicina. Активен в отношении стафилококков, стрептококков, гонококков, менингококков, дифтерийной и столбнячной палочек, анаэробов и вирусов группы пситтакоза и трахомы. Применяют при инфекциях, вызванных чувствительными микроорганизмами (пневмонии различной этиологии; бронхоэктатическая болезнь, скарлатина, тонзиллит, сепсис, гнойные отиты); раневых инфекциях, гнойничковых поражениях кожи, пролежнях, трофических язвах, ожогах II и III степени, инфекциях слизистой оболочки глаз, трахоме и др. Внутрь по 0,25-0,5 г 4-6 раз в сутки за 1-1 1/2 ч до еды; детям 50 мг/(кг.сут). Местно применяют в виде 1% мази. Иногда возможны тошнота, рвота, понос и аллергические реакции. Противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и тяжелых нарушениях функции печени.

ЭРИТРОМИЦИНА ФОСФАТ (Erythromycini phosphas). Фармакологическое действие, показания к применению, побочное действие, противопоказания те же, что и для эритромицина основания. Применяют в/в 2-3 раза в сутки по 200 мг. Суточная доза может быть увеличена до 1 г. Для детей 20 мг/(кг.сут). Вводят медленно (в течение 3-5 мин) по-

сле разведения водой для инъекций или стерильным изотоническим раствором хлорида натрия из расчета 5 мг/мл. Допускается капельное введение в изотоническом растворе хлорида натрия или в 5% растворе глюкозы в концентрации не более 1 мг в 1 мл растворителя.

ЭРИЦИКЛИН (Erycyclinum). В каждой капсуле содержится по 0.125 г эритромицина и окситетрациклина дигидрата. Обладает широким спектром действия по отношению к грамположительным микробам. Эффективен в отношении микрофлоры, устойчивой к пенициллину, стрептомицину. Применяют при гнойно-воспалительных заболеваниях различной этиологии (ангина, пневмония, бронхит, холецистит, инфекции мочевыводящих путей, дизентерия, раневая инфекция, пиодермия и др.). Внутрь по одной капсуле каждые 4-6 ч (через 30-40 мин после еды). Максимальная суточная доза 8 капсул (2 г). Курс 7-10 дней и более в зависимости от тяжести заболевания. Возможны понижение аппетита, тошнота, рвота, понос, при длительном применении возможны желтуха, аллергические реакции, отек Квинке и др. Противопоказан при повышенной чувствительности к эритромицину и окситетрациклину дигидрату, грибковых заболеваниях; с осторожностью назначают при нарушениях функции печени и почек, лейкопении.

ЭСКУЗАН (Aescusan). Стандартизованный водно-спиртовой раствор сапонинов из семян растения Aesculus hippocastanum. Повышает тонус кровеносных сосудов и понижает свертываемость крови. Применяют для профилактики тромбозов, при венозном застое, расширении вен и др. Внутрь до еды по 12-15 капель 3 раза в день.

ЭСПЕРАЛЬ (Esperal). Синонимы: Antabus, Teturam. Пролонгированная лекарственная форма тетурама. Способен влиять на обмен алкоголя в организме, приводя к увеличению после приема алкоголя концентрации ацетальдегида в крови. При этом появляются неприятные ощущения: затруднение дыхания, шум в голове, сердцебиение, чувство страха, понижение АД. Применяет для лечения больных хроническим алкоголизмом. Эспераль нельзя принимать без предварительного врачебного обследования, а также в состояниях алкогольного опьянения и не ранее чем через 24 ч с момента принятия алкоголя внутрь по 1-2 табл., затем дозу постепенно уменьшают до 1/2-1/4 табл. в день. Таблетки для подкожных и в/м имплантаций стерильны. Вводят обычно по 8-10 табл. путем в/м имплантации в верхне-наружную область ягодиц или вшивают в подкожную жировую клетчатку области спины, нижней части живота. В/м имплантацию повторяют че-

рез 6 мес. Противопоказан при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете , эпилепсии, беременности.

ЭССЕНЦИАЛЕ (Essentiale). Эссенциале форте (Essentiale forte). Состав эссенциале: фосфолипиды, витамины B1, B2, B6, B12, E, никотинамид. Оказывает нормализирующее действие на метаболизм жиров, белков и на детоксицирующую функцию печени; обладает липотропным свойством. Применяют при остром и хроническом гепатите, циррозе печени, токсических поражениях печеночной паренхимы, жировой дистрофии печени различного происхождения, лучевом синдроме, псориазе. Применяют по 2-3 капсулы 3 раза в сутки перед или вместе с едой. При лечении рекомендуется комбинировать прием препарата внутрь с парентеральным введением препарата. Затем по мере улучшения самочувствия переходят на прием капсул внутрь. Курс 3 мес.

ЭСТИМАЛ (Estimalum). Синонимы: амитал, амобарбитал. Оказывает успокаивающее и снотворное действие. Сон наступает в течение 15-30 мин и длится 6-8 ч. Применяют как снотворное средство при различных видах бессонницы. Принимают внутрь перед сном по 0,1-0,2 г на прием. Повышенная чувствительность к эс-

тималу может вызвать кожные аллергические реакции. Противопоказан при заболеваниях печени и почек.

ЭСТОЦИН (Aesthocinum). Синоним: Lokarin. Обладает анальгезирующей и противокашлевой активностью, оказывает умеренное противовоспалительное действие. По анальгезирующему действию менее активен, чем морфин и промедол, но меньше угнетает дыхание, не повышает тонус блуждающего нерва; оказывает умеренное спазмолитическое и холинолитическое действие; уменьшает спазмы кишечника и бронхов, не вызывает запоров. Применяют при боли, связанной со спазмами гладкой мускулатуры; для премедикации и при послеоперационной боли. Используют также при обезболивании родов. В качестве анальгезирующего средства назначают внутрь взрослым по 0,03-0,06 г 2-3 раза в день. Как противокашлевое средство применяют при заболеваниях дыхательных путей и легких, в том числе при бронхоспазме. Назначают внутрь взрослым по 0,015 г 2-3 раза в день. Детям старше 2 лет по 0,005-0,01 г в зависимости от возраста. При длительном применении возможны привыкание и пристрастие. Противопоказан при угнетении дыхания.

ЭСТРАДИОЛА ДИПРОПИОНАТ (Oestradioli dipropionas). Синонимы:

Diovocyclin, Synformon. Оказывает сильное и продолжительное эстрогенное действие. Применяют в тех же случаях, что и фолликулин, в/м в виде 0,1% масляного раствора по 1 мл 2-3 раза в неделю. Побочное действие и противопоказания те же, что и для фолликулина.

ЭСТРАДУРИН (Estradurin). Состав: полиэстрадиолфосфат 40 мг, мепивакаин (карбокаин) 5 мг, никотинамид 25 мг, ртуть-фенил нитрат 0,02 мг. Синоним: Polyestradiol phosphate. Оказывает пролонгированное эстрогенное и ингибирующее действие на кислые и щелочные фосфатазы. Применяют при эстрогензависимой карциноме предстательной железы (при подозрении на резистентность к оральной эстрогенной терапии); иногда используют при климактерических расстройствах и аменорее. Вводят глубоко в/м, содержимое флакона растворяют непосредственно перед введением в 2 мл воды для инъекций и встряхивают до полного растворения. Взрослым вначале назначают по 80-160 мг препарата 1 раз в 4 нед в течение 2-3 мес, затем дозу уменьшают до 40-80 мг/мес. Возможны гинекомастия, феминизация. Противопоказания такие же, как и для других эстрогенов; не рекомендуется назначать детям; с осторожностью применяют у больных с серьезными нарушениями функции печени

или тромбоэмболическими сердечно-сосудистыми расстройствами.

ЭСТРИОЛ (Oestriol). Синоним: Эстроген. Оказывает селективное действие на дистальные отделы полового тракта женщин с выраженным эффектом на вульве, влагалище и шейке матки. Незначительно действует на эндометрий по сравнению с другими производными эстрогена. Применяют при климактерических расстройствах, зуде вульвы, язвах влагалища, старческом кольпите, недержании мочи легкой степени. При климактерических расстройствах препарат применяют в течение 7-10 дней ежедневно по 1-2 табл., затем делают 20-дневный перерыв. Курс 6 мес. При старческом кольпите назначают по 1 табл. 2 раза в день ежедневно, после улучшения состояния по 1 табл. в день. При недержании мочи по 2 табл. в день в течение 20 дней.

"ЭСФЛАЗИД" ("Aesflazidum"). Препарат из каштана конского, содержащий сапонин эсцин из плодов и сумму флавоноидов из листьев - флавазид. Вазотропное средство, применяемое при флебитах, тромбофлебитах, геморрое. Внутрь по 1 табл. 1-2 раза в день в первые 2 дня лечения, затем по 3-4 раза в день. Курс при заболеваниях вен конечностей 2 нед - 2-3 мес. При рецидивах курс повторяют.

При повышенной свертываемости крови можно назначать эсфлазид в сочетании с антикоагулянтами. У отдельных больных возможны диспептические явления, боль в области сердца, слезотечение.

ЭТАДЕН (Edadenum). Участвует в метаболизме нуклеиновых кислот. При парентеральном введении стимулирует репаративные процессы в эпителиальной и кроветворной тканях. Применяют для стимулирования репаративных процессов (у взрослых) при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при термических и лучевых поражениях кожи, лейкопении на почве лучевого и лекарственного лечения, при длительно незаживающих гранулирующих ранах. В/м при язвенной болезни желудка и термических поражениях кожи - по 0,1 г ежедневнео в течение 4-10 дней; при катаральных лучевых ректитах и циститах - по 0,1 г 2 раза в сутки через день в течение 12 дней; при эрозивно-десквамативных и язвенно-некротических ректитах - пресакрально по 0,2 г 1 раз в день с интервалом 5-6 дней в течение 15-30 дней (повторные курсы - по 0,1 г 1 раз в день через день в течение 30 дней); при лучевых эрозивных циститах - по 0,1 г 2 раза в сутки в течение 30 дней, а при язвенно-некротических циститах - в/м по 0,1 г 2 раза в сутки через день в течение 30 дней в сочетании с эндовезикальным введени-

ем (по 0,2 г 3 раза в день с интервалом 5-6 дней). При введении этадена в полость мочевого пузыря содержимое ампулы растворяют в 100 мл 0,5% раствора новокаина. При лейкопенических состояниях препарат вводят в/м 2 раза в сутки через день в течение 12-14 дней. Продолжительность курсов лечения зависит от характера и течения болезни. Противопоказан при острых и хронических лейкозах, нарушениях проводимости сердечной мышцы, аллергических состояниях и при индивидуальной непереносимости.

ЭТАЗОЛ (Aethazolum). Синоним: Sulfaethidolum. Сульфаниламид, применяемый при пневмонии, рожистом воспалении, ангине, дизентерии, гнойных инфекциях, мочевыводящих путей, перитоните, раневой инфекции. Внутрь по 1 г 4-6 раз в день (детям дозу уменьшают соответственно возрасту); в полость раны, в брюшную полость до 5 г (в виде пудры). Возможны тошнота, рвота. Противопоказан при повышенной чувствительности к сульфаниламидам.

ЭТАЗОЛ-НАТРИЙ (Aethazolum-natrium). Сульфаниламид. Показания к применению те же, что и для этазола. Вводят в/м или в/в (медленно) в виде 10% раствора из расчета 0,5-2 г препара-

та на введение. Побочное действие и противопоказания те же, что и для этазола.

ЭТАКРИДИНА ЛАКТАТ (Aethacridini lactas). Синонимы: Acricidum, Rivanolum. Обладает противомикробной активностью (в основном в отношении кокков). Применяют как профилактическое и лечебное антисептическое средство в хирургии, гинекологии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, дерматологии. Наружно в виде 0,05%, 0,1% и 0,2% свежеприготовленных растворов; в дерматологии применяют также 2,5% присыпки, 1% мазь, 5-10% пасты. Иногда при колитах и энтероколитах назначают внутрь. Высшая разовая доза для взрослых внутрь 0,05 г, суточная 0,15 г. Противопоказан при заболеваниях почек, сопровождающихся альбуминурией.

ЭТАМБУТОЛ (Ethambutolum). Синоним: Diambutolum. Обладает бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза; в том числе и в отношении штаммов, устойчивых к другим противотуберкулезным препаратам. Применяют при различных формах туберкулеза. Внутрь 1 раз в день (после завтрака), первичным больным, ранее не принимавшим противотуберкулезные препараты, - по 25 мг/кг. Курс 2 мес. Затем препарат назначают в поддерживающих до-

лах. Возможны ухудшения зрения, аллергические реакции. Противопоказан при неврите зрительного нерва, катаракте, воспалительных заболеваниях глаз, диабетической ретинопатии, беременности.

ЭТАМЗИЛАТ (Aethamzilatum). Синонимы: Dicynon, Cyclonamin и др. Нормализует проницаемость сосудистой стенки, улучшает микроциркуляцию, оказывает гемостатическое действие. Применяют для профилактики и остановки кровотечений при оперативных вмешательствах, травмах, геморрагических диатезах, метро- и меноррагиях, диабетических ангиопатиях, в экстренных случаях при кишечных и легочных кровотечениях, особенно показано применение препарата при нормальных показателях свертывающей системы крови. В/в, в/м, подконъюнктивально, ретробульбарно и внутрь. С профилактической целью препарат вводят в/в или в/м за 1 ч до операции по 2-4 мл (1-2 ампулы) или дают внутрь 2-3 табл. за 3 ч до операции. При необходимости во время операции вводят в/в 2-4 мл. При опасности послеоперационного кровотечения профилактически вводят 4-8 мл или дают внутрь 1,5-2 г равномерно в течение суток. С лечебной целью в экстренных случаях вводят по 2-4 мл в/в или в/м, а затем через каждые 4-6 ч по 0,25 г парентерально или по

0.5 г внутрь. Можно вводить в вену капельно, добавляя к обычным растворам для инфузий. Не следует смешивать препараты в одном шприце с другими препаратами. При диабетических микроангиопатиях (ретинопатии с геморрагиями) назначают курсами по 2-3 мес, давая по 1 табл. 3 раза в день или вводят в/м по 2 мл (1 ампула) 2 раза в день в течение 10-14 дней. Подконъюнктивально и ретробульбарно вводят 1 мл раствора. Не следует применять при геморрагиях, вызванных антикоагулянтами.

ЭТАМИД (Aethamidum). Тормозит реабсорбцию мочевой кислоты в почечных канальцах, способствует выведению ее с мочой и уменьшению содержания в крови. Применяют при хронической подагре, полиартритах с нарушением пуринового обмена, мочекаменной болезни с образованием уратов. Внутрь по 0,7 г 4 раза в сутки в течение 10-12 дней. После 5-7-дневного перерыва лечение продолжают в течение 7 дней. Возможны диспептические и дизурические явления, проходящие самостоятельно.

ЭТАМИНАЛ-НАТРИЙ (Aethaminatum-natrium). Синонимы: Nembutal natrium, Pentobarbitalum Natricum. Снотворное средство, применяемое при бессоннице. Внутрь 0,1-0,2 г, детям 0,01-0,1 г, per rectum в суппозиториях и клизмах

0,2-0,3 г, в/в 5-10 мл 5% раствора. Высшая разовая доза для взрослых 0,3 г, суточная 0,6 г. Противопоказан при заболеваниях печени и почек с нарушением функции.

ЭТАПЕРАЗИН (Aethaperazinum). Синонимы: Chlorpiperazin, Fentazin. Нейролептический препарат широкого спектра действия; [illegible] активнее аминазина; уступает [illegible] гипотермическому действию и по способности потенцировать эффект [illegible] и наркотических средств. [illegible] психических заболеваний [illegible], экзогенно-органические [illegible] инволюционные психозы с апато-абулическими и галлюцинаторно-бредовыми явлениями); психопатиях, неукротимой рвоте (в том числе при беременности), икоте, кожном зуде. Внутрь по 0,004 г 3-4 раза в день; при необходимости дозу увеличивают до 0,06-0,1 г, а в случаях особой резистентности до 0,25-0,3 г. Возможны аллергические и сосудистые реакции, экстрапирамидные нарушения. Противопоказан при нарушениях функции печени и почек, эндокардите, нарушении кроветворной функции.

ЭТАЦИЗИН (Aethacizinum). Обладает антиаритмическими свойствами, увеличивает коронарный кровоток, улучшает функциональное состояние зоны

ишемии удлиняет время проведения и увеличивает продолжительность рефрактерных периодов предсердия, атриовентрикулярного узла, системы Гиса-Пуркинье. Обладает местно-анастезирующей и спазмолитической активностью. Применяют при желудочковх и наджелудочковых экстрасистолиях, пароксизмальных и непароксизмальных желудочковых и наджелудочковых тахикардиях, пароксизмах мерцательной тахиаритмии, при синдроме преждевременного возбуждения желудочков; при аритмиях различной этиологии, в том числе при инфаркте миокарда, осложненном нарушениями сердечного ритма. Внутрь и в/в. Содержимое одной ампулы (2 мл 2,5% раствора - 50 мг) разбавляют 20 мл изотонического раствора хлорида натрия и вводят медленно со скоростью 1- мг/мин под контролем АД и желательно ЭКГ. Время введения не менее 5 мин. Применяют в стационаре. Внутрь принимают по 1 табл. 3-4 раза в день. Продолжительность лечения зависит от формы, нарушения ритма и состояния больного. Возможны головокружение, шум в ушах и в голове, онемение и ощущение жжения губ и кончика языка, "сетка" перед глазами. При приеме внутрь - пошатывание, нарушение аккомодации. В этих случаях надо прекратить прием препарата. Противопоказан при нарушениях проводимости

сердца (синоатриальная блокада II степени, атриовентрикулярная блокада II-III степени, блокада проведения по системе Гиса-Пуркинье, тяжелая сердечная недостаточность и гипотония).

ЭТИЛМОРФИНА ГИДРОХЛОРИД (Aethylmorphini hydrochloridum). Синонимы: Dionim, Diolan. Аналогичен кодеину; при введении в конъюнктивальный мешок способствует купированию боли и рассасыванию экссудатов и инфильтратов при воспалительных заболеваниях тканей глаз. Применяют как противокашлевое средство при бронхите, бронхопневмонии, плеврите и др.; в офтальмологии при паренхиматозном кератите, инфильтрате роговой оболочки, ирите, иридоциклите, травматической катаракте, помутнении стекловидного тела, миопическом хориоретините. Внутрь взрослым по 0,01-0,03 г на прием; в офтальмологии применяют 1-2% раствор и мази. Побочное действие и противопоказания те же, что и при применении морфина гидрохлорида.

ЭТИМИЗОЛ (Aethimizolum). Дыхательный аналептик, применяемый для возбуждения дыхания после наркоза и предупреждения угнетения дыхания при барбитуровом наркозе, для профилактики пневмоний в послеоперационном периоде; в психиатрии при астенодепрес-

сивных состояниях, при заболеваниях, сопровождающихся чувством тревоги. Внутрь по 0,05-0,1 г 3 раза в день, в/в (медленно) по 2-3 мл, в/м и подкожно по 4-5 мл 1,5% раствора. Возможны тошнота, рвота, двигательное возбуждение. Противопоказан при возбуждении ЦНС.

ЭТИОНАМИД (Ethionamidum). Синонимы: Etionizina, Iridozin. Обладает противомикробной активностью в отношении микобактерий туберкулеза, в том числе в отношении штаммов, устойчивых к изониазиду и стрептомицину. Применяют при различных формах туберкулеза. Внутрь через 30 мин после еды по 0,25 г 3-4 раза в день, детям по 0,01-0.02 г/кг (не более 0,75 г/сут). Возможны тошнота, рвота, метеоризм, боль в животе, жидкий стул, ухудшение аппетита, похудание

ЭТМОЗИН (Aetmozinum). Дает умеренный коронарорасширяющий, спазмолитический, м-холинолитический эффект. Основной особенностью препарата является антиаритмическое действие. Применяют при экстрасистолиях, приступах мерцательной, предсердной, пароксизмальной тахикардии. Особенно эффективен при аритмиях, вызванных передозировкой сердечных гликозидов. Рекомендуется начинать прием с дозы

75-200 мг/сут (25-50 мг 3-4 раза в день) в зависимости от формы аритмии и переносимости этмозина. [illegible] препарат купирует [illegible], чем желудочковые. [illegible] эффекта дозу препарата [illegible] увеличивать до 300-400 мг/с[illegible], а [illegible] аритмиях – до 600 м[illegible] 6 раз в день). При достижении лечебного эффекта можно перейти к поддерживающей терапии, уменьшив дозу на 1/3. Курс лечения при приеме внутрь зависит от формы аритмии и составляет 7-45 дней. Возможны небольшая болезненность в эпигастральной области, легкое головокружение. Противопоказан при тяжелых нарушениях проводящей системы сердца, выраженной гипотонии, нарушениях функции печени и почек. Недопустимо одновременное применение ингибиторов моноаминоксидазы.

ЭТОНИЙ (Aethonim). Обладает бактериостатическим и бактерицидным свойством. Эффективен в отношении стрептококков, стафилококков и других микроорганизмов. Оказывает детоксицирующее действие на стафилококковый токсин. Обладает местно-анестезирующей активностью, стимулирует заживление ран. Применяют в качестве антимикробного, обезболивающего и ускоряющего заживления средств при трофических

гнойных язвах, трещинах сосков, прямой кишки, при лучевых поражениях кожи; при зудящих дерматозах; стоматитах, гингивитах; при язвах роговицы, кератитах, отитах и др. Для лечения ран, язв и т.д. применяют наружно в виде 0,02-1% растворов и 0,5-2% мази; для лечения язв роговицы, кератитов и других поражений глаз - 0,1% раствор (по 1-2 капли 3 раза в день в течение не более 10 дней); в этой же концентрации применяют при лечении гнойных отитов, тонзиллитов и др. (промывания, опрыскивание раствором). При лечении стоматитов - 0.5% раствор в виде аппликаций (по 15-20 мин 2-7 дней). При трофических язвах, пиодермии, зудящих дерматитах, термических, лучевых, химических ожогах и др. применяют 0,5-2% мази (курс лечения от 3 дней до 1 1/2 мес). Паста этония (содержит 7 частей этония, 71 часть дентина и 22 части персикового масла) применяется в стоматологической практике при пломбировании зубов. Возможны покраснение кожи, зуд. В этом случае применение препарата прекращают. Противопоказан при повышенной индивидуальной чувствительности к препарату.

ЭУФИЛЛИН (Euphyllinum). Теофиллин с 1,2-этилендиамином. Синонимы: Aminophyllinum, Diaphylin. Оказывает спазмолитическое и сосудорасширяю-

щее действие. Применяют при бронхиальной астме, стенокардии и других заболеваниях сердца, сопровождающихся застойными явлениями, инсультах. Внутрь по 0,1-0,2 г 2-3 раза в день, в/м 2-3 мл 12% раствора или 1-1,5 мл 24% раствора, в/в 5-10 мл 2,4% раствора в 10-20 мл 40% раствора глюкозы; ректально в суппозиториях или микроклизмах по 0,2-0,4 г препартата. Возможны диспептические явления, при в/в введении головокружение, гипотония, головная боль, сердцебиение, судороги, при ректальном применении раздражение слизистой оболочки. Противопоказан при инфаркте миокарда (острый период), выраженном коронароспазме, пароксизмальной тахикардии.

"ЭФАТИН" ("Ephatinum"). Аэрозольный препарат, содержащий атропина сульфат 0,02 г, эфидрина гидрохлорид 0,05 г, новокаин 0,04 г, спирт этиловый до 10 мл и хладон-12 20 г. Благодаря мелкодисперсному (5-10 мкл) состоянию препарат проникает глубоко в легкие, вызывая расслабление бронхиальной мускулатуры, уменьшает секрецию бронхиальных и слюнных желез. Применяют для купирования приступов удушья при бронхиальной астме с легким и средней тяжести течением заболевания, для снятия астматического состояния при бронхитах, пневмониях, бронхоэктатической

болезни, эмфиземе легких и других хронических заболеваниях органов дыхания. В виде ингаляций по 1-5 раз в сутки. Дозирующий клапан обеспечивает распыление при одном нажатии 0,1 мл раствора. Обычно производят 2-5 нажатий (в среднем 3 нажатия, что соответствует вдыханию 0,2 мг атропина сульфата, 0,5 мг эфедрина и 0,4 мг новокаина). Возможно появление першения в горле, кашля, сухости во рту, тошноты, сердцебиения. В этом случае препарат отменяют. Противопоказания те же, что и для атропина и эфедрина: глаукома, стенокардия, выраженная гипертония.

ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИД (Ephedrini hydrochloridum). Синонимы: Ephetonin, Sanedrine. Стимулятор α- и β-адренорецепторов. Применяют при бронхиальной астме, крапивнице и других аллергических заболеваниях, ринитах, отравлениях снотворными и наркотиками, артериальной гипотонии, энурезе и др.; для расширения зрачка (с диагностической целью в офтальмологической практике) и сужения сосудов в оториноларингологической практике. Внутрь по 0,025 г 2-4 раза в день. Парентерально под кожу, в мышцу, в вену струйно медленно (0,5-1 мл 5% раствора) и капельно (2 мл 5% раствора в 500 мл 5% раствора глюкозы или изотонического раствора

хлорида натрия), местно (2-5% раствор) в виде капель. Возможны сердцебиение, тошнота, дрожание конечностей, усиленное потоотделение, бессонница, нервное возбуждение, задержка мочи. Противопоказан при бессоннице, тяжелой артериальной гипертонии, резко выраженном атеросклерозе; необходима особая осторожность при органических заболеваниях сердца.

"ЭФКАМОН" МАЗЬ (Unguentum "Efcamonum"). Содержит: камфоры 10 г, масел гвоздичного и эфирного горчичного по 3 г, эвкалиптового 7 г, ментола 14 г метилсалицилата 8 г, настойки стручкового перца 4 г, тимола и хлоралгидрата по 3 г, спирта коричного 1 г, парафина 4,4 г, спермацета и вазелина по 100 г. Вызывает расширение поверхностных сосудов, гиперемию, ощущение теплоты и улучшение кровообращения в коже и подкожной клетчатке. Применяют при остром артрите, инфекционном неспецифическом полиартрите, миозитах, аллергическом нейромиозите, люмбаго, ревматизме, пояснично-крестцовом радикулите, мигрени, ушибах, спондилезе, ганлионите шейно-грудного отдела. Втирают в кожу по 2-3 г 2-3 раза в день в область участка и покрывают теплой повязкой. Длительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания. При слишком сильном раздражении кожи втира-

ние прекращают. Мазь не следует наносить на поврежденную кожу. После неоднократного применения мази возможны местная парестезия, кожный зуд и гиперемия. В этих случаях мазь отменяют.

ЮМЕКС (Jumex). Увеличивает уровень допамина в поврежденных допаминергических нейронах путем торможения действия ферментов (серотонин, адреналин, норадреналин). Если назначать вместе с леводопой, то гарантирует большую концентрацию допамина в полосатом теле головного мозга. Применяют при болезни Паркинсона как вспомогательное средство для повышения терапевтического эффекта леводопы. В ряде случаев дозу леводопы можно уменьшать. Юмекс применяют во всех стадиях паркинсонизма, прежде всего при прогрессирующем паркинсонизме, когда состояние больных колеблется в течение суток. Дозу подбирают в неврологическом стационаре. Обычно начальная доза составляет 5-10 мг (1-2 табл.) 1-2 раза в сутки (только утром или вечером). Через несколько недель дозу можно уменьшить на половину. После подбора индивидуальной дозы в стационарных условиях состояние больного необходимо контролировать через каждые 3 мес. Побочное действие то же, что при передозировке леводопы. Если дозу леводопы не снижают, то при совме-

не следует на-
ю кожу. После
ения мази воз-
езия, кожный
этих случаях

еличивает уро-
енных допами-
ем торможения
тонин, адрена-
назначать вме-
ирует большую
полосатом те-
еняют при бо-
помогательное
рапевтическо-
це случаев до-
шать. Юмекс
паркинсониз-
рессирующем
иние больных
Дозу подби-
стационаре.
тавляет 5-10
и (только ут-
есколько не-
на половину.
ьной дозы в
ояние боль-
овать через
ствие то же,
допы. Если

стном применении возможны тревога, бессонница, галлюцинации, гиперкинез, а также усиление желудочно-кишечных дисфункций. Противопоказан при экстрапирамидных заболеваниях, не связанных с недостатком допамина (эссенциальный тремор, хорея Гентингтона и т.д.).

156

СОДЕРЖАНИЕ

Отпечатано в ИПП "Кострома".
156010, г.Кострома, ул.Самоковская, 10.
Заказ 487.



КМЕН